

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ لِحُرَّتِهِمْ

ریاضی (۲)

رشته علوم تجربی

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

ریاضی (۱۳) - پایه یازدهم ترم دوم متوسطه - ۵۱۱۳۱۱
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی متوسطه نظری

جمیده‌ها امیری، علی ایرانشهری، مهدی ایزدی، ناصر پروچرانیان، محمدحسین بیژن‌زاده، خسرو داوودی، زهرا رحیمی، محمدعلی‌اشرف رحیمی، ایرلی‌پور رحیمی، محمد رضا سیدعلی، شهریار محمدیان، اکرم قاین رحمت، طاهر قاسمی‌هنری و عادل محمدپور (تفصیلات شورای برنامه‌ریزی)
رضا خیدری‌نژاد، سیدعلی‌اشرف خدایاری، ابراهیم زنجانی، محمدرضا شیخعلی، محمدعلی میرزایی، علی فصیحی و آناهیتا کامیجانی (تفصیلات گروه تألیف)، سید اکبر میرجعفری (ویراستار)
آماره کل تلفات: ۰۲۱۸۸۸۳۱۱۶

نسخه‌ها امینی (نشر آموزش و چاپ) - بنیاده نظری (نشر هنری) - مجتبی‌زاده (طراحی گرافیک) - مرکز هنری: مجموعه آزادخانه راهپیمایی‌ها (موسسه آموزش عالی) - تهران: چاپخانه آریشهر چاپی - سازمان شماره ۴ آموزش و پرورش (تهیه مجسمه)
تلف: ۰۲۱۸۸۸۳۱۱۶، پستال: ۹۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۱۴۱۳۵۹
پایان: www.itextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران تهران، گیلوار ۱۷، جلد ۱ مخصوص گویا - چاپخانه ۶۱ (داریوش) تلفن: ۰۲۱۸۸۸۳۱۱۶، پستال: ۹۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶، شناسه ملی: ۰۷۵۱۵۱۴۹
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «هنرمند خاص»
چاپ: طبع ۱۴۰۴

نام کتاب:
پدیدآورنده:
عنوان: **هندسیت برنامه‌ریزی درسی و تألیف**
شناسه افزوده: **برنامه‌ریزی و تألیف**

عنوان آماده‌سازی هنری:
شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشان سازمان:

موضوع:
چاپخانه:
سال انتشار و توبت چاپ:



شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵-۲۷۸۰-۱
ISBN: 978.964.05.2780.1



غور زیدان عزیزم بگوئید که
ما تمام وجود به استقلال
فرهنگی برسید
بکا لحظه از خدا محفل
بیاستیم، محفلت از عبدا
قدرت انسان راه هلاکت
می رساند
انام خمینی «حَدِيثُ سَرَّةٍ»

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از این کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



فصل ۱- هندسه تحلیلی و جبر | ۱

- درس اول - هندسه تحلیلی | ۲
- درس دوم - معادله درجه دوم و تابع درجه ۲ | ۱۱
- درس سوم - معادلات گویا و معادلات رادیکالی | ۱۹



فصل ۲- هندسه | ۲۵

- درس اول - ترسیم‌های هندسی | ۲۶
- درس دوم - استقلال و قضیه تالس | ۳۱
- درس سوم - تشابه مثلث‌ها | ۴۲



فصل ۳- تابع | ۴۷

- درس اول - آنالیز با برخی از انواع توابع | ۴۸
- درس دوم - وارون بک‌تایم و تابع بک‌تایم | ۵۷
- درس سوم - اعمال جبری روی توابع | ۶۵



فصل ۴- مثلثات | ۷۱

- درس اول - واحدهای اندازه‌گیری زاویه | ۷۲
- درس دوم - روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی | ۷۷
- درس سوم - توابع مثلثاتی | ۸۸



فصل ۵- توابع نمایی و لگاریتمی | ۹۵

- درس اول - تابع نمایی و ویژگی‌های آن | ۹۶
- درس دوم - تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن | ۱۰۵
- درس سوم - نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی | ۱۱۵



فصل ۶- هند و بیوستگی | ۱۱۹

- درس اول - فرایندهای حدی | ۱۲۰
- درس دوم - محاسبه حد توابع | ۱۲۸
- درس سوم - بیوستگی | ۱۳۷

فصل ۷- آمار و احتمال | ۱۴۳

- درس اول - احتمال شرطی و پشامدهای مستقل | ۱۴۴
- درس دوم - آمار توصیفی | ۱۵۲

سخنی با معلم

کتاب حاضر در راستای برنامه درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب‌های ریاضی دوره دوم متوسطه تألیف شده است. همانند پایه‌های قبلی، ساختار کتاب بر اساس سه محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته است. از این میان «فعالیت‌ها» موقعیت‌هایی برای یادگیری و ارائه مفاهیم جدید ریاضی فراهم می‌کنند و این امر مستلزم مشارکت جدی دانش‌آموزان است. البته معلم هم در این میان نقشی مهم برای راهنمایی و هدایت کلی فعالیت‌ها به عهده دارد. با توجه به این که کتاب برای دانش‌آموزان سطح متوسط طراحی شده است، با در نظر گرفتن شرایط مختلف، امکان غنی‌سازی فعالیت‌ها و یا ساده‌سازی آنها به وسیله معلم وجود دارد. در هر حال تأکید اساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی در فرایند آموزش است. در همین راستا توجه به انجام فعالیت‌ها در کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت‌وگو و دادن مجال به دانش‌آموز برای کشف مفاهیم به‌طور جدی توصیه می‌شود.

زمان کلاس درس نباید به مباحثی خارج از اهداف کتاب درسی اختصاص یابد. همچنین نباید آزمون‌های مختلف خارج از مدرسه مبنای آموزش مفاهیم در کلاس درس واقع شوند، بلکه این کتاب درسی است که سطح و سبک آزمون‌ها را مشخص می‌کند. در بسیاری از موارد درباره یک مفهوم، حد و مرزهایی در کتاب رعایت شده است که باید به این موضوع در ارزشیابی‌ها و آزمون‌های رسمی توجه شود. رعایت این محدودیت‌ها موجب افزایش تناسب بین زمان اختصاص یافته به کتاب و محتوای آن خواهد شد. روند کتاب نشان می‌دهد که ارزشیابی باید در خدمت آموزش باشد. در واقع ارزشیابی باید بر اساس اهداف کتاب باشد و نه موضوعاتی که احیاناً بیش از این سال‌ها به صورت سنتی ارائه شده‌اند.

ارتباط بین ریاضیات مدرسه‌ای و محیط پیرامون و کاربردهای این دانش در زندگی روزمره، که به وضوح در اسناد بالا دستی مورد تأکید قرار گرفته است، به صورت تدریجی خود را در کتاب‌های درسی نشان می‌دهد. تلاش برای برقراری این ارتباط در تصاویر کتاب نیز قابل مشاهده است که امید است مورد توجه معلمان و دانش‌آموزان عزیز قرار گیرد.

اگر مهم‌ترین هدف آموزش ریاضی را پرورش تفکر ریاضی بدانیم، دیگر استفاده افراطی از فرمول‌ها، الگوریتم‌ها، قواعد و دستورها بدون آگاهی از چگونگی و جرای عملکرد آنها، جایگاهی در آموزش ریاضی مدرسه‌ای نخواهد داشت. فرصت حضور دانش آموز در کلاس درس را نباید به سادگی از دست داد. فرایندهایی مانند استدلال، تعمیم، حل مسئله، طرح مسئله و موضوعاتی نظیر مسائل باز پاسخ، بازتابی‌های چندگانه و گفت‌وگوهای ریاضی نقش مهمی در پرورش تفکر ریاضی دانش آموزان دارد.

مؤلفان از کلیه امکانات موجود نظیر سامانه اعتبارسنجی، وبگاه گروه ریاضی دفتر تألیف، پیام‌نگار (ایمیل)، دعوت از دبیران مجرب برای حضور در جلسات نقد و بررسی کتاب و دیگر رسانه‌های در دسترس برای دریافت دیدگاه‌ها، نقدها و نظرات دبیران محترم سراسر کشور بهره گرفته‌اند. پاره‌ای از تصاویر و عکس‌های مورد استفاده در کتاب را نیز دبیران ریاضی استان‌های مختلف کشور به گروه ریاضی ارسال کرده‌اند. لازم است از زحمات تمامی عزیزان همراه تشکر و قدردانی نمود. اعضای تیم تألیف به حضور و مشارکت جدی همکاران ازجمله در امر نقد و بررسی کتاب افتخار می‌کنند. امید که همچنان شاهد این تعامل و ارتباط مؤثر باشیم. گروه تألیف آمادگی دریافت نظرات و دیدگاه‌های تمامی همکاران و اساتید را از طریق پیام‌نگار (ایمیل) و وبگاه واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی^۱ دارد. به علاوه بسیاری از مطالب مربوط به پشتیبانی کتاب از طریق وبگاه واحد ریاضی قابل دریافت است.

مؤلفان

۱. mathro@ymail.com

۲. <http://math-dept.tbilif.sch.ir>



هندسه تحلیلی و جبر

فصل



مسیر حرکت برخی از برنامه‌ها را به کمک توابع درجه دوم می‌توان نمایش داد. با دقت در محیط بیرونی خود، پدیده‌های را ببینید که با توابع درجه ۲ مرتبط باشند.

هندسه تحلیلی

درس اول

معادله درجه دوم و تابع درجه ۲

درس دوم

معادلات گویا و معادلات رادیکالی

درس سوم

درس اول

هندسه تحلیلی

یادآوری و تکمیل معادله خط

در بسیاری از پدیده‌های جهان، رابطه خطی بین متغیرها به چشم می‌خورد. بنابراین مطالعه تابع‌های خطی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در سال‌های قبل با مطالسی در این زمینه آشنا شدیم. در این درس نکات دیگری را در این باره، مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

کار در کلاس

۱ به‌طور شهودی می‌توان دید که از هر دو نقطه متمایز، تنها یک خط عبور می‌کند؛ بنابراین: الف) با داشتن مختصات ... نقطه از یک خط باید بتوان معادله آن را به دست آورد. ب) با داشتن معادله یک خط می‌توان با مشخص کردن ... نقطه از خط، نمودار آن را در دستگاه مختصات رسم کرد.

۲ نمودار خطوط با معادلات زیر را در دستگاه مختصات مشخص شده، رسم کنید:

الف) $E_1: y = 2x + 1$


x	-1	1
y	-1	1

ب) $E_2: y = 2x - 3$

ب) $E_3: y = 1$

ت) $E_4: x = -2$

ت) $E_5: x + 2y = 2$




۲ معادله هر یک از خط‌های نمایش داده شده روی شکل را بنویسید.

۱ الف) می‌دانیم که شیب یک خط برابر است با نسبت جابه‌جایی عمودی به جابه‌جایی افقی ... به عبارت دیگر شیب خط گذرا از دو نقطه غیر هم‌طول A و B برابر است با:

$$m_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

ب) شرط موازی بودن دو خط آن است که دارای ... برابر باشند.



۵ الف) از پایه‌تیم به خاطر داریم که هرگاه خط L محور φ ها را در نقطه‌ای با عرض h قطع کند، آن‌گاه h خط L تأیید می‌شود.

ب) در سؤال ۴، شیب و عرض از مبدأ هر یک از پنج خط ذکر شده را بنویسید. در این سؤال کدام دو خط با هم موازی اند؟

۶ الف) خط با شیب m و عرض از مبدأ h معادله‌ای به صورت $\varphi = \dots$ دارد.

ب) می‌خواهیم معادله خط L ، گذرا از دو نقطه $A(-7, 7)$ و $B(3, 1)$ را بنویسیم. برای این کار، ابتدا شیب خط را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{شیب خط } m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{1 - 7}{3 - (-7)} = -2$$


$$\text{معادله خط: } y = -2x + h$$

$$\text{ب) اگر به مختصات نقطه } A(-7, 7) \text{ از خط } L \text{ دقت کنیم، بدون محاسبه متوجه می‌شویم که عرض از مبدأ این خط } h = 7 \text{ است. پس:}$$

معادله خط L ، گذرنده از نقطه $P(2, -1)$ را بنویسید؛ به طوری که با خط $\varphi = 3x - 4$ موازی باشد.

$$\text{معادله خط } L: y = -2x + 7$$

فعالیت



۱ دو خط L و Δ را عمود بر هم رسم کردیم. به شیب‌های این دو خط توجه می‌کنیم:

$$\text{شیب خط } L \text{ گذرا از نقاط } A \text{ و } P: m = \frac{y_P - y_A}{x_P - x_A} = \frac{3 - 7}{2 - (-7)} = \frac{-4}{9} = -\frac{4}{9}$$

$$\text{شیب خط } \Delta \text{ گذرا از نقاط } P \text{ و } B: m' = \dots$$

$$2 \text{ حاصل ضرب شیب‌های دو خط را به دست می‌آوریم: } mm' = \left(-\frac{4}{9}\right) \left(\frac{9}{4}\right) = \dots$$

می‌بینیم که شیب‌ها، قرینه معکوس یکدیگرند.

۳ اگر خط دلخواه دیگری مثل T عمود بر L را در نظر بگیریم، این خط حتماً با خط Δ موازی است؛ پس شیب خط T برابر عدد \dots خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت شیب هر خط عمود بر L برابر **قرینه** شیب خط L خواهد بود. این مطلب در حالت کلی درست است؛ یعنی

دو خط غیر موازی با محورهای مختصات بر هم عمودند، هرگاه حاصل ضرب شیب‌های آنها برابر (-1) باشد؛ یعنی اگر شیب‌های دو خط m و m' باشند، آنگاه شرط عمود بودن آنها آن است که $mm' = -1$. به عبارت دیگر شیب هر کدام، قرینه معکوس شیب دیگری باشد.

۴ در دهانی ایست مختلف روی این مطلب وجود دارد که یکرا از آنها به کمک نظریه فیثاغورس است.

کار در کلاس



بالا دست سازه‌های سازه‌های (ب) ام

۱ در هر قسمت شیب دو خط داده شده را به دست آورید و مشخص کنید که دو خط نسبت به هم چه وضعی دارند. (موازی، عمود یا منقطع غیر عمود)

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| الف) $L: y = 5x - 2$ | $T: y = \frac{-1}{5}x + 3$ |
| ب) $L: y = \frac{1}{4}x + 7$ | $T: x - 2y = 1$ |
| ب) $L: 2x - 3y + 3 = 0$ | $T: 2x + 2y = 0$ |
| ن) $L: x = 1$ | $T: y = -3$ |
| ن) $L: y = 3x + 1$ | $T: x = 3y - 1$ |


۲ خط L به معادله $2y - 3x = 1$ و خط T با عرض از مبدأ ۵ به معادله $y = mx + 5$ را در نظر بگیرید.

- الف) m را طوری بیابید که خط T با خط L موازی باشد.
 ب) به ازای چه مقادیری از m ، دو خط بر یکدیگر عمودند؟

۳ مربع $ABCD$ در ناحیه اول صفحه مختصات واقع است. به طوری که $A(5, 1)$ و $B(10, 4)$ دو رأس مجاور آن هستند. الف) شیب ضلع AB را بیابید.

ب) شیب ضلع AD را حساب کنید و معادله این ضلع را بیابید.


- ب) اگر بدانیم نقطه $C(7, 9)$ رأس سوم مربع است، مختصات رأس D را بیابید.
 ج) مربع را به طور کامل رسم کنید.




فاصله دو نقطه

فعالیت

- در این دستگاه مختصات:
 الف) فاصله دو نقطه A و B که برابر طول پاره خط AB است، برابر ۵ است. چه رابطه‌ای بین این عدد با AB وجود دارد؟
 ب) فاصله دو نقطه C و D را بر حسب عرض آنها بیان کنید.






ب) در شکل مقابل، فاصله نقاط A و B را برحسب طول آنها و فاصله دو نقطه C و D را برحسب عرض آنها به دست آورید.

$$AB =$$

$$CD =$$

در حالت کلی می توان گفت:


۱- اگر A و B دو نقطه هم عرض در صفحه باشند، آن گاه $AB = |x_B - x_A|$
 ۲- اگر C و D دو نقطه هم طول در صفحه باشند، آن گاه $CD = |y_D - y_C|$



فعالیت

- ۱ در شکل مقابل فاصله دو نقطه A و B را با خط کش به دست آورید.
- ۲ بدون استفاده از خط کش، طول بازه خط AB را به دست آورید. برای این کار از چه رابطه ای استفاده می کنید؟

۳ در شکل مقابل:



- الف) مختصات نقطه H را بنویسید.
- ب) طول بازه خط های AH و BH را مشخص کنید و روی شکل بنویسید.
- ب) طول AB را به کمک قضیه فیثاغورس به دست آورید.

با توجه به فعالیت قبل می توان گفت:

فاصله دو نقطه $A(x_A, y_A)$ و $B(x_B, y_B)$ برابر است با $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

کار در کلاس

۱) نقاط $A(2,0)$ ، $B(5,4)$ و $C(-2,3)$ را در نظر بگیرید و آنها را روی دستگاه مختصات مشخص کنید.


الف) محیط مثلث ABC را با محاسبه طول اضلاع آن به دست آورید.

$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2} = \sqrt{(2-5)^2 + (0-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5$$

$$AC = \dots$$

$$BC = \dots$$

$$\text{محیط: } P = \dots$$



ب) ABC چه نوع مثلثی است؟

ب) به دو روش نشان دهید ABC یک مثلث قائم‌الزاویه است. سپس مناخات آن را حساب کنید.

۲) در یکی از جاده‌های کشور، تصادفی رخ داده است که مختصات نقطه تصادف روی نقشه مرکز امداد به صورت $P(5,3)$ است. پایگاه‌های امداد هوایی که به محل تصادف نزدیک‌اند، در نقاط $A(1, -2)$ و $B(8, 9)$ واقع‌اند. شما کدام پایگاه را برای اعزام بالگرد امداد به محل حادثه پیشنهاد می‌کنید؟ (اعداد برحسب کیلومتر هستند).



۲) الف) فاصله نقطه $N(-6, 8)$ تا مبدأ مختصات را محاسبه کنید.

ب) فاصله نقطه $E(x_E, y_E)$ تا مبدأ مختصات را به دست آورید.


مختصات نقطه وسط پاره خط

فعالیت

در این دستگاه مختصات:

الف) نقطه وسط پاره خط AB را M بنامید و M را به همراه مختصات آن روی شکل مشخص کنید.

ب) نقطه وسط پاره خط CD را N بنامید و N را به همراه مختصات آن روی شکل مشخص کنید.






ب) مطابق شکل، A و B دو نقطه دلخواه روی محور x هستند. اگر M وسط AB باشد، طول نقطه M را به دست آورید.

AB وسط $M \Rightarrow AM = MB$

$\Rightarrow x_M - x_A = \dots\dots\dots$


$\Rightarrow 2x_M = \dots\dots\dots \Rightarrow x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$



ت) در شکل مقابل، C و D دو نقطه دلخواه روی محور y ها هستند. اگر N وسط CD باشد، عرض نقطه N را بیابید.

CD وسط $N \Rightarrow \dots\dots\dots$


$\Rightarrow y_N = \frac{\dots\dots\dots}{2}$



ث) اگر A و B دو نقطه دلخواه در صفحه مختصات باشند، نقطه وسط AB ، آنگاه با توجه به شکل مقابل می توان نشان داد:

مختصات نقطه وسط پاره خط AB عبارت است از $M(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2})$.


کار در کلاس



- ۱) مثلث با رأس های $A(1, 9)$ ، $B(4, 1)$ و $C(7, 11)$ را در نظر بگیرید و آن را در دستگاه مختصات مقابل مشخص کنید.
 - الف) مختصات M ، نقطه وسط ضلع BC را مشخص کنید.
 - ب) طول میانه AM را محاسبه کنید.
 - ب) معادله خطی که میانه AM روی آن قرار دارد را به دست آورید.

- ۲) الف) نقطه $N(5, -2)$ وسط پاره خط واصل بین دو نقطه A و $B(7, -2)$ است. مختصات نقطه A را بیابید.
 - ب) قرینه نقطه $C(1, 2)$ نسبت به نقطه $M(-1, 4)$ را به دست آورید.
 - ب) قرینه نقطه $P(a, \beta)$ نسبت به مبدأ مختصات را به دست آورید.

- ۲ سود سالانه یک کارگاه کوچک تولیدی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ طبق نمودار مقابل میر صعودی داشته است. به کمک رابطه نقطه وسط یا خط، به سؤالات زیر پاسخ دهید:
- الف) میانگین سود سالانه این شرکت در دهه مورد نظر چقدر بوده است؟
- ب) در کدام سال، مقدار سود سالانه، با این میانگین سود ده ساله برابر بوده است؟
- پ) اگر سود سالانه در طول یک دهه آینده با همین روند افزایش یابد، انتظار می رود در سال ۱۴۰۵ سود سالانه شرکت چقدر باشد؟



فاصله نقطه از خط

اگر A نقطه ای خارج خط L باشد، فاصله نقطه A تا خط L برابر است با طول پاره خطی که از A عمود بر L رسم می شود. در اینجا می خواهیم با دانستن مختصات نقطه A و معادله خط L این فاصله را محاسبه کنیم.

مثال: فاصله نقطه $A(7, 5)$ را از خط L به معادله $4x + 3y = 18$ به دست آورید.

حل: چون شیب خط L برابر $-\frac{4}{3}$ است، پس هر خط عمود بر آن دارای شیب $\frac{3}{4}$ خواهد بود. معادله خط Δ گذرنده از A و عمود بر L را می نویسیم.

$$\Delta: y = \frac{3}{4}x + h$$

$$\text{است روی } \Delta \text{ نقطه } A(7, 5): 5 = \frac{3}{4}(7) + h \Rightarrow h = -\frac{1}{4}$$

$$\Delta \text{ معادله: } y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4} \Rightarrow \Delta: 3x - 4y = 1$$

اگر معادله دو خط L و Δ را به صورت یک دستگاه معادلات خطی در نظر بگیریم، از حل آن مختصات نقطه P ، محل برخورد دو خط به دست می آید.

$$\begin{cases} L: 4x + 3y = 18 \\ \Delta: 3x - 4y = 1 \end{cases} \Rightarrow x = 3, y = 2 \Rightarrow P(3, 2)$$

طول پاره خط AP جواب مسئله است.

$$AP = \sqrt{(x_A - x_P)^2 + (y_A - y_P)^2} = \sqrt{(7 - 3)^2 + (5 - 2)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$$

با به کارگیری مراحل حل این مثال در حالت کلی می توان ثابت کرد:

فاصله نقطه $A(x_0, y_0)$ از خط به معادله $ax + by + c = 0$ برابر است با:


$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

حال مثال قبل را به کمک این رابطه حل می کنیم؛ یعنی فاصله $A(7, 5)$ را از خط به معادله $4x + 3y - 18 = 0$ به دست می آوریم:

$$d = \frac{|4(7) + 3(5) - 18|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{|25|}{5} = 5$$

کار در کلاس

۱ فاصله نقطه $P(7, -4)$ را از هر یک از خطوط با معادله‌های زیر به دست آورید:
 الف) $L: 2x + y = 5$ ب) $T: x = 5$ پ) $\Delta: y = 1$



۲ خط $L: 3x - 4y = 0$ بر دایره‌ای به مرکز $W(2, -1)$ مماس است. شعاع دایره را بیابید. (راهنمایی: خط مماس بر دایره بر شعاع گذرنده از نقطه تماس عمود است)

تمرین

۱ وضعیت هر جفت از خطوط زیر را نسبت به هم مشخص کنید:

$L: 2x - y = 1$ $T: y = 2x - 2$ $\Delta: x + 2y = -1$

۲ دو نقطه $A(14, 3)$ و $B(10, -13)$ را در نظر بگیرید. فاصله مبدأ مختصات را از وسط پاره خط AB به دست آورید.

۳ نشان دهید مثلث با رأس‌های $A(1, 2)$ ، $B(2, 5)$ و $C(4, 1)$ یک مثلث متساوی‌الساقین قائم‌الزاویه است.


۴ دو انتهای یکی از قطرهای دایره‌ای نقاط $A(2, -2)$ و $B(6, 4)$ هستند.

الف) اندازه شعاع و مختصات مرکز دایره را بیابید.

ب) آیا نقطه $C(7, 3)$ بر روی محیط این دایره قرار دارد؟ چرا؟

۵ نقاط $A(2, 3)$ ، $B(-1, 0)$ و $C(1, -2)$ سه رأس از مستطیل $ABCD$ هستند.

مختصات رأس چهارم آن را بیابید. (با دانستن این مطلب که در هر مستطیل، قطرها متصف بکدیگرند، آیا می‌توانید داخل گونادتری برای مسئله ارائه کنید؟)



۶ یک میله به جرم بزرگ، مطابق شکل توسط کابل‌هایی به چهار نقطه در زمین محکم

سدها است؛ به طوری که فاصله هر یک از چهار نقطه تا پای میله برابر است یا فاصله نقطه مقابل آن تا پای میله. مختصات نقطه D را به دست آورید.


۷ یکی از اضلاع مربعی بر خط $L: y = 2x - 1$ واقع است. اگر $A(3, 0)$ یکی از رئوس

این مربع باشد، مساحت آن را به دست آورید.

۸ الف) نشان دهید دو خط با معادلات $5x - 12y + 8 = 0$ و $-10x + 24y + 1 = 0$ با

یکدیگر موازی‌اند.

ب) فاصله این دو خط را محاسبه کنید. (راهنمایی: یک نقطه دلخواه روی یکی از خطوط در نظر بگیرید و فاصله آن را از خط دیگر به دست آورید).





۱ طول جغرافیایی تبریز تقریباً ۴۶ درجه شرقی و عرض جغرافیایی آن حدود ۳۸ درجه شمالی است. برای راحتی، می‌توانیم موقعیت این شهر را به‌طور خلاصه، به صورت (۴۶، ۳۸) نشان دهیم. این اطلاعات دربارهٔ جایگاه به صورت (۴۶، ۳۸) است. با فرض اینکه مسافت قریبکی هر درجه طول جغرافیایی همانند مسافت قریبکی هر درجه عرض جغرافیایی برابر ۱۱۰ کیلومتر باشد، مطلوب است محاسبه فاصله تقریبی این دو شهر.



ایا تاکنون به رابطه طول و عرض جغرافیایی با دستگاه مختصات فکر کرده‌اید؟ در دستگاه مختصات مقابل، کدام محور نظیر طول جغرافیایی است؟ با توجه به طول و عرض جغرافیایی جایگاه، محل تقریبی این شهر را روی نقشه مشخص کنید.



موزه قاجار تبریز

معادله درجه دوم و تابع درجه ۲

روش تغییر متغیر برای حل معادله

در پایه دهم، روش‌های مختلفی را برای حل معادله درجه ۲ آموختیم. یکی از دلایل اهمیت این معادلات آن است که معادلات دیگری نیز وجود دارند که قابل تبدیل به معادله درجه دوم اند؛ مانند معادلات گویا و گنگ که درس سوم به آنها اختصاص یافته است. در اینجا با روش تغییر متغیر برای حل دسته خاصی از معادله‌ها آشنا می‌شویم که یک شیوه کارآمد برای حل انواع معادله است.

مثال: معادله مقابل را حل کنید.

حل: با وجود آنکه این معادله از نوع درجه ۴ است، می‌توان آن را به روش معادله درجه دوم حل کرد. برای این کار به جای عبارت x^2 متغیر (مجهول) جدیدی مثل u قرار می‌دهیم. به این کار تغییر متغیر می‌گوییم.

$$u^2 - 10u + 9 = 0$$

این معادله را به روش کلی و همچنین به روش تجزیه حل می‌کنیم:

(روش تجزیه)

$$(u-1)(u-9)=0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u=1 \Rightarrow x^2=1 \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=-1 \end{cases} \\ u=9 \Rightarrow x^2=9 \Rightarrow \begin{cases} x=3 \\ x=-3 \end{cases} \end{cases}$$

(روش کلی)

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-10)^2 - 4(1)(9) = 64 \\ u &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{10 \pm \sqrt{64}}{2(1)} \\ &= \begin{cases} u=1 \Rightarrow x^2=1 \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=-1 \end{cases} \\ u=9 \Rightarrow x^2=9 \Rightarrow \begin{cases} x=3 \\ x=-3 \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

کار در کلاس

معادله‌های زیر را حل کنید.

الف) $2x^2 - 7x + 4 = 0$

ب) $x^2 + 3x + 2 = 0$

مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله درجه ۲

گاهی به جای مقدار دقیق ریشه‌های یک معادله درجه ۲، تنها مجموع و حاصل ضرب ریشه‌ها اهمیت دارد که در این صورت بدون حل

معادله می‌توان این مقادیر را به دست آورد، معمولاً مجموع دو ریشه را یا S و حاصلضرب آنها را یا P نمایش می‌دهیم؛ یعنی اگر α و β ریشه‌های معادله باشند: $\alpha + \beta = S$ و $\alpha\beta = P$.

فعالیت

می‌دانیم که معادله درجه دوم در حالت کلی به صورت مقابل است:

$$(۱) \quad ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

- ۱ می‌خواهیم بررسی کنیم که چگونه می‌توان بدون حل این معادله دربارهٔ وجود و تعداد جواب‌های حقیقی آن اظهار نظر کرد.
 الف) در این معادله اگر ضرایب a و c هم علامت نباشند، دربارهٔ علامت Δ چه می‌توان گفت؟
 ب) اگر a و c هم علامت نباشند، آنگاه معادله (۱) دارای ریشه حقیقی متمایز است.

$$3x^2 + 5x - 1 = 0$$

۲ معادلهٔ مقابل را در نظر می‌گیریم:

الف) توضیح دهید که چرا این معادله دارای دو ریشه حقیقی متمایز است.

ب) آیا بین ضرایب معادله و مجموع ریشه‌ها (S) رابطه‌ای وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، معادله را حل می‌کنیم:

$$\Delta = b^2 - 4ac = \dots\dots\dots$$

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \dots\dots\dots$$

$$\beta = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \dots\dots\dots$$

$$S = \alpha + \beta = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

ملاحظه می‌شود که: $S = -\frac{b}{a}$.

ب) درستی نتیجه فوق را در معادله زیر هم بررسی می‌کنیم:

$$7x^2 - 7x = 0 \Rightarrow x(7x - 7) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \dots\dots\dots \\ \beta = \dots\dots\dots \end{cases}$$

$$S = \alpha + \beta = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots = \frac{7}{7} = -\frac{b}{a}$$

ت) درستی نتیجه بالا را در حالت کلی ثابت می‌کنیم. فرض کنیم برای معادله (۱)، مقدار Δ مثبت باشد. پس معادله دو ریشه حقیقی متمایز مثل α و β دارد:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ \beta = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \end{array} \right\} \Rightarrow S = \alpha + \beta = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \dots\dots\dots$$

$$P = \alpha\beta = \left(\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right) = \dots\dots\dots$$

ت) با مفروضات قسمت قبل، ثابت کنید: $P = \alpha\beta = \frac{c}{a}$.

با توجه به این فعالیت می‌توان گفت :

اگر α و β ریشه‌های معادله $(a \neq 0)$ $ax^2 + bx + c = 0$ باشند، آنگاه :
 $\alpha + \beta = S = -\frac{b}{a}$ و $\alpha \cdot \beta = P = \frac{c}{a}$

کار در کلاس

در معادله $x^2 + x + 5 = 0$ بدون حل معادله، مجموع و حاصل ضرب ریشه‌ها را به دست آورید.

تشکیل معادله درجه ۲ با استفاده از S و P

گاهی برای حل یک مسئله، لازم است برای آن معادله‌ای بنویسیم و سپس آن معادله را حل کنیم. در برخی موارد، این معادله درجه ۲ خواهد بود. مثلاً می‌خواهیم با مجموع و حاصل ضرب دو عدد، معادله درجه دوم بسازیم که آن دو عدد ریشه‌های معادله باشند. برای این کار فرض می‌کنیم آن دو عدد (ریشه‌های معادله)، α و β باشند. معادله مورد نظر را می‌توان به شکل زیر نوشت :

$$(x - \alpha)(x - \beta) = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 - Sx + P = 0$$

بنابراین نشان دادیم که :

معادله درجه دوم که مجموع ریشه‌های آن S و حاصل ضرب ریشه‌های آن P باشد را می‌توان به صورت $x^2 - Sx + P = 0$ نوشت.

کار در کلاس

۱ دو عدد حقیقی بیابید که مجموع آنها $1/5$ - و حاصل ضربشان 7 - باشد.

۲ آیا مستطیلی با محیط 11 cm و مساحت 6 cm^2 وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است، طول و عرض آن را مشخص کنید.

حل : اگر ابعاد مستطیل را α و β بنامیم، داریم :

$$\text{محیط} = 11 \Rightarrow 2(\alpha + \beta) = 11 \Rightarrow \alpha + \beta = \frac{11}{2} \Rightarrow \beta = \frac{11}{2} - \alpha$$

$$\text{مساحت} = 6 \Rightarrow \alpha \cdot \beta = 6 \Rightarrow \alpha \left(\frac{11}{2} - \alpha \right) = 6$$



الف) معادله بالا را ساده کنید و از حل آن α و β را به دست آورید.

ب) با استفاده از S و P و تشکیل یک معادله درجه دوم، این مسئله را حل کنید.

۳ معادله درجه دومی بنویسید که ریشه‌های آن $\frac{3 + \sqrt{5}}{2}$ و $\frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ باشند.

ماکزیم و مینیم تابع درجه دوم

سهمی با ضابطه $y = ax^2 + bx + c$ را در نظر می‌گیریم. از سال گذشته می‌دانیم که طول رأس این سهمی $x = -\frac{b}{2a}$ است.

الف) اگر $a > 0$ ، آنگاه دهانه سهمی رو به بالاست و به ازای $x = -\frac{b}{2a}$ کمترین (مینیم) مقدار تابع درجه دوم مورد نظر به دست می‌آید.

ب) اگر $a < 0$ ، آنگاه دهانه سهمی رو به پایین است و به ازای $x = -\frac{b}{2a}$ بیشترین (ماکزیم) مقدار تابع درجه دوم مورد نظر حاصل می‌شود.

مثال: ماکزیم یا مینیم تابع با ضابطه $f(x) = -x^2 + 2x + 4$ را در صورت وجود به دست آورید.

حل: چون $a = -1$ منفی است، پس دهانه سهمی رو به پایین است و این سهمی ماکزیم دارد. این تابع به ازای $x = -\frac{b}{2a} = 1$ بیشترین مقدار خود را خواهد داشت که برابر است با $f(1) = 4$.

تذکر: همچنان که در شکل دیده می‌شود، در این مثال نقطه $(1, 4)$ رأس سهمی و نقطه ماکزیم آن است. در این حالت منظور از مقدار ماکزیم سهمی، فرض این نقطه، یعنی ۴ است.

مثال: یک بنجره به شکل مستطیلی است که در بالای آن یک مثلث متساوی الاضلاع قرار گرفته است. اگر محیط بنجره ۴ m باشد، ابعاد مستطیل را طوری بیابید که بنجره حداکثر نوردهی را داشته باشد.

حل: با توجه به شکل داریم: $2x + 2y = 4 \Rightarrow y = 2 - \frac{x}{2}$ محیط بنجره

در کلاس دهم دیدیم که مساحت مثلث ABC از رابطه $S = \frac{1}{2} \times AB \times BC \times \sin B$ به دست می‌آید. بنابراین مساحت مثلث متساوی الاضلاع به ضلع x برابر $\frac{\sqrt{3}}{4} x^2$ است. (جزا ۱) پس:

$$S = x \cdot y + \frac{\sqrt{3}}{4} x^2$$

به جای y معادل آن را بر حسب x قرار می‌دهیم.



$$S = x \left(2 - \frac{x}{2} \right) + \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 = 2x - \frac{x^2}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} x^2$$

$$S = \frac{\sqrt{3}-2}{4} x^2 + 2x$$

این تابع دارای ماکزیم است (جزا ۱) و بیشترین مقدار آن به ازای $x = -\frac{b}{2a}$ حاصل می‌شود.

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}-2}{2}} = \frac{4}{2-\sqrt{3}} = 1.92(m)$$

$$y = 2 - \frac{x}{2} = 2 - \frac{1.92}{2} = 0.59(m)$$






رودخانه قول‌اوزن، ناحه اصلی سقندروه

کار در کلاس

۱ تعیین کنید کدام یک از سهمی‌های زیر ماکزیمم و کدام یک مینیمم دارند. سسی مقدار ماکزیمم یا مینیمم هر یک را مشخص کنید.

الف) $g(x) = -(x+1)^2 + 3$ ب) $h(x) = x^2 - 2x + 1$




۲ قرار است در کنار یک رودخانه، محوطه‌ای مستطیل شکل ایجاد کنیم. برای این کار لازم است سه ضلع محوطه زده‌کنی شود. اگر تنها هزینه نصب 10^6 متر زده‌وا در اختیار داشته باشیم. ابعاد مستطیل را طوری تعیین کنید که مساحت آن بیشترین مقدار ممکن گردد.



صفرهای تابع درجه ۲

همان گونه که می‌دانیم، نمودار هر تابع درجه دوم، یک سهمی است. به عنوان مثال فرض کنیم فوتبالیستی تویی را با زاویه 45° نسبت به سطح زمین و با سرعت اولیه 20 m/s شوت کند. معادله مسیر حرکت این توپ، یک تابع درجه دو با ضابطه $y = -\frac{1}{4}x^2 + x$ است که نمودار آن مانند شکل مقابل است. در این رابطه x مسافت افقی طی شده و y ارتفاع توپ از سطح زمین است.




الف) حداکثر ارتفاع توپ را به دست آورید.

ب) به نظر شما حداکثر مسافت افقی طی شده توسط توپ چقدر است؟

برای آنکه طول نقاط برخورد نمودار این تابع با محور x ‌ها را به دست آوریم، باید قرار دهیم $y=0$.

$$y=0 \Rightarrow x\left(\frac{-1}{4}x+1\right)=0 \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=40 \end{cases}$$

این نقاط را روی نمودار نشان دهید و توضیح دهید که این اعداد از نظر فیزیکی چه معنایی می‌دهند.



نقاط برخورد نمودار یک تابع مانند f با محور x ‌ها را صفرهای تابع می‌نامیم که در واقع ریشه‌های معادله $f(x)=0$ هستند. به عبارت دیگر، در این نقاط، مقدار تابع برابر صفر است.

همچنین عرض نقطه برخورد نمودار هر تابع مثل f با محور y ‌ها، همان $f(0)$ است. به عبارت دیگر در تابع درجه ۲ با ضابطه $f(x) = ax^2 + bx + c$ ، عدد ثابت c نشان‌دهنده محل برخورد نمودار آن با محور y ‌هاست. به عنوان مثال، به شکل مقابل توجه کنید.

مسئله: معادله سهمی مقابل را بنویسید.

حل: با توجه به شکل دیده می‌شود که نمودار تابع، محور افقی را در نقاطی با طول‌های ۱ و ۲ قطع کرده است. پس ضابطه آن به صورت زیر است:

$$y = a(x-1)(x-2)$$

با توجه به نمودار، مقدار a را به دست می‌آوریم.

$$\text{نقطه } (1, 4) \text{ روی سهمی است} \Rightarrow 4 = a(1-1)(1-2) \Rightarrow a = 2$$

$$\Rightarrow y = 2(x-1)(x-2) \Rightarrow y = 2x^2 - 6x + 4$$



گروه کلاسی

۱ همچنان که از سال قبل می‌دانیم، تعداد صف‌های تابع درجه دوم $y = ax^2 + bx + c$ را به کمک علامت Δ می‌توان تشخیص داد. همچنین رو به بالا بودن یا رو به پایین بودن دهانه سهمی از روی علامت a مشخص می‌شود. جدول زیر را کامل کنید.

Δ	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$a > 0$			
$a < 0$			

۲ دربارهٔ تابع درجه دوم $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ برای تشخیص علامت ریشه‌های احتمالی معادله $f(x) = 0$ می‌توانیم از علامت S و P کمک بگیریم. در هر یک از موارد زیر، مانند قسمت الف عمل کنید.

الف) $y = x^2 + 6x + 5$

ب) $y = x^2 + 4x - 5$

معادله \Rightarrow دو ریشه حقیقی متمایز دارد $\Rightarrow \Delta = 16 > 0$

$P = \frac{c}{a} = 5 > 0 \Rightarrow$ ریشه‌ها هم‌علامت‌اند

$S = -\frac{b}{a} = -6 < 0 \Rightarrow$ هر دو ریشه منفی‌اند

ب) $y = 2x^2 - 7x + 1$

ت) $y = -x^2 + 2x - 1$

۲ هرگاه نمودار تابع $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) را داشته باشیم، می‌توانیم به کمک آن، علامت ضرایب a ، b و c را مشخص کنیم. به عنوان مثال نمودار تابع f از مجموعه توابع داده شده زیر را در نظر می‌گیریم:

- دهانه سهمی رو به بالاست؛ پس a مثبت است.


– نمودار تابع f محور o ها را در قسمت منفی ها قطع کرده است؛ پس c منفی است.

– رأس سهمی در ربع چهارم قرار گرفته که در آن مقادیر a مثبت اند؛ پس:

$$\frac{-b}{2a} > 0 \Rightarrow b < 0$$

توجه داریم که با توجه به نمودار، مجموع دو ریشه، عددی مثبت است (جرا!!) و از این مطلب هم می‌توان منفی بودن علامت b را نتیجه گرفت.

خلاصه این اطلاعات در جدولی بعد آمده است. جدولی را کامل کنید.



ویژگی	تابع	f	a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n	p	q	r
علامت a		+										+			-	
علامت b		-										+			-	
علامت c		-										+			-	
تعداد ریشه‌های متساوی		دو										دو			صفر	
علامت ریشه یا ریشه‌ها		یکی منفی										یکی منفی			ریشه	
آبر صورت وجود		یکی مثبت										یکی صفر			ندارد	

۱ معادله‌های زیر را حل کنید.

الف) $x^4 - 8x^2 + 8 = 0$

ب) $3x^4 + 1 = 5x^2$

۲ معادله درجه دومی بنویسید که ریشه‌های آن $1 - \sqrt{2}$ و $1 + \sqrt{2}$ باشد.

۳ مقدار ماکزیمم یا مینیمم توابع با ضابطه‌های زیر را به دست آورید.

الف) $f(x) = -3x^2 + 8x - 5$

ب) $g(x) = 3x^2 + 6x + 5$

۴ موشکی که به‌طور عمودی روبه بالا شلیک شده، ثانیه پس از برتاب در ارتفاع h متری از سطح زمین قرار می‌گیرد که معادله آن به صورت

$$h(t) = 10 - t - 5t^2 \quad (t \geq 0)$$

الف) جقدر طول می‌کشد تا موشک به بالاترین ارتفاع ممکن خود برسد؟

ب) ارتفاع نقطه اوج را بیابید.

ب) چند ثانیه پس از برتاب، موشک به زمین بازمی‌گردد؟







۵ استادیومی به شکل مقابل در حال ساخت است که در آن $0 \leq x \leq 100$ و $0 \leq y \leq 100$ و نیم‌دایره‌ها

به شعاع $\frac{25}{2}$ هستند. اگر محیط استادیوم 150π متر باشد، x و y را طوری بیابید که:

الف) مساحت مستطیل حداکثر مقدار ممکن گردد.

ب) مساحت استادیوم حداکثر مقدار ممکن شود.

۶ ضابطه جبری سهمی‌های زیر را بنویسید.



معادلات گویا و معادلات رادیکالی

معادلات گویا



در برخی از اجزای بدن انسان، در بعضی گیاهان و همچنین در یارهای از بناها و آثار هنری ردیابی عدد طلایی مشاهده می‌شود. تحقیق در این زمینه انجام دهید و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.



ازگ تاریخی بم



صفحه‌ای از کتاب ریاضی دوم دبستان

مستطیل طلایی، مستطیلی است که نسبت مجموع طول و عرض آن به طول مستطیل برابر با نسبت طول به عرض آن باشد. به عبارت دیگر اگر طول و عرض مستطیل به ترتیب x و y باشند داشته باشیم: $\frac{x+y}{x} = \frac{x}{y}$. نسبت طول به عرض این مستطیل را نسبت طلایی می‌گویند.

مثال: عرض مستطیل را $y=1$ در نظر می‌گیریم تا مقدار نسبت طلایی را محاسبه کنیم:

$$\frac{x+1}{x} = \frac{x}{1}$$

با ضرب دو طرف این معادله در x می‌توان آن را از حالت کسری خارج کرد (با به‌طور معادلی در اینجا حاصل ضرب طرفین را مساوی حاصل ضرب وسطین قرار می‌دهیم):

$$x^2 = x + 1 \Rightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 5 \quad , \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \\ x_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

غیر قابل قبول

عدد $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ به عدد طلایی معروف است که مقدار تقریبی آن ۱.۶۱۸ می‌باشد. این عدد از دوران باستان مورد توجه بوده است.

از کلاس اول ابتدایی که با معادلاتی به شکل $x + 2 = 5$ مواجه شدیم، تقریباً همیشه درگیر حل معادله بوده‌ایم! گاهی به معادلاتی مانند $\frac{x+1}{x} = \frac{x}{1}$ برمی‌خوریم که در آنها مجهول در مخرج یک عبارت گویا (کسری یا صورت و مخرج چند جمله‌ای) قرار دارد. چنین معادلاتی را معادلات گویا می‌نامیم. همان‌طور که دیدیم:

برای حل یک معادله گویا می‌توان دو طرف تساوی را پس از تجزیه کردن مخرج‌ها، در کوچک‌ترین مضرب مشترک (ک.م.م) مخرج‌ها ضرب کرد تا معادله از شکل کسری خارج شود. جواب‌هایی به دست آمده نباید مخرج کسرها را صفر کنند و این جواب‌ها باید در معادله اولیه صدق کنند.

$$\frac{2x}{x^2-1} + \frac{2}{x+1} = \frac{2-x}{x^2-x} \quad (1)$$

۱ معادلهٔ مقابل را حل کنید.

الف) ابتدا در صورت امکان مخارج کسرها را به حاصل ضرب عوامل های اول تجزیه می کنیم:

$$\frac{2x}{(x-1)(x+1)} + \frac{2}{x+1} = \frac{2-x}{x(x-1)} \quad (2)$$

ب) در مخرج ها سه نوع عامل اولی متمایز وجود دارد: x ، $(x+1)$ و $(x-1)$ که بزرگ‌ترین توان هر کدام از آنها برابر \dots است؛ پس کمم مخرج ها عبارت است از \dots

ب) طرفین معادلهٔ (۲) را در $x(x-1)(x+1)$ ضرب می کنیم تا معادله از شکل کسری خارج شود.

$$x(x-1)(x+1) \left[\frac{2x}{(x-1)(x+1)} + \frac{2}{x+1} \right] = x(x-1)(x+1) \left[\frac{2-x}{x(x-1)} \right] \Rightarrow 2x^2 + 2x(x-1) = (x+1)(2-x)$$

ت) پس از ساده کردن، معادله $5x^2 - 2x - 2 = 0$ حاصل می شود.

ت) برای معادله درجه دوم اخیر، مقدار Δ را به دست آورید و معادله را حل کنید. آیا هر دو جواب به دست آمده مورد قبول اند؟ چرا؟

۲ خط یک متروی تهران به طول ۶۰ کیلومتر، میدان تجریش را به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (فَیْزِیَّهٔ سِزَّهٔ) متصل می کند. برای انجام یک آزمایش، قطاری مسیر شمال به جنوب این خط را با سرعت ثابت ۱۰ کیلومتر بر ساعت و بدون توقف در ایستگاه‌ها طی می کند. اگر در مسیر جنوب به شمال، از سرعت قطار 10 km/h کاهنده شود، زمان بازگشت نیم ساعت طولانی‌تر از زمان رفت خواهد شد. مطلوب است محاسبهٔ طول زمان رفت و زمان برگشت این قطار.

الف) توضیح دهید، چرا زمان رفت از رابطهٔ $\frac{60}{v}$ به دست می آید؟

ب) عبارتی بر حسب v بنویسید که زمان برگشت را نشان دهد.

ب) توضیح دهید که چرا معادلهٔ $\frac{60}{v} = \frac{60}{v} + \frac{1}{2}$ برقرار است.

ت) طرفین این معادله را در کمم مخرج ها ضرب کنید تا به یک معادله درجه دوم تبدیل شود.

ت) از حل معادله حاصل، سرعت قطار در هر دو جهت را بیابید و به کمک آن، زمان رفت و زمان برگشت قطار را به دست آورید.



۱ معادلات زیر را حل کنید. آیا تمام جواب‌های به دست آمده مورد قبول هستند؟

الف) $\frac{3}{x^2} - 12 = 0$

ب) $\frac{2}{k} - \frac{3k}{k+2} = \frac{k}{k^2 + 2k}$

ب) $\frac{3}{x} - \frac{2}{x-3} = \frac{12}{9-x^2}$

۱ دیر ریاضی آرمان هر هفته یک آزمون ۱۰ امتیازی برگزار می‌کند. پس از ۵ هفته، آرمان جمعاً ۳۶ امتیاز کسب کرده بود؛ یعنی میانگین امتیاز هر آزمون او در پنج هفته اول به صورت زیر بود:

$$\frac{36}{5} = 7 \frac{1}{5}$$

او از هفته ششم به بعد در تمام آزمون‌ها امتیاز ۹ را کسب کرد؛ به طوری که میانگین امتیاز کل آزمون‌هایش برابر ۸ شد. می‌خواهیم بدانیم از هفته ششم به بعد، آرمان در چند آزمون متوالی نمره ۹ گرفته است. برای حل مسئله می‌توان به روش زیر عمل کرد:

الف) اگر تعداد آزمون‌ها از هفته ششم به بعد برابر n باشد. مجموع امتیازات او در این مدت $9n$ خواهد شد. عبارتی کسری بر حسب n بنویسید که نشان دهنده میانگین امتیاز تمام آزمون‌های ریاضی هفتگی آرمان باشد.

$$\frac{9n + \dots}{5 + \dots}$$

ب) کسر مربوط به قسمت الف را برابر ۸ قرار دهید و n را بیابید. سپس جواب به دست آمده را امتحان کنید.

مثال: اگر دو ماشین جمن زنی با هم کار کنند، می‌توانند در ۴ ساعت جمن یک زمین فوتسال را کوتاه کنند. با فرض اینکه سرعت کار یکی از آنها دو برابر دیگری باشد، هر یک از آنها به تنهایی در چند ساعت می‌توانند این کار را انجام دهند؟
حل: ماشین سریع‌تر را A و دیگری را B می‌نامیم. فرض کنیم t مدت زمانی باشد که ماشین A به تنهایی قادر است کل کار را انجام دهد. جدول زیر را کامل کنید.

ماشین	زمان انجام کل کار	مقداری از کار که در ۱ ساعت قابل انجام است.
A	t	$\frac{1}{t}$
B	$2t$	$\frac{1}{2t}$
A و B با هم	4	$\frac{1}{4}$

با توجه به جدول، معادله زیر را می‌توان نوشت:

$$\frac{1}{t} + \frac{1}{2t} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{2}{2t} + \frac{1}{2t} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{3}{2t} = \frac{1}{4} \Rightarrow t = 6$$

زمان ماشین A $t = 6$

$$\Rightarrow 2t = 12$$

زمان ماشین B $2t = 12$

معادلات رادیکالی


فرض کنید بخواهیم نقطه‌ای را روی محور x ‌ها بیابیم که فاصله آن از نقطه $P(2, 3)$ برابر ۵ باشد. مسئله چند جواب دارد؟

برای این کار فرض می‌کنیم مختصات نقطه مورد نظر به صورت $A(x, 0)$ باشد. مقدار x را بدست می‌آوریم.

$$AP = \sqrt{(x_A - x_P)^2 + (y_A - y_P)^2} = \sqrt{(x - 2)^2 + (3 - 0)^2}$$

$$AP = 5 \Rightarrow \sqrt{(x - 2)^2 + 9} = 5 \quad (3)$$

معادلاتی مانند (۳) که در آن عبارت رادیکالی شامل مجهول وجود دارد، یک معادله رادیکالی نامیده می‌شود.^۱



برای حل یک معادله رادیکالی می‌توان جملات را طوری در طرفین تساوی جابه‌جا کرد که یک عبارت رادیکالی به تنهایی در یک طرف تساوی قرار گیرد. سپس با به توان رساندن طرفین معادله و در صورت لزوم با تکرار این عمل، معادله را از شکل رادیکالی خارج کرد. پس از حل معادله باید مطمئن شویم که جواب‌های حاصل در معادله اولیه صدق می‌کنند.

برای حل معادله (۳) در بالا، اگر طرفین تساوی را به توان دو برسانیم، خواهیم داشت:

$$(x - 2)^2 + 9 = 25 \Rightarrow \begin{cases} (x - 2) = 4 \Rightarrow x = 6 \Rightarrow A(6, 0) \\ (x - 2) = -4 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow B(-2, 0) \end{cases}$$

تذکره: عبارت رادیکالی معادله (۳) همواره با معناست؛ چون در آن، حاصل‌زیر رادیکال همواره مثبت است. در این حالت می‌گوییم دامنه منفی برای \mathbb{R} است و می‌توانیم بنویسیم $D = (-\infty, +\infty)$

مثال: در معادله $2\sqrt{x} = \sqrt{3x - 4}$ ، دامنه متغیر به صورت $D = [1, +\infty)$ است (اجرا؟).
با به توان رساندن دو طرف معادله داریم:

$$4x = 3x - 4 \Rightarrow x = -4 \quad (\text{غیر قابل قبول})$$

چون جواب به دست آمده خارج از دامنه منفی است، قابل قبول نیست. شایان ذکر است که جواب‌های درون دامنه نیز به شرطی مورد قبول اند که در معادله اصلی صدق کنند.

^۱ در این کتاب، تنها معادلات رادیکالی با درجه ۲ مورد بحث قرار می‌گیرد.

۱ معادلات زیر را مانند نمونه حل کنید. آیا تمام جواب‌های حاصل، قابل قبول اند؟

الف) $2\sqrt{2t-1} - t = 1$

$$2\sqrt{2t-1} = t+1$$

$$\Rightarrow 4(2t-1) = (t+1)^2$$

$$\Rightarrow t^2 - 6t + 5 = 0$$

$$\Rightarrow (t-1)(t-5) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t=1 \\ t=5 \end{cases}$$

ب) $2z = 1 - \sqrt{3-z}$

$$\sqrt{3-z} = 1 - 2z$$

$$\Rightarrow 3-z = 1 + 4z^2 - 4z$$

$$\Rightarrow 4z^2 - 3z - 1 = 0$$

$$\Delta = 25, z = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{2(4)} \Rightarrow \begin{cases} z=1 \\ z=-\frac{1}{4} \end{cases}$$

غیر قابل قبول

ب) $\sqrt{z+7} = \sqrt{z} + 1$

ب) $\frac{1}{\sqrt{u-3}} - \frac{2}{\sqrt{u}} = 0$

ب) $2 + \sqrt{2z^2 - 5z + 2} = z$

۲ توضیح دهید که چرا معادلات زیر فاقد ریشه حقیقی اند.

الف) $\sqrt{z} + z = 0$

ب) $\sqrt{z-2} + \sqrt{2z+3} + 1 = 0$

ب) $\sqrt{1-z} + \sqrt{z-2} = 0$

۱ هر یک از معادلات زیر را حل کنید.

الف) $\frac{1}{z} + \frac{1}{z-2} = 5$

ب) $\frac{10}{z} - \frac{15}{z} = \frac{20}{z} - 5$

ب) $\frac{2z}{z-3} + \frac{z+1}{z+2} = \frac{z-1}{z+4}$

ب) $\sqrt{z+4} \neq z$

ب) $z = \sqrt{6z-8}$

ج) $z + \sqrt{z} = 6$

ج) $\sqrt{z+1} - \sqrt{2z-5} = 1$

ج) $\sqrt{m} + \frac{1}{\sqrt{m}} = 2$

۲ علی به همراه چند نفر از دوستان خود، ماهانه یک مجله ادبی ۱۶ صفحه‌ای منتشر می‌کنند. پس از حروف جنبی مطالب، او معمولاً ۲ ساعت برای ویرایش ادبی مجله وقت صرف می‌کند. اگر رضا به او کمک کند، کار ویرایش حدود ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه به طول می‌انجامد. حال اگر رضا بخواهد به تنهایی کار ویرایش یک شماره از مجله را انجام دهد، نیازمند چه میزان وقت خواهد بود؟



قلعه بهستان - مهاباد استان زنجان

۳ اگر یک شیء از بالای ساختمانی به ارتفاع ۵ متر سقوط آزاد کند، پس از t ثانیه


در ارتفاع h متری از سطح زمین قرار خواهد داشت؛ به طوری که $t = \sqrt{10 - \frac{h}{5}}$.

این جسم، دو ثانیه پس از سقوط در چه ارتفاعی نسبت به سطح زمین قرار دارد؟

۴ الف) عدد صحیحی بیاید که تفاضل آن از جذرش برابر نصف آن عدد باشد. مسئله چند جواب دارد؟

ب) عدد صحیحی بیاید که تفاضل جذرش از آن عدد برابر نصف آن باشد. مسئله چند جواب دارد؟

۵ معادله‌ای شامل مجموع دو عبارت رادیکالی بنویسید که عدد ۱ یکی از ریشه‌های آن باشد. پاسخ خود را یا پاسخ دوستان خود مقایسه کنید.



پل ویدمان در استانبول

اسانل از بنو تولد ناگزیر به انسانی با فضای هندسی و شکل‌های هندسی است و هندسه در طول تاریخ مشکل‌گشای او در جهت حل مسائل محیط پیرامونی‌اش بوده است. ساخت پل‌ها نمونه‌ای بارز از کاربری هندسه در زندگی روزمره اسانل است.

تقسیم‌های هندسی

استدلال و قضیه تالس

نشابه مثلث‌ها

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس اول

ترسیم‌های هندسی

امکان از دیرباز برای حل بسیاری از مسائل خود از ترسیم‌های هندسی کمک گرفته است. فرض کنید بخواهیم زمینی مثلث شکل را تنها یا کشیدن یک دیوار مستقیم به دو قسمت هم‌مساحت تقسیم نماییم. چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟



فعالیت

۱ یک نقطه ثابت در صفحه، مانند O را در نظر بگیرید و تمام نقاطی را که به فاصله ثابت ۲ سانتی‌متر از آن هستند در نظر بگیرید. این نقاط چه شکلی را تشکیل می‌دهند؟

۲ یک دایره به مرکز O و به شعاع ۲ سانتی‌متر بکشید و یک نقطه دلخواه روی آن در نظر بگیرید. فاصله این نقطه تا مرکز دایره چقدر است؟

نتیجه: دایره $C(O, r)$ (بخوانید دایره C به مرکز O و به شعاع r) را در نظر بگیرید. هر نقطه که از نقطه O به فاصله r باشد..... دایره قرار دارد و هر نقطه که..... دایره قرار ندارد از نقطه O به فاصله r است.

۳ مانند آنچه برای نقاط روی دایره انجام داده شد، یک‌بار برای نقاط داخل دایره و یک‌بار برای نقاط بیرون دایره نتایج مشابهی به دست آورید.

۴ خطی مانند l در نظر بگیرید. تمام نقاطی را که به فاصله ۲ سانتی‌متر از خط l هستند مشخص کنید. این نقاط چه شکلی یا شکل‌هایی را تشکیل می‌دهند؟

۵ نقطه P به فاصله ۱ سانتی‌متر از خط l قرار دارد.



الف) تمام نقاطی را که به فاصله ۲ سانتی‌متر از نقطه P هستند، مشخص کنید.

ب) نقاطی از خط l را که به فاصله ۲ سانتی‌متر از نقطه P هستند، مشخص کنید.


۶ نقاط A و B را به فاصله ۵ سانتی‌متر از هم در نظر بگیرید. به مرکز A و به شعاع ۴ سانتی‌متر یک کمان رسم کنید و سپس به مرکز B و به شعاع ۲ سانتی‌متر کمانی دیگر رسم کنید تا دو کمان یکدیگر را در نقطه‌ای مانند X و Y قطع کند.

الف) اندازه اضلاع مثلث‌های AXB و $A Y B$ را مشخص کنید.

ب) توضیح دهید که چگونه می‌توانید مثلثی به طول ضلع‌های داده شده ۴ و ۵ و ۷ رسم کنید.



P






برخی خواص عمود منصف و ترسیم آن

۱- در شکل مقابل پاره خط AB و عمود منصف آن مشخص شده‌اند. نقطه‌ای دلخواه مانند W روی عمود منصف AB در نظر بگیرید و نشان دهید W از دوسر AB به یک فاصله است.

نتیجه ۱: هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دوسر آن پاره خط



۲- پاره خط AB و نقطه W مانند شکل مقابل به گونه‌ای قرار دارند که W از دوسر AB به یک فاصله است (یعنی $AW = BW$). نشان دهید W روی عمود منصف AB قرار دارد. **اِراهنمایی:** از W به A و B و به وسط AB وصل کنید و با استفاده از هم‌نهستی متنت‌ها نشان دهید W روی عمود منصف AB قرار دارد.

نتیجه ۲: هر نقطه که از دوسر یک پاره خط به فاصله یکسان باشد

از (۱) و (۲) نتیجه می‌گیریم: هر نقطه که روی عمود منصف یک پاره خط باشد از و هر نقطه که از روی عمود منصف آن پاره خط قرار دارد.

فعالیت



۱- نقطه P در صفحه مشخص شده است. جلد خط می‌توانید رسم کنید که از نقطه P عبور نمایند؟

۲- دو نقطه A و B در صفحه مشخص شده‌اند. جلد خط متناهی می‌توانید رسم کنید که از هر دو نقطه A و B عبور نمایند؟

۳- به نظر شما برای اینکه یک خط مشخص شود حداقل جلد نقطه از آن باید مشخص شده باشد؟

رسم عمود منصف یک پاره خط داده شده

می‌خواهیم عمود منصف پاره خط AB را رسم کنیم.

۱- دهانه برگار را بیش از نصف طول AB باز کنید و یک بار به مرکز نقطه A و بار دیگر به همان شعاع و به مرکز B کمان بزنید تا دو کمان یکدیگر را در نقاطی مانند P و Q قطع کنند.

۲- آیا نقاط P و Q تقاطعی متعلق به عمود منصف AB هستند؟ چرا؟

۳- آیا با داشتن نقاط P و Q می‌توان عمود منصف AB را مشخص کرد؟ چرا؟

۴- حال عمود منصف AB را رسم کنید.

رسم خط عمود بر یک خط، از نقطه‌ای روی آن

خط d و نقطه M روی آن مانند شکل مشخص شده‌اند. می‌خواهیم خطی رسم کنیم که از M بگذرد و بر خط d عمود باشد.



۱- به کمک پرگار نقاطی مانند A و B بر خط d بیابید که $AM=MB$ باشد.

۲- عمود منصف پاره خط AB را رسم کنید.

۳- عمود منصف پاره خط AB خطی است که بر خط d و از نقطه

رسم خط عمود بر یک خط، از نقطه‌ای غیر واقع بر آن

خط d و نقطه P مانند شکل داده شده‌اند. می‌خواهیم خطی رسم کنیم که از نقطه P بگذرد و بر خط d عمود باشد.



۱- به کمک پرگار نقاطی مانند A و B را بر خط d به گونه‌ای بیابید که از نقطه P به یک فاصله باشد.

۲- عمود منصف پاره خط AB را رسم کنید.

۳- آیا عمود منصف پاره خط AB از نقطه P می‌گذرد؟ چرا؟

عمود منصف پاره خط AB بر خط d و از نقطه

رسم خط موازی با خط داده شده از نقطه‌ای غیر واقع بر آن

خط d و نقطه P مانند شکل مقابل داده شده‌اند. می‌خواهیم خطی رسم کنیم که از نقطه P بگذرد و با خط d موازی باشد.



۱- خط d_1 را به گونه‌ای رسم کنید که از نقطه P بگذرد و بر خط d عمود باشد.

۲- خط d_2 را به گونه‌ای رسم کنید که از نقطه P بگذرد و بر خط d_1 عمود باشد.


۳- خط d_2 نسبت به خط d چه وضعیتی دارد؟ چرا؟! (خط d_1 را مورب در نظر بگیرید)

برخی خواص نیمساز و ترسیم آن

۱- در شکل مقابل نیم خط Oa نیمساز زاویه $\angle O$ است. فرض کنید P یک نقطه دلخواه روی Oa باشد. ثابت کنید فاصله نقطه P از دو ضلع زاویه $\angle O$ یکسان است. (یعنی اگر از نقطه P عمودهایی بر Oa و Ob رسم کنیم، طول آنها باهم برابر است.)




نتیجه ۱: هر نقطه روی نیمساز یک زاویه، از دو ضلع آن زاویه



۲- در شکل مقابل فاصله نقطه P از دو ضلع زاویه $\angle O$ یکسان است. نشان دهید که نقطه P روی نیمساز زاویه قرار دارد.
(راهنمایی: پاره خط QP را و دو عمود از نقطه P بر OA و OB رسم کنید و با استفاده از هم‌نهشی مثلث‌ها نشان دهید OP همان نیمساز زاویه $\angle O$ است.)


نتیجه ۲: هر نقطه که از دو ضلع یک زاویه به فاصله یکسان باشد، روی

از (۱) و (۲) نتیجه می‌گیریم: هر نقطه که روی یک زاویه قرار داشته باشد، از و هر نقطه که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشد، روی آن زاویه قرار دارد.



۳- رسم نیمساز یک زاویه
الف) زاویه $\angle O$ را در نظر بگیرید. به مرکز O و به شعاع دلخواه کمانی رسم کنید تا نیم خط‌های OA و OB را در نقاطی مانند P و Q قطع کند.
- طول پاره خط‌های OP و OQ نسبت به هم چگونه‌اند؟
ب) دهانه PQ را کمی بیش از نصف طول پاره خط PQ باز کنید و یک باز به مرکز P و باز دیگر به مرکز Q کمانی رسم کنید تا دو کمان مانند شکل یکدیگر را در نقطه‌ای مانند W قطع کنند. طول پاره خط‌های PW و QW نسبت به هم چگونه‌اند؟
ب) پاره خط‌های WP ، WO ، WQ را رسم کنید. دو مثلث OPW و OQW نسبت به هم چگونه‌اند؟ چرا؟
- اندازه زاویه‌های POW و QOW نسبت به هم چگونه‌اند؟ چرا؟
- پاره خط OW زاویه $\angle O$ است.

تمرین



۱ الف) دو پاره خط AB و CD مطابق شکل داده شده‌اند. نقطه‌ای بیابید که از دو نقطه A و B به یک فاصله باشد و از دو نقطه C و D نیز به یک فاصله باشد.
ب) نقطه مورد نظر در قسمت الف) را O می‌نامیم. اگر نقطه O روی عمود منصف پاره خط BC باشد و G دایره‌ای به مرکز O و به شعاع OA باشد، رأس‌های چهارضلعی $ABCD$ نسبت به دایره G چه وضعیتی دارند؟ چرا؟

۱ منتهی دلخواه رسم کنید و آن را ABC بنامید. عمود منصف های دو ضلع این مثلث را رسم کنید و نقطه برخورد آنها را O بنامید. به مرکز O و به شعاع OA یک دایره رسم کنید. نقاط B و C نسبت به این دایره چه وضعیتی دارند؟ چرا؟

۲ منتهی دلخواه رسم کنید و آن را ABC بنامید. نیمسازهای دو زاویه این مثلث را رسم کنید و نقطه برخورد آنها را O بنامید. از نقطه O بر سه ضلع مثلث عمود رسم کنید و بای یکی از عمودها را H بنامید. به مرکز O و به شعاع OH دایره ای رسم کنید. اضلاع مثلث ABC نسبت به این دایره چه وضعیتی دارند؟ چرا؟

۱ فرض کنید نقطه A به فاصله ۴ سانتی متر از خط l باشد. روش رسم هر یک از مثلث های زیر را توضیح دهید.

(الف) مثلثی متساوی الساقین که A یک رأس آن و قاعده آن بر خط l منطبق باشد.

(ب) مثلثی که شرایط (الف) را داشته باشد و طول ساق آن ۶ سانتی متر باشد.

(ج) مثلثی رسم کنید که شرایط قسمت (الف) را داشته باشد و مساحت آن 8cm^2 باشد.

•



آبشار نموی خوزستان

نسبت و تناسب

در پایه‌های قبل با دو مفهوم نسبت و تناسب و برخی خواص ابتدایی آنها آشنا شده‌اید. می‌دانیم که هر دو نسبت مساوی یک تناسب تشکیل می‌دهند.

می‌دانیم که اگر یک مقدار ثابت را یا دو طرف یک تساوی جمع و یا تفریق کنیم، تساوی دوباره برقرار خواهد بود. همچنین اگر دو طرف یک تساوی را در یک مقدار ضرب کنیم یا به یک مقدار غیر صفر تقسیم نماییم، تساوی برقرار می‌ماند. با توجه به این مطلب هر یک از خواص زیر را به راحتی می‌توان ثابت کرد.

کار در کلاس

۱) با فرض اینکه تمام مخرج‌ها مخالف صفرند و با توجه به نکات گفته شده، در بالا هر یک از موارد زیر را ثابت کنید.

$$\text{الف) } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc \quad (\text{طرفین وسطین})$$

$$\text{ب) } ad = bc \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad (\text{تبدیل حاصل ضرب به تناسب})$$

$$\text{ب) } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{d}{c} \quad (\text{معکوس کردن تناسب})$$

$$\text{ت) } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \begin{cases} \frac{a}{a} = \frac{a}{a} \\ \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \\ \frac{a}{c} = \frac{b}{d} \end{cases} \quad (\text{تعویض جای طرفین با وسطین})$$

$$\text{ت) } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \begin{cases} \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} \\ \frac{a}{a+b} = \frac{c}{c+d} \end{cases} \quad (\text{ترکیب نسبت در صورت یا مخرج})$$

راهنمایی: در قسمت (ت) برای اثبات اولین تناسب به دو طرف تساوی عدد ۱ را اضافه کنید و برای اثبات تناسب دوم ابتدا کسرها را معکوس نمایید، سپس به دو طرف عدد ۱ را اضافه کنید.

$$\text{ج) } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \begin{cases} \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d} \\ \frac{a}{b-a} = \frac{c}{d-c} \end{cases} \quad (\text{تفضیل نسبت در صورت یا مخرج})$$

راهنمایی: در قسمت (ج) برای اثبات اولین تناسب از دو طرف تساوی عدد ۱ را کم کنید و برای اثبات تناسب دوم ابتدا کسرها را معکوس کرده، سپس از دو طرف عدد ۱ را کم کنید.

۱ با توجه به خواص اثبات شده در ۱ موازنه زیر را کامل کنید.

$$\text{الف) } \frac{5}{14} = \frac{15}{42} \Rightarrow 5x = 15x$$

$$\text{ب) } 3 \times 40 = 12 \times 10 \Rightarrow \frac{3}{12} = \frac{10}{40}$$

$$\text{ب) } \frac{7}{10} = \frac{21}{30} \Rightarrow \frac{7}{10} = \frac{7}{10}$$

$$\text{ن) } \frac{6}{11} = \frac{18}{33} \Rightarrow \frac{6}{11} = \frac{6}{11} \quad , \quad \frac{33}{11} = \frac{33}{11}$$


$$\text{ن) } \frac{4}{14} = \frac{10}{35} \Rightarrow \frac{18}{14} = \frac{18}{14} \quad , \quad \frac{4}{18} = \frac{4}{18}$$

$$\text{ج) } \frac{5}{12} = \frac{10}{24} \Rightarrow \frac{-7}{12} = \frac{-7}{12} \quad , \quad \frac{5}{-7} = \frac{5}{-7}$$



سد باغکی در شهرستان خوانسار - استان اصفهان

استدلال، قضیه تالس و تعمیم آن




در شکل مقابل داریم: $D_1E_1 \parallel BC$ و $D_2E_2 \parallel BC$ و $D_3E_3 \parallel BC$. این اطلاعات را می‌توان به این صورت نشان داد: $D_iE_i \parallel BC$ برای $1 \leq i \leq 3$
 - اندازه باره خط‌های زیر را با خط‌کش مشخص کرده و در کسرها جایگزین کنید و نسبت‌های برابر در ستون‌های متناظر را مشخص نمایید.

$$\frac{AD_1}{D_1B} = \frac{AE_1}{E_1C}$$

$$\frac{AD_2}{D_2B} = \frac{AE_2}{E_2C}$$

$$\frac{AD_3}{D_3B} = \frac{AE_3}{E_3C}$$



- اگر باره خط DE مانند شکل روبرو موازی ضلع BC از مثلث ABC باشد، حدس می‌زنید نسبت کدام باره خط‌ها با هم برابر باشند؟

_____ = _____

آیا می‌توان نتیجه گرفت اگر خطی موازی یکی از اضلاع مثلث رسم شود، همواره تساوی مشابه بالا برقرار است؟

در سوال‌های قبل دیدید که نمی‌توان به درست بودن نتیجه‌ای که بر اساس مشاهده چند مورد به دست آمده باشد، مطمئن بود.


این نوع از استدلال که در آن با مشاهده و بررسی یک موضوع در چند حالت، نتیجه‌ای کلی از آن گرفته می‌شود، یعنی «از جزء به کل می‌رسیم»، استدلال استقرایی نامیده می‌شود.

استدلال استنتاجی، استدلالی است که بر اساس نتیجه‌گیری منطقی بر پایه واقعیت‌هایی که درستی آنها را پذیرفته‌ایم، بیان می‌شود.

در ریاضیاتی که تاکنون خوانده‌اید، با مواردی از استدلال‌های استنتاجی مواجه شده‌اید. در ادامه با استدلال استنتاجی، نتیجه‌ای را که با استدلال استقرایی به دست آوردیم، ثابت خواهیم کرد.

قضیه تالس

فعالیت



فرض کنید مانند شکل مقابل، پاره خط DE موازی ضلع BC باشد.

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

می خواهیم نشان دهیم:

۱ از نقطه D به E و از C به B وصل کنید. مساحت های مثلث های DEB و DEC که آنها را با S_{DEB} و S_{DEC} نشان می دهیم، با هم برابرند. چرا؟

۲ از نقطه E به ضلع AB عمود کنید و پای عمود را H_1 بنامید. سپس از D به ضلع AC عمود کنید و پای عمود را H_2 بنامید.

$$\frac{S_{ADE}}{S_{DEB}} = \frac{\frac{1}{2} EH_1 \times AD}{\frac{1}{2} EH_1 \times DB} = \frac{AD}{DB}$$

$$\frac{S_{ADE}}{S_{DEC}} = \frac{\frac{1}{2} DH_2 \times AE}{\frac{1}{2} DH_2 \times EC} = \frac{AE}{EC}$$


۳ از (۱) و (۲) و (۳) نتیجه می شود: $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$. چرا؟

برخی نتایج مهم و پرکاربرد که با استدلال استنتاجی به دست می آیند، قضیه نامیده می شوند.

نتیجه بالا قضیه ای از تالس است. همان گونه که مشاهده کردید، رابطه بین طول های پاره خط هایی را که توسط خطی موازی یکی از اضلاع مثلث، بر دو ضلع دیگر آن مثلث به وجود می آید، بیان می کند.


کار در کلاس

۱ در شکل پاره خط های GH و BC موازی اند. اندازه پاره خط های AO و HO را به دست آورید.



اندیسولوف و ریاضی دان که حدود ۴۲۳ سال قبل از میلاد در نواحی غربی ترکیه امروزی به دنیا آمد. اثبت بسیاری از قضایای مهم هندسی را به او نسبت داده اند.

۱ با تشکیل یک معادله، مقدار x و اندازه پاره‌خط‌های AI و IJ را به دست آورید.



تعمیم قضیه تالس

قضیه


۱ در شکل مقابل $DE \parallel BC$

الف) تناسب قضیه تالس را بنویسید.

ب) به کمک ترکیب نسبت در مخرج تناسب $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ را نتیجه بگیرید.

ب) به کمک تفکیک نسبت در صورت از تناسب به دست آمده در (ب) تناسب $\frac{DB}{AB} = \frac{EC}{AC}$ را نتیجه بگیرید.


توجه کنید که تناسب‌های به دست آمده در (ب) و (ج) صورت‌های دیگر قضیه تالس است.



۲ در مثلث ABC پاره‌خط DE موازی ضلع BC است. ابتدا تناسب قضیه تالس را

بنویسید. سپس با توجه به ویژگی‌های تناسب و تکمیل تساوی‌های زیر، تناسب‌های دیگری را از قضیه تالس نتیجه بگیرید.

$$\frac{AD}{DB} = \dots \Rightarrow \begin{cases} \frac{DB}{DA} = \dots & \frac{BD}{BA} = \dots & \frac{AE}{ED} = \dots \\ \frac{AD}{AB} = \dots & \frac{AB}{AD} = \dots & \end{cases}$$



۲

الف) در شکل پاره‌خط‌های DE و BC موازی اند. با توجه به قضیه تالس داریم: $\frac{AD}{AB} = \dots$

ب) پاره‌خط EF را موازی AB رسم می‌کنیم. بنابراین داریم: $\frac{BF}{BC} = \dots$


ب) با توجه به قسمت‌های الف) و (ب) داریم: $\frac{AD}{AB} = \frac{AC}{BC} = \frac{BC}{AC}$

ت) چهارضلعی $DEFB$ چه نوع چهارضلعی‌ای است؟

پاره‌خط BF یا کدام پاره‌خط برابر است؟ $BF = \dots$

ت) با توجه به قسمت‌های (ب) و (ت) داریم: $\frac{AD}{AB} = \frac{AC}{BC} = \frac{BC}{AC}$

این رابطه تعمیم قضیه تالس است.



تار در کلاس

در شکل باره خط PQ موازی با ضلع BC است. دوستی با نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

الف) $\frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC} = \frac{PQ}{BC}$


ب) $\frac{AP}{AB} = \frac{AQ}{AC} = \frac{PQ}{BC}$

پ) $\frac{PB}{AP} = \frac{QC}{AQ}$

ت) $\frac{PB}{AB} = \frac{QC}{AC} = \frac{PQ}{BC}$

ث) $\frac{PB}{AB} = \frac{QC}{AC}$

ج) $\frac{AB}{AP} = \frac{AC}{AQ} = \frac{BC}{PQ}$



اگر فرض و حکم یک قضیه را جابه‌جا کنیم، آنچه حاصل می‌شود، «عکس قضیه» است. عکس یک قضیه می‌تواند درست یا نادرست باشد.

در مثال‌های زیر قضیه و عکس آن آمده است.

مثال ۱:

قضیه: اگر یک چهارضلعی متوازی‌الاضلاع باشد، آنگاه قطرهاش یکدیگر را نصف می‌کنند.

عکس قضیه: اگر در یک چهارضلعی قطرها یکدیگر را نصف کنند، آنگاه آن چهارضلعی متوازی‌الاضلاع است.

مثال ۲:

قضیه: اگر دو ضلع از یک مثلث با هم برابر باشند، آنگاه ارتفاع‌های وارد بر آن دو ضلع نیز با هم برابرند.

فرض: $AB=AC$

حکم: $BH=CH$

عکس قضیه: اگر دو ارتفاع از یک مثلث با هم برابر باشند، آنگاه اضلاع نظیر به آن ارتفاع‌ها نیز با هم برابرند.



فرض: $BH=CH$

حکم: $AB=AC$

مثال ۳: در قضیه نائس فرض و حکم به صورت زیر است.

فرض: $DE \parallel BC$

حکم: $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$



با توجه به آنچه گفته شد، فرض و حکم عکس قضیه نالس را بنویسید.

فرض:

حکم:

به عبارت دیگر عکس قضیه نالس می‌گوید هرگاه پاره خط DE مانند شکل پاره خط‌های AB و AC را به گونه‌ای قطع کرده باشد که داشته باشیم $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ، در این صورت پاره خط DE موازی پاره خط BC است. به نظر شما عکس قضیه نالس درست است یا نه؟ کمی بعد به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت.

معمولاً برای نوشتن عکس قضیه، قسمت اصلی فرض با حکم جابه‌جا می‌شود و قسمت‌هایی از فرض ممکن است هم در قضیه و هم در عکس آن ثابت باشند؛ مثلاً در مثال قبل مثلث بودن ABC هم در خود قضیه و هم در عکس آن جزء مفروضات است.

برهان خلف

نوعی از استدلال که در مسائل ریاضی و هندسی از آن استفاده می‌شود، برهان غیرمستقیم یا برهان خلف است. در برهان خلف به جای اینکه به‌طور مستقیم از فرض شروع کنیم و به درستی حکم برسیم، فرض می‌کنیم حکم درست نباشد (فرض خلف) و به یک تناقض یا به یک نتیجه غیرممکن می‌رسیم و به این ترتیب فرض خلف باطل و درستی حکم ثابت می‌شود.

B (حکم) $\Rightarrow A$ (فرض): مسئله

اثبات به روش برهان خلف:



پس نتیجه می‌گیریم حکم B درست است، زیرا در صورت نادرستی B طبق استدلال فوق به یکی از نتایج ۱ یا ۲ می‌رسیم که هیچ‌کدام نمی‌تواند اتفاق بیفتد.

مثال: اگر $n \in \mathbb{N}$ و n^2 عددی فرد باشد، آن‌گاه n نیز عددی فرد است.

حل:

با استفاده از برهان خلف فرض کنیم مسئله نادرست باشد؛ یعنی n عددی فرد نباشد؛ بنابراین n عددی زوج خواهد بود و می‌توان

نوشت $n=2k$ به طوری که k یک عدد طبیعی باشد.



بنابراین $n^2=4k^2=2(2k^2)$ که عددی زوج است و یا فرض مسئله در تناقض است؛ لذا از ابتدا n نمی‌توانست عددی زوج باشد.

مثال: فرض کنیم AD نیمساز زاویه A از مثلث ABC باشد. اگر $BD \neq DC$ باشد، آن‌گاه $AB \neq AC$.

حل:

با استفاده از برهان خلف فرض می‌کنیم حکم نادرست باشد.

بنابراین داریم $AB = AC$ (فرض خلف) در این صورت خواهیم دانست $\hat{A}BD \cong \hat{A}CD$ (حرا). از این هم‌نهشتی نتیجه خواهد شد $BD = DC$ است، که با فرض مسئله در تناقض است. لذا از ابتدا فرض $AB = AC$ نادرست بوده است، بنابراین $AB \neq AC$ است. حل می‌خواهیم با استفاده از برهان خلف درستی عکس قضیه نالس را ثابت کنیم.




عکس قضیه نالس: مانند شکل مقابل در مثلث ABC ، اگر $\frac{AE}{EC} = \frac{AD}{DB}$ ، آن‌گاه $DE \parallel BC$.

اثبات: با استفاده از برهان خلف فرض می‌کنیم حکم مسئله غلط باشد؛ یعنی $DE \not\parallel BC$. لذا از نقطه D خطی موازی BC رسم می‌کنیم تا AC را در نقطه‌ای مانند E' قطع کند. طبق قضیه نالس داریم $\frac{AE'}{E'C} = \frac{AD}{DB}$ و از مقایسه با فرض مسئله خواهیم دانست $\frac{AE}{EC} = \frac{AE'}{E'C}$. حال با ترکیب نسبت در مخرج داریم $\frac{AE}{AC} = \frac{AE'}{AC}$ و در نتیجه $AE = AE'$. این یعنی نقطه E بر E' منطبق است و لذا DE همان DE' است و این یک تناقض است، زیرا $DE \parallel BC$ و $DE' \not\parallel BC$ است. بنابراین از ابتدا فرض غلط بودن حکم نادرست بوده است و حکم می‌تواند غلط باشد، یعنی $DE \parallel BC$ است.

قضیه‌های دو شرطی

همان‌گونه که دیدیم، قضیه نالس و عکس آن هر دو درست‌اند؛ بنابراین برای مثلثی مانند ABC در شکل مقابل می‌توان هر دوی آنها را به صورت زیر بیان کرد:

اگر $DE \parallel BC$ ، آن‌گاه $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ و برعکس.



چنین قضیه‌هایی را قضیه‌های دو شرطی می‌نامیم. قضیه‌های دو شرطی را با نماد \Leftrightarrow

در این نماد نشان دهیم آن است که هر کدام از طرفین می‌تواند طرف دیگر را نتیجه دهد؛ لذا هر دو طرف درست‌اند و با هر دو طرف نادرست‌اند.


که اگر و تنها اگر خواننده می‌شود) بیان کرد: به‌طور مثال قضیه فوق و عکس آن را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

فرض کنیم ABC یک مثلث و نقاط D و E به ترتیب روی AB و AC باشند. در این صورت

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \Leftrightarrow DE \parallel BC$$


در ادامه مثال‌هایی از قضایای دو شرطی ملاحظه خواهید کرد.

مثال: در یک مثلث دو ضلع بریزند؛ اگر و تنها اگر زاویه‌های روبه‌رو به آنها باهم برابر باشند.



مثال: در مثلث مساوی الاضلاع یک پاره‌خط نیمساز است؛ اگر و تنها اگر میانه باشد.

کار در کلاس



با توجه به قضیه فیثاغورس اگر زاویه A از مثلثی مانند ABC قائمه باشد، آنگاه $a^2 = b^2 + c^2$. الف) عکس این قضیه را بنویسید.

ب) با انجام مراحل زیر نتیجه بگیرید که عکس قضیه فیثاغورس نیز درست است.

۱- فرض کنیم مثلث ABC داده شده است و رابطه $a^2 = b^2 + c^2$ بین اندازه اضلاع آن برقرار است.

۲- پاره‌خط‌های $A'B'$ و $A'C'$ را مطابق شکل مقابل به گونه‌ای در نظر بگیرید که $\hat{A}' = 90^\circ$ و $A'B' = AB$ و $A'C' = AC$ است.

۳- با استفاده از قضیه فیثاغورس در مثلث $A'B'C'$ ، اندازه پاره‌خط $B'C'$ را به دست آورید و ثابت کنید $B'C' = BC$.

۴- توضیح دهید چرا $\hat{A}BC \cong \hat{A}'B'C'$ و نتیجه بگیرید $\hat{A} = 90^\circ$.

ج) قضیه فیثاغورس و عکس آن را به‌صورت یک قضیه دو شرطی بیان کنید.

مثال نقض

نوع دیگری از استدلال که در پایه‌های قبل نیز نا محدودی با آن آشنا شده‌اید، استدلال یا مثال نقض است. اگر فردی ادعا کند که «همه اعداد فرد، اول‌اند»، این یک حکم کلی درباره تمام اعداد فرد است و ارائه عدد ۹ به عنوان عددی که فرد و غیر اول است، برای رد این ادعا کافی است، به چنین مثالی که برای رد یک حکم کلی استفاده می‌شود، مثال نقض می‌گوییم. به عنوان مثالی دیگر؛ فرض کنیم فردی ادعا کند که «هیچ فرد ایرانی‌ای تا به حال مدال

فیلدز نگرفته است». در این صورت شما برای رد ادعای او چه می‌توانید بگویید؟ اگر شما حتی یک فرد ایرانی را که مدال فیلدز گرفته است، برای او مثال بزنید، در این صورت ادعای او باطل شده است و در واقع شما با استفاده از یک مثال نقض، ادعای او را باطل کرده‌اید.

با دقت در ادعای مطرح شده خواهیم دید که کلمه «هیچ» در این حکم باعث می‌شود که این ادعا یک حکم کلی برای تمام اعضای یک مجموعه (که در اینجا مجموعه افراد ایرانی است) باشند. بنابراین در این مورد نیز آوردن یک مثال نقض کافی است تا آن حکم رد شود و به عبارتی غلط بودن آن حکم اثبات گردد.

در ادامه نمونه‌هایی از حکم‌های کلی آمده‌اند.

الف) همه اعداد اول فردند. (حکم کلی درباره تمام اعداد اول)

ب) «در هر مستطیل اندازه قطر‌ها باهم برابر است.» (حکم کلی درباره تمام مستطیل‌ها)

پ) «به ازای هر عدد طبیعی n ، مقدار عبارت $n^2 + n + 41$ عددی اول است.» (حکم کلی در مورد تمام اعداد طبیعی)

درباره درستی یا نادرستی حکم «الف» چه حدسی می‌زنید؟ چگونه می‌توانید حدس خود را ثابت کنید؟

می‌دانیم که ۲ یک عدد اول و زوج است. بنابراین حکم کلی «الف» یا ارائه همین مثال نقض رد می‌شود. درباره درستی یا نادرستی

حکم‌های «ب» و «پ» چه حدسی‌هایی می‌زنید؟ آیا می‌توانید برای آنها مثال نقض بیابید و آنها را باطل کنید؟

اگر برای یک حکم کلی نتوانیم مثال نقض ارائه کنیم، درباره درستی یا نادرستی آن حکم چه می‌توان گفت؟ آیا در این حالت درستی حکم را باید پذیرفت؟

برای قسمت (ب) مثال نقض وجود ندارد؛ اما این برای پذیرش این حکم کافی نیست و باید توجه کرد که «برای نشان دادن درستی یک حکم کلی باید آن را اثبات کنیم».


درباره گزینه (پ) چه می‌توان گفت؟

اگر درستی یا نادرستی یک حکم کلی بر ما مشخص نباشد و برای رد آن، مثال نقض نیز نتوانیم ارائه دهیم، نمی‌توان درباره درستی یا نادرستی آن حکم کلی نتیجه‌ای گرفت.

تمرین

۱ در شکل مقابل مساحت مثلث قائم‌الزاویه ABC را به دو روش محاسبه کنید و از تساوی دو

عبارت به دست آمده برای مساحت مثلث، یک تناسب به دست آورید.




آلن مدال یا نشان فیلدز (Fields medal) جایزه‌ای است که به ابتکار ریاضیدان کانادایی جان چارلز فیلدز هر چهار سال یکبار به ریاضیدان جوان (کمتر از چهل سال) که کار ارزشمندی در ریاضی انجام داده باشند اهدا می‌گردد. از آنجا که در رشته ریاضی جایزه نوبل اهدا نمی‌شود، این جایزه را «نوبل ریاضیات» می‌گویند. در سال ۲۰۱۴ نشان فیلدز به ریاضیدان ایرانی‌تبار مریم میرزاخانی اهدا شد. گفتنی است که میرزاخانی اولین زنی در دنیاست که موفق به گرفتن این نشان شده است. البته با فلسفه تمام موقع نمون کتاب جبر در گذشته ایشان، چهار علم و جامعه ایرانی را سجد ساز ساخت. روانی شد.

۲ در هر مورد، مقدار عددی نسبت $\frac{a}{b}$ را به دست آورید.


الف) $\frac{a}{12+a} = \frac{b}{8+b}$

ب) $\frac{3a+10}{12+2a} = \frac{3b+7}{7+2b}$


۳ ثابت کنید در هر مثلث، پاره‌خطی که وسط‌های دو ضلع مثلث را به هم وصل کند، یا ضلع سوم موازی و مساوی نصف آن است.



۴ در شکل مقابل $PQ \parallel BC$ است. طول پاره‌خط‌های AP و PQ را به دست آورید.



۵ در شکل مقابل $ST \parallel BC$ است. مقادیر a و b را به دست آورید.



۶ در ذوزنقه مقابل $AB \parallel ST \parallel DC$ است. ثابت کنید: $\frac{AS}{SD} = \frac{BT}{TC}$

ارائه‌نمایی: یکی از قطر‌ها را رسم کنید.

۷ در هر مورد با عوض کردن جای فرض و حکم عکس آنچه را داده شده است، بنویسید.

الف) اگر در مثلثی سه ضلع برابر باشند، آنگاه سه زاویه نیز برابر خواهند بود.

ب) اگر در یک چهارضلعی اضلاع روبرو موازی باشند، در این صورت زوایای مقابل با هم برابرند.

ج) اگر رأس‌های یک چهارضلعی روی یک دایره قرار داشته باشند، در این صورت زوایای مقابل آن چهارضلعی مکمل‌اند.

د) در یک مثلث اگر دو ارتفاع برابر باشند، «ضلع متناظر به ارتفاع بزرگ‌تر» کوچک‌تر است از «ضلع مقابل به ارتفاع کوچک‌تر».

ارائه‌نمایی: شکل بکشید و به زبان ریاضی بنویسید.

۸ با برهان خلف ثابت کنید نمی‌توان از یک نقطه غیر واقع بر یک خط، دو عمود بر آن خط رسم کرد.

۹ هر یک از حکم‌های کلی زیر را با یک مثال نقض رد کنید.


الف) هیچ عدد اولی بزرگ‌تر از ۱۲۷ وجود ندارد. (ب) مساحت هر مثلث از مساحت هر مربع بیشتر است.

ج) در هر مثلث میانه و عمود متصاف متناظر به هر ضلع بر هم منطبق‌اند.


تشابه مثلث‌ها

در پایه نهم با مفهوم تشابه آشنا شدید. با توجه به مفهوم تشابه، دو مثلث ABC و $A'B'C'$ تشابه‌اند؛ هرگاه زوایای متناظر باهم برابر باشند و نسبت اضلاع متناظر در دو مثلث یکسان باشد؛ یعنی:

$$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C' \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{A} = \hat{A}' \text{ و } \hat{B} = \hat{B}' \text{ و } \hat{C} = \hat{C}' \\ \frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'} \end{cases}$$



در این صورت نسبت اضلاع متناظر در دو مثلث را نسبت تشابه دو مثلث می‌نامیم. مثلاً اگر $\frac{AB}{A'B'} = \frac{2}{3}$ باشد، می‌گوییم مثلث ABC با مثلث $A'B'C'$ با نسبت تشابه $\frac{2}{3}$ ، متشابه است. در این صورت مثلث $A'B'C'$ با مثلث ABC با نسبت تشابه $\frac{3}{2}$ ، متشابه خواهد بود.



قضیه اساسی تشابه مثلث‌ها

اگر خطی موازی یکی از اضلاع مثلث دو ضلع دیگر را قطع کند در این صورت مثلث کوچکی که به وجود می‌آید یا مثلث بزرگ اولیه متشابه است.

اثبات:

$$1- \text{ما داریم } \hat{D} = \hat{B} \text{ و } \hat{E} = \hat{C} \text{ (جواب ۱)}$$

بنابراین زاویه‌های دو مثلث نظیر به نظیر باهم برابرند.

۲- با توجه به قضیه تالس داریم:

۳- با توجه به (۱) و (۲) و تعریف تشابه داریم:


$$\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC} = \frac{AE}{AC}$$

$$\triangle ADE \sim \triangle ABC$$

با استفاده از قضیه اساسی تشابه مثلث‌ها می‌توان سه قضیه بعد را که **حالت‌های تشابه دو مثلث** را بیان می‌کنند، اثبات کرد. از آنجا که اثبات این قضیه‌ها مدنظر نیست، در ادامه تنها صورت آنها بیان شده است.


قضیه ۱: هرگاه دو زاویه از مثلثی با دو زاویه از مثلث دیگر برابر باشند، دو مثلث متشابه‌اند.

$$(\hat{A} = \hat{A}' \text{ و } \hat{B} = \hat{B}' \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A'B'C')$$



قضیه ۲: هرگاه اندازه‌های دو ضلع از مثلثی با اندازه‌های دو ضلع از مثلث دیگر متناسب باشند و زاویه بین آنها برابر باشند، دو مثلث متشابه‌اند.


$$\left(\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}, \hat{A} = \hat{A}' \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A'B'C' \right)$$



قضیه ۳: هرگاه اندازه‌های سه ضلع از مثلثی با اندازه‌های سه ضلع از مثلث دیگر متناسب باشند، دو مثلث متشابه‌اند.

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'} \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$$

کار در کلاس



۱ در شکل مقابل $BC \parallel DE$.

اندازه یاره خط‌های DE و CA را به دست آورید.

۲ اگر نقاط P و N و M مطابق شکل وسط‌های اضلاع مثلث ABC باشند، ثابت کنید


مثلث‌های ABC و MNP متشابه‌اند.

حل:

(الف) $MN \parallel BC$ و $NP \parallel AB$ و $MP \parallel AC$ چرا؟

(ب) بنابراین $\hat{M} = \hat{P} = \hat{C}$ و $\hat{N} = \hat{P} = \hat{B}$ (چرا؟)

از (ب) درباره مثلث‌های مورد نظر چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟



۱ اگر سه مثلث ABC و $A'B'C'$ و $A''B''C''$ به گونه‌ای باشند که $A'B'C' \sim A''B''C''$ و $A'B'C' \sim ABC$ ، دربارۀ دو مثلث ABC و $A''B''C''$ چه می‌توان گفت؟ چرا؟

برخی روابط طولی در مثلث قائم‌الزاویه:

کتابت

فرض کنید مثلث ABC مانند شکل یک مثلث قائم‌الزاویه و ارتفاع AH وارد بر وتر آن باشد.


۱ نشان دهید دو زاویه از مثلث AHC با دو زاویه از مثلث ABC برابرند و نتیجه بگیرید:

$$\triangle ABC \sim \triangle AHC$$

۲ نشان دهید دو زاویه از مثلث AHB با دو زاویه از مثلث ABC برابر است و نتیجه بگیرید:

$$\triangle ABC \sim \triangle AHB$$

۳ از (۱) و (۲) دربارهٔ مثلث‌های AHC و AHB چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



نتیجه: در هر مثلث قائم‌الزاویه، ارتفاع وارد بر وتر، دو مثلث قائم‌الزاویه به وجود می‌آورد که این دو مثلث با هم و با مثلث اصلی مشابه‌اند.

$$\triangle ABC \sim \triangle AHC \Rightarrow \frac{AH}{BC} = \frac{AC}{HC} = \frac{HC}{AC} \Rightarrow AC^2 = \dots \times \dots$$

$$\triangle ABC \sim \triangle AHB \Rightarrow \frac{AH}{BC} = \frac{AB}{HB} = \frac{HB}{AB} \Rightarrow AB^2 = \dots \times \dots$$

$$\triangle AHB \sim \triangle AHC \Rightarrow \frac{AH}{BC} = \frac{AC}{HC} = \frac{HC}{AC} \Rightarrow AH^2 = \dots \times \dots$$


با جمع طرفین روابط ۱ و ۲ رابطه فیثاغورس را برای مثلث ABC نتیجه بگیرید.

$$BC^2 = \dots + \dots$$

۴ مساحت مثلث ABC را به دو طریق محاسبه و با توجه به آن تساوی زیر را کامل کنید.

$$AB \times \dots = AH \times \dots$$

در مثلث قائم الزاویه مقابل در هر مورد سعی کنید با ساده‌ترین روش مقادیر خواسته شده را به دست آورید.






$a=?$ $d=7$ $h=5$ ۱

$a=?$ $b=?$ $c=3$ $d=5$ ۲

$h=?$ $b=6$ $c=8$ ۳


تمرین

در هر قسمت تنبیه مثلث‌ها را ثابت کنید و مقادیر h و b را مشخص نمایید.




۲ در مثلث قائم الزاویه زویدرو در هر حالت، اندازه باره خط خواسته شده را به دست آورید.

- الف) $BC=10$ و $BH=9$ و $AH=?$ و $AB=?$ و $AC=?$
- ب) $AC=5$ و $CH=2$ و $BC=?$ و $AH=?$ و $AB=?$
- پ) $AB=8$ و $AC=6$ و $BC=?$ و $AH=?$
- ت) $AB=12$ و $AH=6$ و $BH=?$ و $BC=?$ و $AC=?$




۳ شکل مقابل مستطیلی به طول ۱۲ است. اگر از نقطه A عمودی بر قطر BD رسم کنیم و پای این عمود را H بنامیم، طول BH برابر ۱۱ است، اندازه عمود رسم شده، طول قطر مستطیل و اندازه عرض مستطیل را محاسبه کنید.






۴ بر دیوار یک کعب نظامی نورافکنی به ارتفاع ۶ متر (مانند شکل) قرار گرفته است. فردی که در طرف دیگر رودخانه است، می خواهد فاصله خود را تا پایه نورافکن محاسبه کند. برای این کار جوی به طول یک متر را روی زمین قرار می دهد و مشاهده می کند که طول سبانه جوی برابر ۵ متر است. فاصله این مرد تا پای نورافکن چقدر است؟



۵ در شکل مقابل دو مثلث قائم الزاویه مشاهده می کنید. نسبت محیطها و مساحت های آنها را به دست آورید.

۶ دو مثلث مشابه ABC و $A'B'C'$ را با نسبت مشابه K در نظر بگیرید؛ به گونه ای که $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'} = K$ باشد. حال ارتفاع های AH و $A'H'$ را در دو مثلث رسم کنید. الف) ثابت کنید مثلث های AHB و $A'H'B'$ مشابه اند.

ب) نسبت $\frac{AH}{A'H'}$ را به دست آورید.



ب) نسبت مساحت های $\frac{S_{ABC}}{S_{A'B'C'}}$ را محاسبه کنید.

ت) نسبت محیط های دو مثلث ABC و $A'B'C'$ را به دست آورید.



شیراز سرزمین شهر باستانی است. این شهر یکی از مکان‌های تاریخی و از نقاط زیبای ایران است که زمانی دارای رونق چشمگیری بوده و در آن زمان با سیصد هزار نفر جمعیت، روابط تجاری زیادی با روم و بولتان (در اروپا) و ماداگاسکار (در آفریقا)، هند و چین (در آسیا) داشته است. با این همه زمین لرزه شدیدی در قرن چهارم هجری قمری ویران‌کننده کلان این شهر را نیز می‌داشت.

آشنایی با برخی از انواع توابع

وارون یک تابع و تابع یک به یک

اعمال جبری روی توابع

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس اول

آشنایی با برخی از انواع توابع

در سال گذشته با مفهوم تابع آشنا شدیم. به دستور یا قانون بیانگر تابع، ضابطه آن تابع گفته می‌شود. برای مشخص کردن یک تابع، باید دامنه تابع و ضابطه آن را داشته باشیم. بنا به قرارداد، اگر ضابطه تابعی داده شده باشد، اما دامنه آن صریحاً گفته نشده باشد، بزرگ‌ترین مجموعه‌ای که آن تابع در آن قابل تعریف است، به عنوان دامنه در نظر گرفته می‌شود.

توابع گویا

فعالیت

حسین در پایه یازدهم درس می‌خواند. او در روستای کوچکی زندگی می‌کند که در چند کیلومتری یکی از جاده‌های پرتردد ایران قرار دارد. مردم این روستا تا چند سال پیش به کشاورزی و باغداری مشغول بودند، اما چند سالی است که به دلیل کم‌آبی، کشاورزی رونق ندارد و در نتیجه مردم این روستا درآمد کافی ندارند. حسین تصمیم گرفت این وضع را تغییر دهد. برای این منظور با خود اندیشید که باید فضای روستا را زیباتر کند و با تبلیغاتی مناسب، بخشی از افرادی که قصد گردشگری دارند و معمولاً از جاده اصلی کنار روستا می‌گذرند را به روستای خود جلب کند. او با خود فکر کرد این گردشگران بابت پذیرایی محلی و تجربه خوشایند یک زندگی روستایی، هزینه خواهند پرداخت و به این ترتیب جرحه اقتصادی مردم روستا بر رونق خواهد شد.

پس از چند هفته تحقیق و پرس و جو، حسین به این نتیجه رسید که برای شروع کار به حدوداً ده میلیون تومان نیاز دارد که البته او به تنهایی این پول را نداشت. برای همین، تصمیم گرفت ابتکار خود را با دیگران مطرح کند و از آنها هم برای این کار مقید باری بخواهد. به این ترتیب افراد روستا می‌توانستند با سرمایه‌گذاری به نسبت مساوی در زرافه‌اندازی این کار اقتصادی سهیم شوند.

الف) اگر حسین تنها شخص شرکت کننده در این طرح بود، او به تنهایی می‌بایست $\frac{1}{10}$ از ده میلیون تومان را بپردازد، اما اگر یک داوطلب دیگر هم پیدا می‌شد، هر کدام باید $\frac{1}{20}$ از ده میلیون تومان را بپردازند. جدول زیر را کامل کنید.


تعداد افراد داوطلب	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
سهم مشارکت هر داوطلب	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{40}$						

ب) اگر تعداد داوطلبانی که می‌خواهند در این کار اقتصادی شرکت کنند، n نفر باشند، سهم مشارکت هر نفر چقدر خواهد شد؟

$$f(x) = \frac{10}{x}$$

ب) رابطه بین تعداد افراد داوطلب و سهم مشارکت آنها یک تابع چیست؟

۲ در شکل زیر، بخشی از نمودار تابع سهم مشارکت رسم شده است. با انتخاب گزینه مناسب در عبارت زیر، تعیین کنید که این نمودار چه چیزی را نشان می‌دهد؟
 «با افزایش تعداد داوطلبان، سهم مشارکت هر داوطلب کاهش افزایش می‌یابد.»





کفایت

در نمودارهای زیر تابع با ضابطه $f(x) = \frac{1}{x}$ با دو دامنه متفاوت رسم شده است. مشخص کنید که هر کدام از این نمودارها مربوط به کدام دامنه است؟

الف) $D_f = (0, +\infty)$

ب) $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$



خواندنی

هزینه باکسازی ۵ درصد از آلودگی‌های شهری و صنعتی رودخانه‌ای با تابع با ضابطه $f(x) = \frac{25}{x}$ محاسبه می‌شود که در آن x درصد آلودگی و $f(x)$ هزینه باکسازی بر حسب میلیون تومان است. البته جدول زیر را کامل کنید.

ب) با یک میلیارد تومان چه درصدی از آلودگی‌های این رودخانه باکسازی خواهد شد؟
 ب) چرا هیچ‌گاه ۱۰۰ درصد از آلودگی‌های این رودخانه باکسازی نمی‌شود؟

x	۱	۳	۵	۷	۹
$f(x)$					

هر تابع به شکل $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ را یک تابع گویا می‌نامیم، که در آن $P(x)$ ، $Q(x)$ چند جمله‌ای هستند و چند جمله‌ای $Q(x)$ صفر نیست.

تابع با ضابطه $f(x) = \frac{1}{x}$ و همچنین توابع زیر نمونه‌هایی از توابع گویا هستند.

$f(x) = \frac{x}{x+5}$

$f(x) = \frac{x+3}{x-1}$

$f(x) = \sqrt{5x}$

$f(x) = 2$

کار در کلاس

یکی از معیارهای بررسی موفقیت یک بازیکن بسکتبال، بررسی «عملکرد برناب‌های آزاد» اوست. به این منظور، نسبت برناب‌های آزاد موفق هر بازیکن را به همه برناب‌های آزاد حساب می‌کنند. وحیده که عضو تیم بسکتبال مدرسه است، یک بازیکن موفق است، زیرا در مسابقات امسال، تا امروز، از ۱۰ برناب آزاد، ۷ برناب او موفق بوده است. بنابراین ۷۰ درصد برناب‌های آزاد او موفق بوده است. او دوست دارد عملکردش بهتر از این باشد.

الف) اگر نایبان مسابقات همه برناب‌های آزاد وحیده موفق باشد، ضابطه تابع عملکرد برناب‌های آزاد او به کدام صورت زیر است؟

$$f(x) = x + 10 \quad f(x) = \frac{x}{10 + x} \quad f(x) = \frac{7 + x}{10 + x}$$

ب) آیا تابع عملکرد برناب‌های آزاد وحیده، یک تابع گویاست؟

ب) توضیح دهید که پس از چند برناب آزاد موفق یابری دیگر، درصد موفقیت عملکرد وحیده ۸۰ درصد خواهد شد؟

$$f(x) = \frac{80}{100} \rightarrow \dots\dots\dots$$

دامنه توابع گویا

از سال‌های گذشته می‌دانیم مخرج هیچ کسری نمی‌تواند صفر باشد؛ بنابراین عدد صفر در دامنه تابع با ضابطه $\frac{1}{x} = \frac{1}{x}$ نیست. به‌طور کلی اعدادی که مخرج کسر مربوط به ضابطه یک تابع گویا را صفر کنند، عضو دامنه آن تابع نیستند. به عنوان مثال، دامنه تابع گویای با ضابطه $f(x) = \frac{5}{x-2}$ برابر $\mathbb{R} - \{2\}$ است.

کار در کلاس

دامنه هر یک از توابع گویای داده شده را به دست آورید.

$$f(x) = \frac{x}{x+5}$$

$$D_f =$$

$$g(x) = \frac{x}{x-4}$$

$$D_g =$$

تساوی دو تابع


دو تابع f و g را برابر نامیم هرگاه:

الف) دامنه f و دامنه g با هم برابر باشند.

ب) برای هر x از این دامنه یکسان داشته باشیم: $f(x) = g(x)$

بنابراین در صورت رسم نمودارهای دو تابع مساوی در یک دستگاه مختصات، باید نمودارهای آنها دقیقاً بر هم منطبق شوند.

به نمودار دو تابع با ضابطه $f(x) = \frac{2\infty}{x}$ و $g(x) = 2$ دقت کنید.



می‌بینیم که نمودارهای این دو تابع کاملاً بر هم منطبق هستند، در واقع با اینکه ضابطه دو تابع شبیه هم هستند و در صورت ساده شدن x ، ضابطه‌های دو تابع برابر می‌شوند ولی دامنه دو تابع با هم متفاوت است؛ زیرا داریم:

$$D_f = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$D_g = \mathbb{R}$$


در نتیجه این دو تابع با هم برابر نیستند.

تذکر: همواره دامنه تابع را قبل از ساده کردن ضابطه آن محاسبه می‌کنیم.

کار در کلاس

۱ آیا دو تابع با ضابطه $f(x) = \frac{x^2}{x}$ و $g(x) = x$ با هم برابرند؟ چرا؟

۲ نمودار مقابل مربوط به کدام یک از توابع زیر است؟ مسئله چند جواب دارد؟



الف) $g(x) = 2x$ $D_f = \mathbb{R}$

ب) $g(x) = 2x$ $D_f = \mathbb{R} - \{2\}$

ب) $g(x) = 2x$ $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$

ت) $g(x) = \frac{2x^2 - 2x}{x - 1}$ $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$

ت) $g(x) = \frac{2x^2 - 4x}{x - 2}$ $D_f = \mathbb{R} - \{2\}$

نواع رادیکالی

کار در کلاس

بر اساس مشاهدات دانشمندان، اگر S تندی جابه‌جایی یک سونامی بر حسب کیلومتر بر ساعت باشد، می‌توان آن را از رابطه $S = 35 \sqrt{d}$ محاسبه کرد که در آن d میانگین عمق دریا بر حسب کیلومتر است.

الفا جدول زیر را کامل کنید. ($\sqrt{3} = 1/7$ ، $\sqrt{2} = 1/4$)

d	۱	۲	۳	۴
$S = 35 \sqrt{d}$		۴۹۸.۲		


ب) عبارت زیر را کامل کنید.

چون هر عدد، تنها ریشه دوم مثبت دارد، پس رابطه سونامی یک تابع

ب) کدام یک از اعداد ۵- و ۵ عضو دامنه تابع سونامی است؟

مطالعه توابع رادیکالی مانند $S = 35 \sqrt{d}$ به دلیل نقش کاربردی آنهاست. در این کتاب یا برخی از توابع رادیکالی آشنا می‌شویم. همان‌طور که هنگام کار با تابع رادیکالی سونامی دیدید، دامنه این نوع توابع ممکن است همه اعداد حقیقی نباشد:

ساده‌ترین تابع رادیکالی تابع یا ضابطه $f(x) = \sqrt{x}$ است. دامنه این تابع مجموعه همه اعداد حقیقی نامنفی و نمودار آن به صورت زیر است.



خواندنی

سونامی (ابالرو) به لرزش شدید آب دریا گفته می‌شود. این اتفاق ممکن است در پی زمین‌لرزه‌های زیر دریا، لغزش صخره‌ها، انفجار آتشفشانی و یا هر حادثه دیگری که انرژی زیادی در دریا آزاد می‌کند، رخ دهد. آبی که به لرزه درآمده است، به شکل موج‌های عظیم به کرانه‌ها می‌رسد و دریایی به بار می‌آورد. سونامی زمانی شروع می‌شود که حجم عظیمی از آب به سرعت مرتفع شود. تندی موج‌های سونامی بسته به محل رویداد، ممکن است به بیش از ۸۰۰ کیلومتر در ساعت برسد.

یکی از بزرگ‌ترین سونامی‌ها در سال ۱۳۸۳ در نزدیکی سوماترای اموتزی روی داد و باعث دریایی عظیمی شد و حدود ۲۰ هزار نفر را به کام مرگ کشید.



در کتاب‌های تاریخ ادعا شده است که قسمت بزرگی از سر پاستلی سراف تاگهان بر اثر زمین‌لرزه‌ای به زیر آب رفته است. پاسخ دقیق این سؤال را که «آ» یک سونامی سراف را ویران کرده و به زیر آب برده است، باید با کمک پژوهش‌های باستان‌شناسی و زمین‌شناسی یافت. با توجه به اینکه میانگین عمق خلیج فارس حدود ۵۰ متر است، نظر شما چیست؟



۱ در شکل مقابل با کمک انتقال نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \sqrt{x}$ ، نمودار مربوط به هر یک از توابع زیر رسم شده است. مشخص کنید که هر نمودار، مربوط به کدام تابع است. سپس دامنه آنها را تعیین کنید.



الف) $g(x) = \sqrt{x-2}$ $D_g = \dots\dots\dots$ ب) $h(x) = \sqrt{x+2}$ $D_h = \dots\dots\dots$

ب) $k(x) = \sqrt{x+2}$ $D_k = \dots\dots\dots$ ن) $l(x) = \sqrt{x-2}$ $D_l = \dots\dots\dots$

۲ می‌خواهیم نمودار تابع با ضابطه $y = -2 + \sqrt{x+3}$ را رسم کنیم.

الف) (مرحله اول) نمودار تابع با ضابطه $y = \sqrt{x}$ در صفحه قبل را در نظر بگیرید.


ب) (مرحله دوم) حال، نمودار تابع با ضابطه $y = \sqrt{x+3}$ را رسم کنید.



ب) (مرحله سوم) در پایان، نمودار تابع با ضابطه $y = -2 + \sqrt{x+3}$ را رسم کنید.

یا توجه به شکل می‌بینید که دامنه این تابع $[-3, +\infty)$ است.

۲ نمودار تابع با ضابطه $f(x) = 1 + \sqrt{x+}$ را رسم کنید؛ سپس دامنه آن را بیابید.



توابع پله‌ای و تابع جزء صحیح

فعالیت


هزینه بارکینگ خودرو

در یک بارکینگ، هزینه بارک خودرو به این صورت محاسبه می‌شود:
الف) ضابطه تابع هزینه بارکینگ خودرو چیست؟

هزینه (هزار تومان)	زمان
۳	تا کمتر از ۲ ساعت
۴	تا ۲/۵ ساعت
۵	تا کمتر از ۳ ساعت
۶	تا ۵ ساعت

$$f(x) = \begin{cases} 3 & 0 \leq x < 2 \\ 4 & 2 \leq x < 2.5 \\ 5 & \dots \\ 6 & \dots \end{cases}$$

ب) نمودار این تابع را رسم کنید.



به توابعی مانند تابع هزینه بارکینگ، توابع پله‌ای می‌گویند. توابع پله‌ای در تجارت یا خرید و فروش نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. مشهورترین تابع پله‌ای، تابع جزء صحیح است.

تابع جزء صحیح به هر عدد صحیح، خود همان عدد صحیح را نسبت می‌دهد و به هر عدد غیر صحیح، بزرگ‌ترین عدد صحیح کوچک‌تر از آن عدد را نسبت می‌دهد. ضابطه این تابع به صورت $[x] = (x)$ تر نشان داده می‌شود.

برای مثال داریم:

$[4] = 4$ $[6/8] = 6$ $[0] = 0$ $[-4/3] = -5$ $[-3] = -3$



خواندنی

برای قیمت گذاری یک محصول تولیدی خاص، قیمت مواد اولیه تعیین کننده است؛ اما بالا و پایین رفتن های جزئی قیمت مواد اولیه، قیمت یک محصول را تغییر نمی دهد. بنابراین به اعداد بازه ای از قیمت های مواد اولیه، تنها یک قیمت نهایی محصول را نسبت می دهند. به این ترتیب، تابع مورد نظر یک تابع پله ای است.


خواندنی

با مراجعه به وب گاه رسمی سامانه محاسبه نرخ مرسولات پستی شرکت ملی پست ([http://tarce\(price.post.ir\)](http://tarce(price.post.ir))) می توانید دو شهر را انتخاب کنید. سپس تابع پله ای هزینه ارسال یک بسته را بوجه وزن مشاهده کنید.

همان طور که در مثال دیدیم، جزء صحیح هر عدد غیر صحیح، برابر است با اولین عدد صحیح سمت چپ آن روی محور اعداد.

کار در کلاس

۱ با کمک گرفتن از محور اعداد، جزء صحیح اعداد خواسته شده را به دست آورید.



$$\begin{aligned} [-3/4] &= & [-2] &= & [-1/8] &= & [1/2] &= & [-3/4] &= \\ [4/25] &= & [3] &= & [2/3] &= & [1/7] &= & [1/2] &= \end{aligned}$$

۲ حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

$$\left[\frac{41}{37} \right] = \quad \left[-\frac{13}{51} \right] =$$

تمرین

۱ اگر $[x] = 2$ ، آنگاه x برابر چه اعدادی می تواند باشد؟ مجموعه جواب را به صورت بازه بنویسید.

۲ برای رسم نمودار یک تابع جزء صحیح باید توجه کنیم که اعداد هر بازه ای از دامنه، به چه عددی نسبت داده می شود. برای مثال اگر $1 < x \leq 2$ ، آنگاه $[x] = 2$ پس مقدار تابع با ضابطه $f(x) = [x]$ برای همه اعداد عضو بازه $(1, 2]$ برابر صفر می شود. در شکل مقابل بخشی از نمودار تابع با ضابطه $f(x) = [x]$ رسم شده است. نمودار این تابع را در بازه $[-4, 4]$ تکمیل کنید.

۳ الف) به دلخواه نقطه ای مانند a را روی محور اعداد داده شده مشخص کنید.


ب) نقطه $a + 3$ را روی این محور مشخص کنید.

پ) نقاط $[a]$ و $[a + 3]$ را روی محور مشخص کنید.

ت) چه رابطه ای بین $[a]$ و $[a + 3]$ برقرار است؟ $[a + 3] = [a] + \dots$

ث) چه نتیجه ای می گیرید؟

« اگر a عددی حقیقی و n عددی صحیح باشد، آنگاه $[a + n] = [a] + n$ »



تمرین

۱ نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \frac{1}{x}$ و دامنه $D_f = [-5, 5] - \{0\}$ را رسم کنید.

۲ دامنه تابع گویای با ضابطه $f(x) = \frac{x+3}{x-3}$ را به دست آورید.

۳ در هر مورد آیا دو تابع داده شده با هم برابرند؟

الف) $f(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$ ، $g(x) = \frac{|x|}{x}$ ب) $f(x) = x - 2$ ، $g(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$

۴ تابعی گویا بنویسید که دامنه آن برابر $\mathbb{R} - \{-1\}$ شود. پاسخ خود را با جواب دوستانتان مقایسه کنید.

۵ نمودار تابع با ضابطه $g(x) = -3 + \sqrt{x-2}$ را رسم کنید.

۶ حاصل عبارات‌های مقابل را حساب کنید. $[-22, 9/54]$ $[-1, 2/0, 2]$ $[3, 0/4, 0, 2]$

۷ تابع پله‌ای رویه‌رو را رسم کنید.

$$f(x) = \begin{cases} 3 & x \in [0, 1) \\ 0 & x \in [1, 5] \\ 2 & x \in (6, 7] \end{cases}$$

۸ تابع با ضابطه $f(x) = 2[x]$ و دامنه $D_f = [-3, 3]$ را رسم کنید.

خوانندگی

تابع $f(x) = 5\sqrt{x} + 50$ به‌طور تقریبی
قد متوسط کودکان را بر حسب
سائین متر تا حدود ۶۰ ماهگی نشان
می‌دهد. در این تابع ۵۰ نشان‌دهنده
ماه‌های پس از تولد است.
قد متوسط یک کودک ۹ ماهه تقریباً
چقدر است؟
در چه سنی قد متوسط یک کودک
تقریباً یک متر می‌شود؟



۱- کودکان حاضر در تصویر، فرزندان شهدای دفاع حرم هستند.

وارون یک تابع و تابع یک به یک

وارون یک تابع

کار در کلاس

الف) هر مایل تقریباً $\frac{1}{6}$ کیلومتر است. تعیین کنید که هر یک از جملات سمت راست مربوط به کدام یک از رابطه‌های سمت چپ است.

$$f(x) = \frac{1}{6}x$$

این رابطه برای تبدیل تقریبی «مایل» به «کیلومتر» است.

$$g(x) = \frac{6}{1}x$$

این رابطه برای تبدیل تقریبی «کیلومتر» به «مایل» است.

ب) تندی ۳۰ مایل بر ساعت تقریباً معادل تندی چند کیلومتر بر ساعت است؟

هر تابع با ضابطه $g=f(x)$ بیان می‌کند که متغیر y چه ارتباطی با متغیر x دارد و چگونه می‌توان با در دست داشتن مقدار x ، مقدار y را به دست آورد، اما گاهی مهم است که بدانیم چگونه می‌توان از مقدار y به مقدار x رسید. تبدیل یکای اندازه‌گیری نمونه‌ای ساده از این حالت است.

به خاطر دارید که یک تابع را می‌توان با مجموعه‌ای از زوج‌های مرتب نشان داد.

با جابه‌جا کردن مؤلفه‌های زوج مرتب (a, b) می‌توان زوج مرتب (b, a) را به دست آورد. حال اگر مؤلفه‌های همه زوج‌های مرتب تابع f را جابه‌جا کنیم، رابطه جدیدی به دست می‌آید که آن را وارون تابع f می‌گوییم و یا f^{-1} نشان می‌دهیم.

برای مثال وارون تابع $f = \{(2, 1), (5, 3), (6, 4)\}$ برابر با $f^{-1} = \{(1, 2), (3, 5), (4, 6)\}$ است.

کار در کلاس

وارون تابع‌های داده شده را حساب کنید.

$$f = \{(2, 1), (1, 4), (3, 3), (4, 5)\}$$

 $f^{-1} =$

$$g = \{(5, 1), (1, 4), (4, 3), (2, 3)\}$$

 $g^{-1} =$


$$h = \{(2, 3), (5, 2), (4, 1), (3, 4)\}$$

 $h^{-1} =$


خواندنی



سال‌هاست که ریاضی‌دانان، با کمک داده‌های آماری جمعیت، تلاش می‌کنند به تابع تخمین جمعیت دست یابند و در این زمینه به تالیفی هم رسیده‌اند. این تابع نشان می‌دهد که مثلاً در سال ۱۴۲۰ جمعیت ایران چه تعداد خواهد بود، یا این همه، در عمل معمولاً وارون این تابع نیز اهمیت دارد؛ به عنوان مثال مهم است که مشخص کنیم در چه سالی جمعیت ایران به ۱۰۰ میلیون نفر خواهد رسید. در فصل نجوم با نمونه‌ای از توابع تخمین جمعیت آشنا خواهید شد.

فعالیت



- ۱ در دستگاه مختصات داده شده نمودار تابع f رسم شده است. الف) تابع f را به صورت مجموعه‌ای از زوج‌های مرتب نمایش دهید. ب) تابع f^{-1} را به صورت مجموعه‌ای از زوج‌های مرتب نمایش دهید. پ) در همین دستگاه مختصات، نمودار f^{-1} را رسم کنید. ت) نمودار f و f^{-1} چه ارتباطی با هم دارند؟ «نمودار f و f^{-1} نسبت به قرینه یکدیگرند».

- ۲ الف) در هر مورد بیان کنید چرا نمودار داده شده معرف یک تابع است و وارون آن را رسم کنید.



- ب) عبارات زیر را کامل کنید.


برای رسم نمودار وارون یک تابع کافی است قرینه نمودار آن تابع را نسبت به رسم کنیم.

- ۲ نمودار وارون تابع داده شده را رسم کنید.





تابع یک به یک

فعالیت



الف) به نمونه داده شده دقت کنید. با کمک نمودار بیکانی، وارون توابع داده شده را به دست آورید.



ب) در جدول مقابل گزینه های درست را انتخاب کنید.

<input type="checkbox"/> صحیح	f^{-1} یک تابع است.
<input type="checkbox"/> صحیح	f^{-1} یک تابع است.
<input type="checkbox"/> صحیح	f^{-1} یک تابع است.

ب) عبارت زیر را کامل کنید.



وارون تابع f خود یک تابع است؛ هرگاه در زوج های مرتب متفاوت تابع f مؤلفه های تکراری وجود نداشته باشند.

به تابعی که در زوج های مرتب متفاوت خود، مؤلفه های دوم تکراری نداشته باشد، تابع یک به یک می گوئیم.

تذکره: وارون هر تابع یک به یک، خود یک تابع است.

مث) تابع $f = \{(1, 2), (-2, 4), (2, -1), (-1, 2)\}$ را در نظر بگیرید. تعیین کنید که این تابع یک به یک است یا خیر؟

الف) نمودارهای بیکانی زیر بیانگر تابع اثر انگشت و تابع گروه خونی علی و رضا است.



الف) مشخص کنید که کدام نمودار بیکانی مربوط به اثر انگشت و کدام نمودار بیکانی مربوط به گروه خونی است.
ب) آیا گروهی هر دو تابع اند؟
ب) در مورد تابع بودن f^{-1} و g^{-1} چه می توان گفت؟


ت) کدام یک از دو تابع f و g یک به یک هستند؟

ت) عبارت های زیر را کامل کنید.

- با دانستن گروه خونی یک انسان، هویت او به طور یکتا تعیین
با دانستن اثر انگشت یک انسان، هویت او به طور یکتا تعیین


مهارت

- ۱ در شکل داده شده، با وصل کردن نقاط مشخص شده به هم، نموداری رسم کنید که تابع باشد. الف) آیا تابعی که رسم کرده‌اید یک به یک است؟
ب) با کامل کردن عبارت زیر مشخص کنید که چگونه یا در دست داشتن نمودار یک تابع، می‌توان تشخیص داد که آیا آن تابع یک به یک است یا خیر؟



اگر هر خطی موازی محور x نمودار تابع را حداکثر در یک نقطه قطع کند، آن گاه آن تابع یک به یک است.

- ۲ کدام یک از توابع زیر یک به یک است؟




خواندنی

فرن‌ها پیش رشیدالدین فضل‌الله همدانی، طبیب و مورخ برجسته ایرانی در کتاب جامع التواریخ به رسم جبرها در تناسلی افراد از طریق اثر انگشت اشاره کرده و توضیح داده بود که انشواهد و تجربیات نشان می‌دهد که اثر انگشت هیچ دو نفری کاملاً یکسان نیست. در آن زمان در ایران نیز از اثر انگشت تست برای مهر کردن اسناد استفاده می‌کردند. در اوایل قرن بیستم، غربی‌ها نیز با الهام گرفتن از شرقی‌ها برای تناسلی در تحقیقات جنایی از اثر انگشت بهره گرفتند. امروزه تشخیص اثر انگشت به عنوان یکی از دقیق‌ترین و سریع‌ترین روش‌های بیومتریک در حفظ امنیت سیستم‌های کنترل دسترسی و همچنین در ساعت‌های حضور و غیاب، کاربرد بسیاری دارد.




به دست آوردن ضابطه تابع وارون یک تابع خطی غیر ثابت

اگر f تابعی یک به یک باشد و f^{-1} تابع وارون آن باشد، نمودار زیر ارتباط f و f^{-1} را نشان می‌دهد. (R_f نماد برد تابع f است.)




مثالیت


تابع با ضابطه $f(x) = 2x + 1$ را در نظر می‌گیریم.
الف) به کمک نمودار f توضیح دهید که چرا f یک به یک است.



ب) نمودار زیر را توضیح دهید:
 $(3, 7) \in f$ و $(7, 3) \in f^{-1}$
به عبارت دیگر $f(3) = 7$ و $f^{-1}(7) = 3$



ب) در حالت کلی برای هر عضو دامنه تابع با ضابطه $f(x) = 2x + 1$ داریم:



نتیجه این می‌توان نوشت:

$$f(x) = 2x + 1 \quad (x \in D_f)$$

$$f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2} \quad (y \in R_f)$$

آنچه که اهمیت دارد این است که دامنه f^{-1} همان برد f است. بنابراین یک نمایش مناسب برای f^{-1} به صورت زیر است:

$$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$$

به طور کلی:

برای به دست آوردن ضابطه تابع وارون یک تابع خطی غیر ثابت مانند f ، در معادله $y = f(x)$ ، x را بر حسب y محاسبه می‌کنیم. سپس با جابه‌جا کردن y و x ، ضابطه تابع $f^{-1}(x)$ را به دست می‌آوریم.

وارون تابع با ضابطه $f(x) = 2x + 1$ ، چنین محاسبه می‌شود:

$$f(x) = 2x + 1 \Rightarrow y = 2x + 1$$

$$\Rightarrow 2x = y - 1$$

$$\Rightarrow x = \frac{y-1}{2}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$$

کلاس


۱ هر تابع خطی غیر ثابت یک به یک است. (چرا؟) وارون هر یک از توابع خطی زیر را به دست آورید.

الف) $f(x) = x + 5$

ب) $g(x) = 4x$

پ) $u(x) = 2x + 3$


ت) $v(x) = \frac{2}{3}x - 4$



الف) چرا نمودار داده شده، نمودار یک تابع یک به یک نیست؟

ب) با حذف تنها یک نقطه، نمودار مقابل را به یک تابع یک به یک تبدیل کنید. مسئله چند جواب دارد؟

کار در کلاس




الف) به نمودار تابع با صابطة $f(x) = x^2 - 4x + 3$ در شکل مقابل، دقت کنید. با محدود کردن دامنه این تابع روی کدام بازه‌های زیر می‌توان یک تابع یک به یک ساخت؟

- $[1, 4]$
- $[0, 2]$

ب) آیا هر تابع درجه ۲، تابعی یک به یک است؟ چرا؟

تمرین



۱) وارون تابع $f = \{(-1, 2), (-2, 1), (2, 3)\}$ را به دست آورید.

۲) نمودار وارون تابع داده شده در شکل مقابل را رسم کنید.


۳ ضابطه وارون هر یک از توابع با ضابطه‌های زیر را بیابید.

الف) $f(x) = 5x - 2$

ب) $f(x) = \frac{3}{5}x + 4$

ب) $f(x) = \frac{-7x + 4}{5}$


۴ می‌خواهیم با حذف تعدادی از نقاط نمودار مقابل، آن را به یک تابع یک به یک تبدیل کنیم. حداکثر چند نقطه می‌تواند باقی بماند؟




۵ نمودار تابعی با دامنه $[1, 2]$ و برد $[2, 5]$ را رسم کنید:

الف) به شرطی که این تابع یک به یک باشد.

ب) به شرطی که این تابع یک به یک نباشد.



۶ با حذف بخشی از نمودار شیب‌دار داده شده، نمودار یک تابع یک به یک را مشخص کنید.



تصویر از کتاب ریاضیات پایه دوازدهم

اعمال جبری روی توابع

اگر f و g به ترتیب دو تابع با دامنه‌های D_f و D_g باشند، در این صورت جمع، تفریق، ضرب و تقسیم آنها را به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

تعریف دامنه	تعریف ضابطه	نام عمل
$D_{f+g} = D_f \cap D_g$	$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$	جمع
$D_{f-g} = D_f \cap D_g$	$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$	تفریق
$D_{fg} = D_f \cap D_g$	$(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$	ضرب*
$D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g - \{x \mid g(x) = 0\}$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	تقسیم

فعالیت

اگر $f(x) = 2x - 1$ و $g(x) = x - 2$ ، آن‌گاه مجموع، تفاضل، حاصل ضرب و حاصل تقسیم آنها $\left(\frac{f}{g}\right)$ را به دست آورید و دامنه هر یک را مشخص کنید.

حل:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = (2x - 1) + (x - 2) = 3x - 3$$

$$(f-g)(x) = \dots\dots\dots$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = (2x - 1) \cdot (x - 2) = 2x^2 - 5x + 2$$

$$D_{f+g} = D_{f-g} = D_{fg} = D_f \cap D_g = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$$

$$D_{\frac{f}{g}} = (D_f \cap D_g) - \{x \mid g(x) = 0\} = (\mathbb{R} \cap \mathbb{R}) - \{x \mid x - 2 = 0\} = \mathbb{R} - \{2\}$$


* ضرب دو تابع f و g را با دامنه‌های D_f و D_g می‌توان به شکل $(fg)(x) = f(x)g(x)$ تعریف کرد.

خواندنی

علی در یک کارگاه خانگی، محصولات دست‌دوز جرمی تولید می‌کند. او بخشی از مواد و لوازم مورد نیاز خود را از فروشگاه جرم و بخشی را از فروشگاه ایزاد برای خریداری می‌کند. وی پس از تولید محصولاتی هنری، آنها را در بازارچه‌های کارآفرینی به فروش می‌رساند. نمودارهای زیر مقدار خرید او را در یک سال نشان می‌دهد. نمودار تابع f نشان می‌دهد که در هر ماه سال گذشته، چند هزار تومان جرم خریداری شده است؛ برای مثال با توجه به شکل $f(3) = 300$ ، پس این هنرمند در چهارمین ماه سال، ۳۰۰ هزار تومان جرم خریده است.



نمودار تابع g نشان می‌دهد که این هنرمند در هر ماه سال گذشته چند هزار تومان ایزاد برای خریداری می‌کند.




پس در واقع هزینه‌ای که علی در کارگاه خود دارد، شامل دو بخش است: هزینه جرم و هزینه ابزار و براق.

به زبان ساده، «هزینه» او شامل قیمت همه مواد و لوازم خریداری شده است. در شکل روبه‌رو نمودار تابع هزینه خرید علی در سال گذشته رسم شده است. این تابع را با h نشان می‌دهیم.

الهام بر روی شکل، درستی مقدارهای تابع h را برای ماه‌های فصل زمستان بررسی کنید.

بداً آیا برای هر x در دامنه تابع h ، $(h(x)) = f(x) + g(x)$ درست است؟

همچنان که می‌بینید برای بدست آوردن مقادیر تابع h ، مقادیر دو تابع f و g را با هم جمع می‌کنیم.




تابع	ضابطه	دامنه
$f+g$	$(f+g)(x)=$	
$f-g$	$(f-g)(x)=$	
$f \cdot g$	$(f \cdot g)(x)=$	
$\frac{f}{g}$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x)=$	

۱ برای دو تابع یا ضابطه‌های $f(x) = x^2 + 3x + 1$ و $g(x) = x - 3$ جدول داده شده را کامل کنید.

تابع	ضابطه	دامنه
$u+v$	$(u+v)(x)=$	
$u-v$	$(u-v)(x)=$	
$u \cdot v$	$(u \cdot v)(x)=$	
$\frac{u}{v}$	$\left(\frac{u}{v}\right)(x)=$	

۲ برای دو تابع یا ضابطه‌های $u(x) = \sqrt{x} + 1$ و $v(x) = x - 1$ جدول داده شده را کامل کنید.



مطابق شکل، دو تابع f و g به ترتیب با رنگ‌های قرمز و آبی نشان داده شده‌اند.

$g(x) = \dots$

$f(x) = \dots$

$(f+g)(x) = \dots$


$(f-g)(x) = \dots$

الف) ضابطه دو تابع f و g را به دست آورید.
ب) ضابطه دو تابع $f+g$ و $f-g$ را به دست آورید.

x	u	v
$f(x)$		
$g(x)$		
$f+g(x)$		
$f-g(x)$		

ب) با تکمیل جدول مقابل، نمودارهای توابع $u+v$ و $u-v$ را با رنگ‌های مختلف رسم کنید.
ت) آیا جمع دو تابع خطی همیشه یک تابع خطی است؟ در مورد تفریق آنها چه می‌توان گفت؟

فعالیت



با توجه به شکل دهنده می‌شود که $l(x) = \frac{1}{4}f(x)$ - جاهای خالی را پر کنید.


$$g(x) = \dots\dots\dots f(x)$$

$$h(x) = \dots\dots\dots f(x)$$

با توجه به نمودار فوق ملاحظه می‌شود که:

اگر k عددی مثبت باشد، برای رسم نمودار تابع با ضابطه $y = kf(x)$ کافی است عرض هر نقطه از نمودار تابع با ضابطه $y = f(x)$ را k برابر کنیم.


کار در کلاس



۱ با توجه به نمودار تابع با ضابطه $y = f(x)$ در شکل مقابل، نمودار تابع با ضابطه $y = -f(x)$ را رسم کنید.

۲ عبارت زیر را کامل کنید.

برای رسم نمودار تابع با ضابطه $y = -f(x)$ کافی است قرینه نمودار تابع ضابطه $y = f(x)$ را نسبت به محور $\dots\dots\dots$ رسم کنیم.



۲ در شکل روبه‌رو، نمودار تابع f داده شده است. نمودار تابع با ضابطه $y = -2f(x)$ را رسم کنید.

تمرین

۱ با استفاده از نمودار تابع با ضابطه $f(x) = |x|$ ، نمودار هر یک از توابع با ضابطه‌های زیر را رسم کنید.

الف) $g(x) = -|x|$

ب) $h(x) = -|x-3|$

پ) $i(x) = 2|x-2|$

۲ در هر مورد، دامنه و ضابطه حاصل جمع، ضرب، تقسیم و تفریق دو تابع داده شده را بیابید.

$f(x) = x^2 - 4$

ب) $g(x) = x + 2$

$f(x) = |x|$

الف) $g(x) = \frac{1}{x}$

$f(x) = \frac{x-2}{x+5}$

ت) $g(x) = x^2 + 3x - 1$

$f(x) = \sqrt{x}$

ب) $g(x) = -\sqrt{x}$

$f = \{(2,5), (3,4), (0,-2)\}$

ت) $g = \{(-1,2), (-3,3), (2,4), (3,0)\}$

۳ با استفاده از نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \sqrt{x}$ ، هر یک از نمودارهای زیر را رسم کنید.


ب) $g(x) = -3\sqrt{x}$

ب) $g(x) = -\sqrt{x-2}$


الف) $g(x) = 2\sqrt{x}$

ت) $g(x) = 1 - \sqrt{x-3}$

ت) $g(x) = 1 - \sqrt{x}$



۴ در شکل مقابل، نمودار دو تابع f و g رسم شده است. نمودار حاصل جمع این دو تابع را به دست آورید.




۵ با توجه به نمودار سه تابع داده شده، مشخص کنید کدام یک از آنها برابر مجموع دو تابع دیگر است؟

خواندنی


بک اجاق دارای دو منبع گرمایی قابل تنظیم است که می‌تواند هم‌زمان، به‌طور مستقل و جدا از هم گرما تولید کند. نمودار دمایی که این دو منبع گرمایی تولید می‌کنند، به‌صورت زیر است. این نمودارها نشان می‌دهد که در عرض ۵ دقیقه، چگونه مقدار دما افزایش و یا کاهش می‌یابد. با توجه به نمودارهای زیر بیشترین و کمترین دمایی که در این اجاق تولید می‌شود چه مقدار است؟

درجه گرمایی



نمودار منبع اول

درجه گرمایی



نمودار منبع دوم



www.konkol.ir

ماهواره امید اولین ماهواره ساخت ایران است که در بهمن ماه ۱۳۸۷ در مدار فضا قرار گرفت. در شکل بالا این ماهواره در A کیلومتری سطح زمین قرار دارد و در مدار خودش حول خط استوا حرکت می‌کند. اگر α زاویه بین مرکز زمین (نقطه O) با ماهواره S و دورت‌نست‌ترین نقطه قابل دید روی کره زمین (نقطه P) با این ماهواره باشد و شعاع تقریبی کره زمین $R = 6400$ کیلومتر باشد آنگاه

$$\cos \alpha = \frac{R}{R + h}$$

(بر حسب زاویه α) $h = 6400 \cos \alpha - 6400$

واحدهای اندازه‌گیری زاویه

روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی

توابع مثلثاتی

درس اول


درس دوم

درس سوم

واحدهای اندازه‌گیری زاویه

پادآوری


- اگر محیط دایره‌ای را به ۳۶۰ کمان مساوی تقسیم کنیم، اندازه زاویه مرکزی روبه‌روی هر کدام از این کمان‌ها ۱ درجه است. اندازه هر کمان یا زاویه مرکزی روبه‌روی آن کمان بر حسب درجه برابر است.
- دایره مثلثاتی دایره‌ای است به شعاع واحد که جهت مثبت آن برخلاف گردش عقربه‌های ساعت است. به این جهت، جهت مثلثاتی می‌گوئیم. معمولاً مرکز این دایره مبدأ مختصات است.




شکل مقابل یک دایره مثلثاتی را نمایش می‌دهد که به ۲۴ قسمت مساوی تقسیم شده است. در جاهای خالی زاویه مناسب را روی شکل مشخص کنید.
برای اندازه‌گیری زاویه، واحد دیگری وجود دارد که در ادامه با آن آشنا می‌شوید.

در فعالیت زیر رابطه بین اندازه زاویه مرکزی روبه‌رو به یک کمان و طول کمان روبه‌روی آن مشخص می‌شود.


فعالیت



۱ یک شرمه دایره‌ای شکل انتخاب کنید و نخ‌ی را دور آن بپیچید و سپس باز کنید؛ طول نخ را با خط‌کش اندازه بگیرید. طول این نخ چه کمیتی از دایره را مشخص می‌کند؟ یا استفاده از این مقدار شعاع دایره را به دست آورید.




۲ قطعه نخ‌ی را به اندازه شعاع دایره برش دهید و آن را از نقطه A روی آن دایره قرار دهید تا نقطه B حاصل شود (شکل مقابل). اندازه \widehat{AOB} را با تقاله اندازه‌گیری کنید. این زاویه تقریباً چند درجه است؟



۲ دوباره این قطعه نخ را از نقطه B روی دایره قرار دهید تا نقطه C حاصل شود و این کار را ادامه دهید تا نقاط D, E, F, G روی دایره به دست آیند (شکل مقابل). در این حالت $\widehat{COD}, \widehat{BOC}, \widehat{AOB}, \widehat{FOG}, \widehat{EOE}, \widehat{DOE}$ با زاویه \widehat{FOG} و \widehat{EOE} برابر و هر یک تقریباً 60° درجه است. آیا دو نقطه G و A برهم منطبق می‌شوند؟
به این ترتیب ۶ زاویه مرکزی حاصل می‌شود که طول کمان روبه‌روی هر یک از آنها با \widehat{AOB} برابر است. به هر یک از این زاویه‌ها یک رادیان می‌گوییم.

۱ رادیان برابر است با اندازه زاویه مرکزی روبه‌روی کمانی از دایره به طول شعاع دایره.

در تمام دایره‌های زیر اندازه زاویه مشخص شده ۱ رادیان است. در هر کدام با استفاده از مقاله اندازه زاویه را بر حسب درجه مشخص کنید.




به عبارت دیگر اگر اندازه \widehat{AOB} ۱ رادیان باشد، در شکل مقابل داریم:

$$OA = \widehat{AB}$$

$$OA' = \widehat{A'B'}$$

$$OA'' = \widehat{A''B''}$$




۱ جدول زیر را کامل کنید.

شکل	شکل	شکل	شکل	شکل	شکل	شکل
r	r	r	r	r	r	طول کمان AB , $1 \leq l < \infty$
	۵ رادیان		۳ رادیان	۲ رادیان	$\frac{2}{3}$ رادیان	اندازه زاویه $\angle AOB$, $1 \leq \gamma < \infty$

همان طور که می‌بینید در هر ستون با تقسیم طول کمان به اندازه شعاع دایره (۳)، اندازه زاویه مرکزی مربوط به آن بر حسب رادیان به دست می‌آید.
با توجه به جدول صفحه قبل می‌توان گفت:

$$\text{طول کمان روبه روی زاویه} = \frac{\text{اندازه یک زاویه بر حسب رادیان}}{\text{اندازه شعاع دایره}}$$



اگر طول کمان روبه روی زاویه ۳، اندازه شعاع دایره و α اندازه زاویه بر حسب رادیان باشند، آنگاه رابطه بالا را به صورت زیر می‌توان نوشت:

$$\alpha = \frac{l}{r}$$

در رابطه بالا l و r هم واحدند.

کار در کلاس

با استفاده از رابطه بالا جدول زیر را کامل کنید:

۱-	۵۰ متر	۹۰ سانتی‌متر	۲۰۰ سانتی‌متر	۵۰ متر	۱۰ متر
۲-	۲۰ سانتی‌متر	۱۰ متر	۵ متر	۵ سانتی‌متر	۳-
۲۰ رادیان	۱۰ رادیان	۳ رادیان	۱/۵ رادیان	۱ رادیان	۵-

یادآوری

می‌دانیم نسبت محیط هر دایره به اندازه قطر آن عددی ثابت است که آن را با π نمایش می‌دهند. به آن عدد بی می‌گویند. مقدار تقریبی این عدد ۳/۱۴ است. حال جدول زیر را کامل کنید:

π رادیان	۳/۱۴ رادیان	۳ رادیان	۲ رادیان	۱ رادیان	۵ رادیان	زاویه بر حسب رادیان
تقریباً ۱۸۰	تقریباً	تقریباً	تقریباً	تقریباً ۵۷	تقریباً	زاویه بر حسب درجه

بنابراین، اندازه زاویه مرکزی روبه روی کمان نیم دایره برابر است با درجه یا رادیان. به عبارت دیگر اندازه زاویه نیم صفحه برابر است با رادیان. در نتیجه:


$$\frac{\pi}{180} \text{ رادیان} = \text{یک درجه}$$

به این ترتیب:



خواندنی

روژ چهاردهم مارس به عنوان روز جهانی عدد بی نام گذاری شده است؛ زیرا اولین به رقم این عدد تاریخ ۱۴ مارس را به صورت ۳/۱۴ نشان می‌دهد. این تاریخ مصادف با سالروز تولد آلبرت اینشتین نیز است. تاکنون حدود ۱۴ تریلیون رقم بعد از ممیز عدد بی محاسبه شده است. با توجه به اهم بودن این عدد و بی فایده بودن ارقام اعشاری آن امکان یافتن هر نوع عددی از جمله تاریخ تولد، شماره حساب بانکی، شماره تلفن و نظایر آنها در بین ارقام آن وجود دارد. مثلاً تاریخ تولد مرحوم فروفسور محمود حسینی ۳ اسفند ۱۲۸۱ است که می‌توان آن را به صورت نمایش ۶ رقمی ۳۰۳۸۱۱۲۰ نوشت. از طریق سامانه mypiday.com می‌توان این را در بین ارقام اعشاری عدد بی یافت. شکل زیر ارقام عدد بی را تا رسیدن به این نمایش نشان می‌دهد. خاش شما از طریق این سامانه تاریخ خودتان را در بین ارقام عدد بی بیابید.



کار در کلاس

۱ مطابق نمونه هر یک از زاویه‌ها را از درجه به رادیان تبدیل کنید:




اگر D اندازه زاویه α بر حسب درجه و R اندازه زاویه α بر حسب رادیان باشند، آنگاه


$$\frac{D}{180^\circ} = \frac{R}{\pi \text{ رادیان}}$$

۲ حال جدول زیر را با استفاده از این رابطه کامل کنید:

D (درجه)	5°	22°	12°	
R (رادیان)	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{7}$	$\frac{2\pi}{5}$	$\frac{5\pi}{3}$

۳ در شکل زیر در هر یک از جاهای خالی زاویه مناسب را بر حسب رادیان مشخص کنید.





فصلیت

ایستگاه فضایی بین‌المللی را مطابق شکل مقابل در نظر بگیرید که در فاصله تقریبی ۴۰۰ کیلومتری بالای سطح کره زمین قرار دارد. اگر این ایستگاه توسط ایستگاه زمینی از نقطه A تا نقطه B که با مرکز زمین زاویه 45° می‌سازند، رصد شود، این ایستگاه چه مسافتی را در مدار خود از A به B پوشش می‌دهد؟ شعاع تقریبی کره زمین را ۶۴۰۰ کیلومتر فرض کنید.

۱) ابتدا زاویه مرکزی 45° را به رادیان تبدیل کنید.

۲) رادیان $\alpha = 45^\circ \times \dots = \dots = \frac{\pi}{4}$ اندازه زاویه مرکزی $\angle AOB$ بر حسب رادیان

۳) شعاع مدار دایره‌ای شکل که ایستگاه فضایی روی آن قرار دارد، برابر است با $r = \dots$

۴) طول کمان روبه‌روی $\angle AOB$ با فرض $\pi = 3/14$ و با استفاده از رابطه $\alpha = \frac{l}{r}$ به طول تقریبی برابر است با: $l = \frac{\pi}{4} \times \dots = 5228 \text{ km}$ طول کمان $A'B'$.

تمرین

۱) هر یک از زاویه‌های 12° ، 36° ، 72° ، 108° و 144° را به رادیان تبدیل کنید و روی دایره مثلثاتی نشان دهید.

۲) هر یک از زاویه‌های $\frac{\pi}{8}$ رادیان، $\frac{2\pi}{5}$ رادیان، $\frac{3\pi}{4}$ رادیان، $\frac{4\pi}{5}$ رادیان، $\frac{5\pi}{8}$ رادیان را به درجه تبدیل کنید و به‌طور تقریبی روی دایره مثلثاتی نشان دهید.

۳) زاویه D برابر با $\frac{\pi}{4}$ رادیان است. اندازه این زاویه چند درجه است؟

۴) دایره‌ای به شعاع ۱ سانتی‌متر مفروض است. اندازه زاویه مرکزی مقابل به کمانی به طول ۸ سانتی‌متر از این دایره چند رادیان است؟

۵) درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر دلیل بررسی کنید.

الف) اگر زاویه بین دو ساق مثلث متساوی‌الساقی ۱ رادیان باشد، آنگاه اندازه قاعده این مثلث کوچک‌تر از اندازه هر یک از ساق‌های آن است.

ب) دو دایره‌ای به شعاع ۱ سانتی‌متر طول کمان روبه‌روی زاویه π رادیان تقریباً برابر با $2/14$ سانتی‌متر است.

پ) انتهای کمان زاویه $\frac{6\pi}{5}$ رادیان در ربع دوم دایره مثلثاتی قرار دارد.

ت) زاویه‌های $\frac{2\pi}{3}$ رادیان، $\frac{\pi}{4}$ رادیان، $\frac{3\pi}{6}$ رادیان، $\frac{7\pi}{6}$ رادیان، $\frac{\pi}{3}$ رادیان یکی مثلث را تشکیل می‌دهند.

خواندنی

بک زاویه بر حسب رادیان را با استفاده از ماشین حساب می‌توان به‌طور تقریبی بر حسب درجه محاسبه کرد. در اغلب ماشین حساب‌ها دکمه‌ای با نماد π وجود دارد. مثلاً برای محاسبه ۱ رادیان کافی است حاصل $1 \times \frac{180}{\pi}$ را بدست آوریم که تقریباً برابر با 57.3 است.



حالا شما هم مقدار تقریبی زاویه‌های زیر را مشابه نمونه با ماشین حساب به دست آورید.

$$1.5 \text{ رادیان} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{\pi}{6} \text{ رادیان} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2 \text{ رادیان} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$3 \text{ رادیان} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$3/14 \text{ رادیان} = \underline{\hspace{2cm}}$$


$$\frac{\pi}{4} \text{ رادیان} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{\pi}{7} \text{ رادیان} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\pi \text{ رادیان} = \underline{\hspace{2cm}}$$

روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی


در شکل مقابل، یک دایره مثلثاتی با چهار ربع آن مشخص شده است. جدول زیر علامت چهار نسبت مثلثاتی در هر ربع را نشان می‌دهد.



ربع نسبت مثلثاتی	اول $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$	دوم $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$	سوم $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$	چهارم $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$
$\sin \alpha$	+	+	-	-
$\cos \alpha$	+	-	-	+
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-

فعالیت

جدول زیر را مطابق نمونه کامل کنید.



علامت نسبت مثلثاتی	انتهای کمان روبه‌روی α	زاویه α
$\tan \alpha > 0$	ربع اول	75°
$\sin \alpha$		15°
$\cos \alpha$		21°
$\cot \alpha$		22°
$\tan \alpha$		285°

علامت نسبت مثلثاتی	انتهای کمان روبه‌روی α	زاویه α
$\cos \alpha < 0$	ربع دوم	رادیان $\frac{3\pi}{4}$
$\sin \alpha$		رادیان $\frac{4\pi}{5}$
$\tan \alpha$		رادیان $\frac{5\pi}{7}$
$\cos \alpha$		رادیان $\frac{6\pi}{11}$
$\cot \alpha$		رادیان $\frac{8\pi}{9}$

۱ اگر $\sin \alpha = \frac{-1}{3}$ و انتهای کمان دایره یه زاویه α در ربع سوم باشد، محاسبات زیر را کامل کنید :

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = \dots \xrightarrow{\cos \alpha < 0} \cos \alpha = \dots$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \dots \rightarrow \tan \alpha = \dots$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \dots \rightarrow \cot \alpha = 2\sqrt{5}$$

۲ اگر $\cot \alpha = -2$ و $\cos \alpha > 0$ سایر نسبت های مثلثاتی α را بیابید.

حل : چون $\cos \alpha > 0$ و $\cot \alpha < 0$ لذا انتهای کمان α در ربع واقع است. بنابراین :

$$\frac{1}{\sin^2 \alpha} = 1 + \cot^2 \alpha = \dots \rightarrow \sin^2 \alpha = \dots \rightarrow \sin \alpha = \frac{-1}{\sqrt{5}}$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = \dots \rightarrow \cos \alpha = \dots$$

$$\tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} \rightarrow \tan \alpha = \dots$$

کار در کلاس

۱ اگر $\cos \alpha = \frac{-4}{5}$ و $\sin \alpha > 0$ ، نسبت های مثلثاتی دیگر زاویه α را بیابید.

۱ جدول زیر را کامل کنید.

زاویه α نسبت	زاویه 0°	زاویه $30^\circ = \frac{\pi}{6}$	زاویه $45^\circ = \frac{\pi}{4}$	زاویه $60^\circ = \frac{\pi}{3}$	زاویه $90^\circ = \frac{\pi}{2}$	زاویه $180^\circ = \pi$	زاویه $270^\circ = \frac{3\pi}{2}$	زاویه $360^\circ = 2\pi$
$\sin \alpha$		$\frac{1}{2}$		$\frac{\sqrt{3}}{2}$			-1	0
$\cos \alpha$	1		$\frac{\sqrt{2}}{2}$			-1		
$\tan \alpha$					تعریف نشده		تعریف نشده	
$\cot \alpha$			1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$				

۲ حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

الف) $\cot \frac{\pi}{9} - \tan \frac{\pi}{9} \times \sin \frac{\pi}{9} =$


ب) $\frac{\tan^{-1}(\frac{\pi}{9}) + \sin^{-1}(\frac{\pi}{9})}{\cot^{-1}(\frac{\pi}{9}) - \cos^{-1}(\frac{\pi}{9})} + \cos^{-1} 70^\circ + \sin^{-1} 70^\circ =$

در ادامه می‌خواهیم به‌یستم نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های قرینه، متمم و مکمل یا هم‌جه اریاضی داریم.

نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های قرینه

شما بگویید

در زاویه α و $-\alpha$ را قرینه یکدیگر می‌گویند. اگر در شکل مقابل، $\alpha = 30^\circ$ ، نسبت‌های مثلثاتی زاویه -30° در $\triangle OP'H$ عبارت‌اند از:



قرینه یک نقطه به مختصات (a, b) نسبت به محور افقی نقطه‌ای به مختصات $(-a, -b)$ است.

$$\sin(-30^\circ) = \frac{-b}{r} = -\sin 30^\circ = \frac{-1}{2}$$

$$\cos(-30^\circ) = \frac{a}{r} = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan(-30^\circ) = \frac{-b}{a} = -\tan 30^\circ = \frac{-1}{\sqrt{3}}$$

$$\cot(-30^\circ) = \frac{a}{-b} = -\cot 30^\circ = -\sqrt{3}$$


در حالت کلی:

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$$



کار در کلاس

۱ سایر نسبت‌های مثلثاتی زاویه $-\frac{\pi}{4}$ را در بیان زا مطابق نمونه به دست آورید.

$$\sin(-\frac{\pi}{4}) = -\sin \frac{\pi}{4}$$

۱ حاصل هر یک از عبارات‌های زیر را مطابق نمونه به دست آورید:

$$\cot\left(\frac{-\pi}{3}\right) \times \cos\left(\frac{-\pi}{6}\right) + \tan\left(\frac{-\pi}{6}\right) = -\cot\frac{\pi}{3} \times \cos\frac{\pi}{6} - \tan\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{3}{2}$$

الف) $\frac{\cos(-90^\circ) + \sin(-270^\circ)}{\sin(-180^\circ) - \cos(-360^\circ)} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots$

ب) $\cot\left(\frac{-\pi}{6}\right) + \tan\left(\frac{-\pi}{3}\right) = \dots\dots\dots$

ب) $\cos(-25^\circ) \times \cos(-6^\circ) + \sin(-25^\circ) \times \sin(-6^\circ) = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های مکمل

فصلیت


دو زاویه α و β را مکمل گوئیم؛ هرگاه مجموع آنها 180° یا π رادیان شود. مثلاً دو زاویه 30° و 150° مکمل یکدیگرند. همچنین دو زاویه $\frac{\pi}{3}$ رادیان و $\frac{2\pi}{3}$ رادیان مکمل یکدیگرند (جرا). در دایره مثلثاتی زیر اگر $\alpha = 30^\circ$ آنگاه با توجه به مختصات نقطه P و انتهای کمان زاویه 150° که در ربع دوم واقع است، نسبت‌های مثلثاتی زاویه 150° عبارتند از:

$$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = y = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 150^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -x = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 150^\circ = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$\cot 150^\circ = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$



قرینه یک نقطه به مختصات (x, y) نسبت به محور عمودی نقطه‌ای به مختصات $(-x, y)$ است.

در حالت کلی:

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

کار در کلاس

۱ مکمل هر یک از زاویه‌های زیر را مشخص کنید:


الف) 75°

ب) -25°

ب) رادیان $\frac{\pi}{4}$

ت) رادیان $-\frac{\pi}{4}$

۱ نسبت‌های مثلثاتی زاویه $\frac{\Delta\pi}{\phi}$ رادیان را مطابق نمونه به دست آورید.



$$\sin \frac{\Delta\pi}{\phi} = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{\phi} \right) = \sin \frac{\pi}{\phi} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos \frac{\Delta\pi}{\phi} = \dots\dots\dots$$

$$\tan \frac{\Delta\pi}{\phi} = \dots\dots\dots$$

$$\cot \frac{\Delta\pi}{\phi} = \dots\dots\dots$$

مهارت

حاصل هر یک از نسبت‌های مثلثاتی زیر را مطابق نمونه به دست آورید.

$$\tan \frac{7\pi}{4} = \tan \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) = -\tan \frac{\pi}{4} = -\sqrt{3}$$

$$\cos \frac{7\pi}{4} = \cos (\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots$$

$$\sin 120^\circ = \sin (180^\circ - \dots) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$\cot (-120^\circ) = -\cot (\dots) = -\cot (180^\circ - \dots) = \dots\dots\dots$$


$$\cos (135^\circ) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

نسبت‌های مثلثاتی دو زاویه با اختلاف π رادیان

مهارت

نسبت‌های مثلثاتی زاویه 210° را به دست آورید.

انتهای کمان زاویه 210° در ربع سوم واقع است. در ضمن $210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$ یعنی اختلاف دو زاویه 210° و 30° برابر با π رادیان است. در دایره مثلثاتی مقابل، اگر $\alpha = 30^\circ$ نگاه با توجه به مختصات نقطه P^m نسبت‌های مثلثاتی زاویه 210° عبارت‌اند از:



$$\sin 210^\circ = \sin (180^\circ + 30^\circ) = -y = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\cos 210^\circ = \dots\dots\dots = x = \dots\dots\dots$$

$$\tan 210^\circ = \frac{\sin 210^\circ}{\cos 210^\circ} = \dots\dots\dots$$

$$\cot 210^\circ = \dots\dots\dots$$


قرینه یک نقطه به مختصات (x, y) است به معنی مختصات نقطه‌ای به مختصات $(-x, -y)$ است.

در حالت کلی:

$$\begin{aligned} \sin(\pi + \alpha) &= -\sin \alpha \\ \cos(\pi + \alpha) &= -\cos \alpha \\ \tan(\pi + \alpha) &= \tan \alpha \\ \cot(\pi + \alpha) &= \cot \alpha \end{aligned}$$

کار در کلاس

سایر نسبت‌های مثلثاتی زاویه $\frac{5\pi}{6}$ رادیان را مطابق نمونه مشخص کنید.



$$\sin \frac{5\pi}{6} = \sin(\pi + \frac{\pi}{6}) = -\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

فعالیت

حاصل هر یک از نسبت‌های مثلثاتی زیر را مطابق نمونه بیابید.

$$\sin 225^\circ = \sin(180^\circ + 45^\circ) = -\sin 45^\circ = \frac{-\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 225^\circ = \dots\dots\dots$$


$$\cos\left(\frac{-7\pi}{6}\right) = \cos \dots = \cos(\pi + \dots) = \dots = \dots$$

$$\sin\left(\frac{-7\pi}{6}\right) = \dots\dots\dots$$

$$\cot\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \dots\dots\dots$$

نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های متمم

فعالیت



دو زاویه α و β را متمم گوئیم؛ هرگاه مجموع آنها 90° یا $\frac{\pi}{2}$ رادیان شود. مثلاً دو زاویه $\alpha = 30^\circ$ و $\beta = 60^\circ$ در دایره مثلثاتی مقابل متمم یکدیگرند. در این حالت:

$$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 30^\circ = \cot 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\cot 30^\circ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

زاویه‌ای معرفی کنید که با متمم خودش برابر باشد. برای چنین زاویه‌ای داریم:

$$\sin \dots = \cos \dots = \dots$$


$$\tan \dots = \cot \dots = \dots$$

همچنین زاویه \dots و $\frac{\pi}{4}$ رادین متمم یکدیگرند؛ بنابراین:

$$\sin \frac{\pi}{4} = \cos \dots = \dots$$

$$\tan \frac{\pi}{4} = \cot \dots = \dots$$

در حالت کلی:



$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) &= \cos \alpha \\ \cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) &= \sin \alpha \\ \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) &= \cot \alpha \\ \cot\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) &= \tan \alpha \end{aligned}$$

به عبارت دیگر: اگر دو زاویه α و β متمم باشند (رادین $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$) آنگاه سینوس یکی با کسینوس دیگری و نژزاتت یکی با کتازاتت دیگری برابر است. به بیان دیگر:

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \cos \beta & , & & \tan \alpha &= \cot \beta \\ \cos \alpha &= \sin \beta & , & & \cot \alpha &= \tan \beta \end{aligned}$$

نسبت‌های مثلثاتی دو زاویه با اختلاف $\frac{\pi}{4}$ رادین

فعالیت

نسبت‌های مثلثاتی زاویه $\frac{3\pi}{4}$ رادین را به دست آورید.

چون انتهای کمان زاویه $\frac{3\pi}{4}$ رادین در ربع دوم واقع است. به دو روش می‌توان نسبت‌های مثلثاتی آن را یافت.

روش اول - زاویه $\frac{2\pi}{3}$ رادیان و $\frac{\pi}{3}$ رادیان مکمل یکدیگرند؛ یعنی $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$ بنابراین:

$$\sin \frac{2\pi}{3} = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \dots = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \frac{2\pi}{3} = \dots = -\cos \frac{\pi}{3} = \dots = -\frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{2\pi}{3} = \dots = \dots = \dots$$

$$\cot \frac{2\pi}{3} = \dots = \dots = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

روش دوم - اختلاف دو زاویه $\frac{2\pi}{3}$ رادیان و $\frac{\pi}{6}$ رادیان برابر با $\frac{\pi}{4}$ رادیان است؛ یعنی

$$\frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}$$



بنابراین با توجه به علامت نسبت‌های مثلثاتی در ربع دوم:

$$\sin \frac{2\pi}{3} = \sin \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} \right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \frac{2\pi}{3} = \cos \left(\dots \right) = -\sin \dots = -\frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{2\pi}{3} = \dots = -\cot \frac{\pi}{6} = \dots$$

$$\cot \frac{2\pi}{3} = \dots = \dots = \dots$$




در حالت کلی:

$$\sin \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = \cos \alpha$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = -\sin \alpha$$

$$\tan \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = -\cot \alpha$$

$$\cot \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) = -\tan \alpha$$





کار خودکناس

نسبت‌های مثلثاتی زاویه 135° را به دو روش به دست آورید.

خوانندگی

دانشمندان ایرانی-اسلامی نقش مؤثری در پیشرفت علم مثلثات داشته‌اند. در اوایل قرن نهم میلادی محمد بن موسی خوارزمی جدولی دقیق از نسبت‌های مثلثاتی سینوس، کسینوس و تانژانت را معرفی کرد. وی همچنین در موضوع مثلثات روی کره دست‌نویس بود. در قرن دهم میلادی ابوالوفا بوزجانی جدولی نسبت‌های مثلثاتی را توسعه داد و روابط جدیدی برای محاسبه نسبت‌های مثلثاتی و حل مثلث ارائه کرد. در موضوع روشن‌منشندی، ریاضی‌دانان مسلمان اولین افرادی بودند که سهم بسزایی در توسعه آن داشتند از جمله آنها ابوریحان بیرونی در اوایل قرن یازدهم میلادی بود. وی روش مثلث‌بندی را برای اندازه‌گیری کربا زمین و محاسبه فاصله بین مکان‌های مختلف معرفی کرد. در اواخر قرن یازدهم میلادی عمر خیام با به‌کارگیری جدول‌های مثلثاتی معادلات درجه سوم را حل کرد. در قرن سیزدهم میلادی خواجه نصیرالدین طوسی اولین فردی بود که مثلثات را به‌عنوان یک سبک ریاضی در کتاب خود به‌کارش درآورد. وی که یک ستاره‌شناس بود، به مثلثات کروی توجه ویژه‌ای کرد و قوانینی را در این شاخه ارائه نمود. در قرن یازدهم میلادی شیخ‌المغنی جمنید کانسلی قوانین جدیدی را در موضوع حل مثلثات و مثلث‌بندی مطرح کرد. وی همچنین مقادیر تابع سینوس در جدولی انواع مثلثاتی را با ۸ رقم اعشار برای زوایای $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ, \dots, 91^\circ$ محاسبه کرد. وی عدد π را با ۱۶ رقم اعشاری ارائه نمود.



(مثلاً $\sin 17^\circ = \sin 180^\circ - 17^\circ$)

۱ سینوس کدام دو زاویه برابر است؟

۲ اختلاف کدام دو زاویه $\frac{\pi}{4}$ رادیان $= 90^\circ$ می‌شود؟

نسبت‌های مثلثاتی یک نمونه را به دست آورید.

۳ آیا دو زاویه می‌توان یافت که دارای کسینوس یکسان باشند؟ چرا؟

۴ نسبت‌های مثلثاتی زاویه 180° را از روی مکمل آن بیابید.

۵ نسبت‌های مثلثاتی زاویه 135° را از روی مکمل آن بیابید.

نسبت‌های مثلثاتی زوایا با مجموع یا تفاضل 2π رادیان (مضارب زوج π رادیان)

فعالیت


یادآوری می‌کنیم برای رسم زاویه در دایره مثلثاتی نقطه P در شکل مقابل مبدأ حرکت است. برخی از زوایا از یک دور کامل دایره مثلثاتی یعنی 360° بزرگ‌ترند مانند زاویه 405° .

برای رسم چنین زاویه‌ای ابتدا در جهت مثلثاتی یک دور کامل را طی می‌کنیم؛ سپس ادامه زاویه را که به اندازه 45° است رسم می‌کنیم. در این حالت دو زاویه 405° و 45° را هم آنها می‌نامیم.

دو زاویه α و β را هم آنها گوئیم؛ هرگاه اضلاع انتهایی آنها بر هم منطبق شود (شکل مقابل). اگر دو زاویه هم آنها باشند، اختلاف آنها مضرب زوجی از π رادیان یا 180° است. مثلاً


زاویه های 45° و 45° هم انتها هستند؛ زیرا $45^\circ - 45^\circ = 360^\circ$ (شکل سمت راست) در این حالت نسبت های مثلثاتی زاویه های 45° و 45° یکسان اند. چون انتهای کمان زاویه 45° در ربع اول است؛ بنابراین:

$$\begin{aligned} \sin 45^\circ &= \sin(360^\circ + 45^\circ) = \sin 45^\circ = \dots \\ \cos 45^\circ &= \dots = \dots = \dots \\ \tan 45^\circ &= \dots = \dots = \dots \\ \cot 45^\circ &= \dots = \dots = \dots \end{aligned}$$



حال همین بررسی را روی زاویه $\frac{5\pi}{3}$ رادین انجام دهید؛ چون $\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$ بنابراین دو زاویه \dots و $\frac{5\pi}{3}$ رادین هم انتها هستند (شکل سمت راست). چون انتهای کمان زاویه $\frac{5\pi}{3}$ رادین در ربع چهارم است؛ بنابراین:

$$\begin{aligned} \sin \frac{5\pi}{3} &= \sin(2\pi - \frac{\pi}{3}) = \sin(-\frac{\pi}{3}) = \dots \\ \cos \frac{5\pi}{3} &= \dots \\ \tan \frac{5\pi}{3} &= \dots \\ \cot \frac{5\pi}{3} &= \dots \end{aligned}$$



در حالت کلی برای هر عدد صحیح k ،


$$\begin{aligned} \sin (2k\pi + \alpha) &= \sin \alpha \\ \cos (2k\pi + \alpha) &= \cos \alpha \\ \tan (2k\pi + \alpha) &= \tan \alpha \\ \cot (2k\pi + \alpha) &= \cot \alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin (2k\pi - \alpha) &= -\sin \alpha \\ \cos (2k\pi - \alpha) &= \cos \alpha \\ \tan (2k\pi - \alpha) &= -\tan \alpha \\ \cot (2k\pi - \alpha) &= -\cot \alpha \end{aligned}$$

نکته درنگاهی

مطابق نمونه هر یک از نسبت های مثلثاتی زاویه های زیر را مشخص کنید. (شکل سمت راست)

$$\begin{aligned} \sin 75^\circ &= \sin(2 \times 36^\circ + 3^\circ) = \sin 3^\circ = \frac{1}{\dots} \\ \tan(-215^\circ) &= -\tan(315^\circ) = -\tan(36^\circ - 45^\circ) = -\tan(-45^\circ) = -(-\tan 45^\circ) = \tan 45^\circ = 1 \\ \textcircled{1} \cos 3^\circ &= \dots \\ \textcircled{2} \sin 22^\circ &= \dots \\ \textcircled{3} \tan(-225^\circ) &= \dots \\ \textcircled{4} \cot(-22^\circ) &= \dots \end{aligned}$$



خواندنی (کار یا ماشین حساب)

با استفاده از ماشین حساب مطابق نمونه نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های $\frac{\pi}{8}$ و $\frac{3\pi}{8}$ را بدان و رادیکال را به طور تقریبی بیاید. (ماشین حساب باید در حالت رادیکال باشد).


$$\sin \frac{3\pi}{8} = \cos \frac{\pi}{8} \approx 0.9239$$



حاصل هر یک از نسبت‌های مثلثاتی زیر را با ماشین حساب به طور تقریبی به دست آورید.

$$\tan 20^\circ \text{ و } \sin \frac{\pi}{15} \text{ و } \cos 105^\circ$$

$$\tan \frac{3\pi}{4} \text{ و } \cos \frac{5\pi}{4} \text{ و } \tan 170^\circ$$



۵ $\sin \frac{11\pi}{4} =$

۶ $\cos(-\frac{7\pi}{4}) =$

تمرین

۱ حاصل هر یک از عبارات‌های زیر را به دست آورید:

الف) $\tan 135^\circ + \cot 120^\circ =$ ب) $\cos(-210^\circ) + \cot(240^\circ) =$

ب) $\sin 630^\circ + \tan(-540^\circ) =$

ت) $\cos(-720^\circ) + \cot(-600^\circ) + \tan 720^\circ - \tan(-600^\circ) =$

ت) $\sin(\frac{25\pi}{4}) - \cos(\frac{23\pi}{4}) =$ ج) $\frac{\sin \frac{3\pi}{4} - \cos \frac{5\pi}{6}}{\sin(-\frac{3\pi}{4}) + \tan(-\frac{2\pi}{3})} =$

۲ جدول زیر را کامل کنید:

زاویه α	120°	135°	150°	210°	225°	240°	270°	330°
نسبت								
$\sin \alpha$								
$\cos \alpha$								
$\tan \alpha$								
$\cot \alpha$								

۳ بدون استفاده از ماشین حساب درستی تساوی‌های زیر را بررسی کنید.

الف) $\sin 840^\circ = \sin 60^\circ$ ب) $\cos(-324^\circ) = \cos 36^\circ$

ب) $\tan(-1000^\circ) = \tan 80^\circ$ ت) $\sin 875^\circ = \sin 155^\circ$

۴ در تساوی زیر به جای α یک زاویه مناسب قرار دهید:

$$\sin \alpha = \cos(270^\circ + \alpha)$$

آیا برای زاویه α تنها یک مقدار می‌توان یافت؟ جواب خود را با جواب‌های دوستان خود مقایسه کنید.

نواع مثلثاتی

توابعی نظیر تابع سینوس یا ضابطه $y = \sin x$ و تابع کسینوس یا ضابطه $y = \cos x$ نمونه‌هایی از توابع مثلثاتی اند که در این درس با نمودار آنها آشنا می‌شوید.

رسم تابع سینوس

سه‌الیت


۱ جدول رویه‌رو را کامل کنید.

مجموعه زوج‌های مرتب حاصل در جدول مقابل یک تابع به صورت زیر مشخص می‌کند:


$$f = \left\{ (0, 0), \left(\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right), \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \left(\frac{\pi}{2}, 1 \right), \left(\frac{2\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \left(\frac{3\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right), \left(\pi, 0 \right) \right\}$$

۱ نقاط حاصل در جدول را در شکل زیر مشخص کنید.

x	$y = \sin x$	مختصات نقطه
۰	۰	(۰, ۰)
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\left(\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2} \right)$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$
$\frac{\pi}{2}$	۱	$(\frac{\pi}{2}, 1)$




۲ با افزودن نقاط $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ و $\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ ، $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ و $\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ و $\left(\frac{5\pi}{6}, \frac{1}{2} \right)$ و $\left(\frac{7\pi}{6}, -\frac{1}{2} \right)$ به جدول بالا، شکل زیر به دست می‌آید. (با فرض $\sqrt{3} = 1.7$ و $\sqrt{2} = 1.4$)






۴ نقاط حاصل در شکل را به ترتیب به یکدیگر وصل می‌کنیم تا شکل مقابل به دست بیاید. با افزودن تعداد نقاط جدول فوق در بازه $[0, \pi]$ این شکل به طور دقیق‌تری به دست می‌آید. شکل حاصل نمودار تابع سینوس یا ضابطه $y = \sin x$ را در این بازه مشخص می‌کند.

۵ مراحل صفحه قبل را برای رسم نمودار تابع سینوس در بازه $[\pi, 2\pi]$ انجام دهید. برای این کار ابتدا جدول زیر را کامل کنید: سپس نقاط به دست آمده در جدول را در صفحه مختصات مطابق شکل زیر مشخص و آنها را به ترتیب به یکدیگر وصل کنید.



مختصات نقطه	$y = \sin x$	x
$(\pi, 0)$	0	π
...	...	$\frac{5\pi}{6}$
...	...	$\frac{3\pi}{4}$
...	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}\pi}{6}$
...	...	2π

۶ با توجه به شکل‌های فوق، نمودار تابع یا ضابطه $y = \sin x$ در بازه $[0, 2\pi]$ در شکل زیر رسم شده است. حال با توجه به این شکل جدول زیر را درباره مقدار این تابع در هر بازه تکمیل کنید.



$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$	$\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$	$\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$	$\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$
مقدار تابع سینوس از 0 به 1 افزایش می‌یابد.			
مقدار تابع سینوس در ربع اول مثبت است.			

۷ با توجه به رابطه $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$ ، که در درس قبل آموختیم می‌توان گفت:

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$


یعنی مقدار تابع سینوس با اضافه کردن 2π رادیان به کمان آن تغییری نمی‌کند. بنابراین نمودار تابع سینوس در بازه‌های $[0, 2\pi]$ و $[2\pi, 4\pi]$ یکسان است.

همچنین داریم:

$$\sin(x - 2\pi) = \sin x$$

یعنی مقدار تابع سینوس با کم کردن 2π رادیان از کمان آن تغییری نمی‌کند. در نتیجه نمودار تابع سینوس در بازه‌های $[0, 2\pi]$ و $[2\pi, 4\pi]$

و یکسان است. در حالت کلی چون مقدار تابع سینوس با اضافه یا کم کردن مضارب زوج π رادبان به گمان آن تغییر نمی‌کند، نمودار تابع سینوس در بازه‌های $[2k\pi, (2k+2)\pi]$ و $[(2k+2)\pi, 4k\pi]$ یکسان است. به این ترتیب منحنی این تابع که در بازه $[0, 2\pi]$ رسم شده در بازه‌های $[2\pi, 4\pi]$ ، $[4\pi, 6\pi]$ ، $[6\pi, 8\pi]$ ، $[8\pi, 10\pi]$ ، $[10\pi, 12\pi]$ ، $[12\pi, 14\pi]$ ، $[14\pi, 16\pi]$ ، $[16\pi, 18\pi]$ تکرار می‌شود. در شکل زیر نمودار تابع سینوس در ۲ تکرار رسم شده است. این نمودار را برای ۴ تکرار کامل کنید.



با توجه به شکل بالا جاهای خالی را در بازه‌های بزرگی‌های تابع سینوس با ضابطه $y = \sin x$ کامل کنید.
 الف) دامنه تابع سینوس و برد آن است.

ب) مقدار تابع سینوس در طول‌های $x = k\pi$ ، $k \in \mathbb{Z}$ ، برابر با است.

پ) حداکثر مقدار تابع سینوس برابر با است که در نقاطی به طول‌های $x = \frac{\pi}{4}$ ، $x = \frac{5\pi}{4}$ ، $x = \frac{9\pi}{4}$ ، $x = \frac{13\pi}{4}$ و در حالت کلی $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ، $k \in \mathbb{Z}$ به دست می‌آید.

ت) حداقل مقدار تابع سینوس برابر با است که در نقاطی به طول‌های $x = \frac{3\pi}{4}$ ، $x = \frac{7\pi}{4}$ ، $x = \frac{11\pi}{4}$ ، $x = \frac{15\pi}{4}$ و در حالت کلی $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ، $k \in \mathbb{Z}$ به دست می‌آید.

گردد کناسی


هر یک از توابع یا ضابطه‌های داده شده دارای کدام نمودار است؟

۱) $y = 2 \sin x$


۲) $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$

۳) $y = \sin x + 1$


۴) $y = -\sin x + 1$




(الف)



(ب)



(ج)



(ت)

۱ جدول زیر را کامل کنید.


θ	$y = \cos \theta$	مختصات نقطه
۰	۱	(۰, ۱)
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} = 1/\sqrt{2}$	$(\frac{\pi}{4}, 1/\sqrt{2})$
$\frac{\pi}{2}$
$\frac{3\pi}{4}$
π

به این ترتیب مجموعه زوج‌های مرتب زیر به دست می‌آید.


$$f = \{(0, 1), (\dots, \dots), (\dots, \dots), (\dots, \dots), (\dots, \dots)\}$$

آیا این مجموعه یک تابع را مشخص می‌کند؟

۲ نقاط جدول بالا را در این شکل مشخص کنید.




۳ نقاط به طول‌های $x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}$ را به جدول بالا اضافه کنید تا شکل زیر به دست آید. ($\sqrt{3} = 1/\sqrt{2}$)




θ	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$
$y = \cos \theta$	$\frac{1}{2}$...

- ۴ نقاط شکل صفحه قبل را به ترتیب به یکدیگر وصل می‌کنیم تا شکل مقابل به دست آید. این شکل نمودار تابع کسینوس یا ضابطه $y = \cos \theta$ را در بازه $[0, \pi]$ مشخص می‌کند.




- ۵ جدول زیر را کامل کنید تا نمودار تابع کسینوس در بازه $[0, 2\pi]$ به صورت شکل مقابل به دست آید.



θ	0	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π
y	1	-1	-	-	-	1

- ۶ با توجه به مراحل بالا نمودار تابع کسینوس یا ضابطه $y = \cos \theta$ در بازه $[0, 2\pi]$ در شکل زیر رسم شده است. با توجه به این شکل جدول زیر را کامل کنید.



$$\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

$$\left[\frac{\pi}{4}, \pi\right]$$

$$\left[\pi, \frac{3\pi}{4}\right]$$

$$\left[\frac{3\pi}{4}, 2\pi\right]$$

مقدار تابع کسینوس از ۱ به ۰ کاهش می‌یابد.

مقدار تابع کسینوس در ربع اول مثبت است.


- ۷ تابع کسینوس دارای نمودار یکسانی در بازه‌های $[0, 2\pi]$ ، $[2\pi, 4\pi]$ ، $[4\pi, 6\pi]$ ، $[6\pi, 8\pi]$ و $[8\pi, 10\pi]$ است. در شکل زیر نمودار تابع کسینوس در بازه $[0, 4\pi]$ رسم شده است. شکل را کامل کنید.



- ۸ با توجه به شکل صفحه قبل جاهای خالی را در خصوص ویژگی‌های تابع با ضابطه $y = \cos x$ کامل کنید.
 الف) دامنه تابع کسینوس و برد آن است.
 ب) مقدار تابع کسینوس در طول‌های برابر با صفر است.
 ج) حداکثر مقدار تابع کسینوس است که در طول‌های $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ به دست می‌آید.
 د) حداقل مقدار تابع کسینوس است که در طول‌های به دست می‌آید.

کار در کلاس

شکل زیر نمودار تابع با ضابطه $y = 3 \cos x$ را نشان می‌دهد. به طور مشابه هر یک از توابع با ضابطه‌های داده شده را در بازه $[0, 2\pi]$ با استفاده از نمودار تابع کسینوس رسم کنید.



- ۱) $y = \cos(x + \frac{\pi}{4})$
 ۲) $y = \cos x - 1$
 ۳) $y = 1 - \frac{1}{4} \cos x$
 ۴) $y = \cos(x - \frac{\pi}{4}) + 1$

تمرین


۱ آیا نمودارهای هر جفت از توابع با ضابطه‌های زیر بر هم منطبق اند یا خیر؟

- ۱) $y = \sin x$, $y = \cos(x - \frac{\pi}{4})$ ۲) $y = \cos x$, $y = \sin(\frac{\pi}{4} + x)$
 ۳) $y = \cos x$, $y = \cos(2\pi - x)$ ۴) $y = \sin x$, $y = \sin(5\pi - x)$

۲ نمودار هر یک از توابع با ضابطه‌های زیر را در دستگاه مختصات در بازه‌های داده شده رسم کنید.

- ۱) $y = \frac{1}{4} \sin x$, $[0, 2\pi]$ ۲) $y = 2 \cos x + 1$, $[-2\pi, 2\pi]$
 ۳) $y = 1 - \sin x$, $[-2\pi, 2\pi]$ ۴) $y = -1 + \cos x$, $[-4\pi, 4\pi]$
 ۵) $y = 1 + \sin(x + \frac{\pi}{4})$, $[0, 2\pi]$ ۶) $y = \cos(x - \frac{\pi}{4})$, $[2\pi, 4\pi]$

۲ با توجه به نمودار توابع سینوس و کسینوس، مشخص کنید هر یک از دو نمودار زیر کدام یک از ضابطه‌های داده شده را دارند. نمودار تابع یا سایر ضابطه‌ها را نیز رسم کنید.




(الف) $y = 2\cos x + 1$

(ب) $y = 2\sin x - 1$


(پ) $y = 2 - \cos x$

(ت) $y = \sin x - 2$

۱ با ذکر دلیل مشخص کنید کدام یک از گزاره‌های زیر درست و کدام نادرست است. (الف) شکل زیر، نمودار تابع یا ضابطه $y = \frac{1}{2} \sin x$ را نشان می‌دهد.



(ب) شکل زیر، نمودار تابع یا ضابطه $y = \cos x - \frac{1}{4}$ را نشان می‌دهد.




(پ) برای رسم نمودار تابع یا ضابطه $y = 1 + \sin x$ کافی است نمودار تابع سینوس را به اندازه یک واحد در راستای محور y انتقال دهیم.

(ت) برای رسم نمودار تابع یا ضابطه $y = -\cos x$ کافی است نمودار تابع کسینوس را نسبت به محور x ها قرینه کنیم.

خواندنی

اصوات به صورت مخلوطی از موج‌های سینوسی شکل با بسامدهای مختلف می‌توانند نمایش داده شوند.



خواندنی

طول روز به‌طور تقریبی در ایران در t امین روز سال بر حسب ساعت با استفاده از تابع مثلثاتی H با ضابطه زیر مدل‌سازی می‌شود.

$$H(t) = 12.4 \sin \frac{2\pi}{365}(t - 80) + 12.2$$

در این رابطه عدد ۱ که به معنای اولین روز سال همی اولین روز فروردین ماه است؛ اعتدال بهاری نام دارد. در این روز، مدت زمان روز و شب در سراسر کره زمین با هم برابر است. همچنین عدد ۱۲ تعداد ساعات روزستانی در یک روز به‌طور متوسط است. ضریب ۲۴ در این رابطه عددی است که اگر آن را با ۱۲ جمع یا از آن کم کنیم، طولانی‌ترین و کوتاه‌ترین مدت زمان روز در یک شبانه‌روز حاصل می‌شود که عبارتند از ۱۴/۴ ساعت (اول تیر ماه) و ۹/۶ ساعت (اول دی ماه). عدد ۳۶۵ نیز تعداد روزهای سال است. به عنوان مثال طول روز در اول مهر ماه که ۱۸۷ امین روز سال است، تقریباً برابر است با:

$$H(187) = 11.8 \text{ ساعت}$$

حال، شما طول تقریبی روز را در روزهای ۱۴ اردیبهشت ماه، ۱۵ مرداد ماه، ۲۴ بهمن ماه و ۳۰ آذر ماه به دست آورید.



توابع نمایی و نگارینمی



فصل



پایه‌های طلایی و نقره‌ای (تخت جمشید) از دوران هخامنشیان (موزه ملی ایران)

سنگ نوشته‌های گنبدخسار (اصفهان) از دوران هخامنشیان (موزه ملی ایران)

آیا تا به حال اندیشیده‌اید که باستان‌شناسان چگونه طول عمر یک اثر باستانی را تعیین می‌کنند؟
با استفاده از روش سن‌پایی کربن ۱۴، می‌توان عمر یک اثر باستانی را محاسبه کرد. در این روش، تعیین قدمت اثر، با یک تابع نگارینمی مثل منحنی منسوب

تابع نمایی و ویژگی‌های آن

تابع نگارینمی و ویژگی‌های آن

نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و نگارینمی

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس اول

تابع نمایی و ویژگی‌های آن

کمالیت

مسابقات جام حذفی فوتبال ایران در فصل ۹۴-۹۳ با شرکت ۳۲ تیم در پنج مرحله بازی از یک شانزدهم نهایی تا بازی نهایی به صورت زیر برگزار شد. همان طور که می‌بینید، در هر مرحله تیم برنده به مرحله بعدی می‌رود و تیم بازنده حذف می‌شود! به همین دلیل جام حذفی نامیده می‌شود.





- ۱ در بازی نهایی چند تیم حضور دارند؟
- ۲ در مرحله قبل از بازی نهایی چند تیم حضور دارند؟
- ۳ تعداد تیم‌ها در هر مرحله با تعداد تیم‌ها در مرحله قبل از آن چه ارتباطی دارد؟
- ۴ چه رابطه‌ای بین تعداد مراحل و تعداد کل تیم‌های شرکت‌کننده در این مسابقات برقرار است؟
- ۵ با توجه به الگوی ارائه شده در شکل، اگر تعداد مراحل برابر ۶ باشد، تعداد تیم‌های اولیه چند است؟
- ۶ اگر تعداد مراحل ۵ و تعداد کل تیم‌ها ۱۱ باشد، چه رابطه‌ای بین ۵ و ۱۱ برقرار است؟

فعالیت

جدول زیر را کامل و نقاط به دست آمده را در نمودار مشخص کنید. مقادیر به صورت تقریبی نوشته شده است.

2	$\frac{4}{3}$	2	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{3}{2}$	-2	$-\frac{5}{2}$	-3	-4	5
.....



دیده‌ام که برای هر عدد گویای a ، مقداری برای 2^a به دست می‌آید و نقطه $(a, 2^a)$ را می‌توان در دستگاه مختصات نشان داد. این موضوع برای اعداد گنگ نیز برقرار است، یعنی برای هر عدد گنگ مانند b نیز مقداری برای 2^b خواهیم داشت و مختصات $(b, 2^b)$ نیز نقطه‌ای را در دستگاه مختصات نمایش می‌دهد. اگر برای تمام اعداد حقیقی x ، مقدار 2^x را به دست آوریم و نقاط $(x, 2^x)$ را در دستگاه مختصات مشخص کنیم، نمودار مقابل به دست خواهد آمد.

توان های حقیقی

در کتاب سال دهم، به ازای هر عدد حقیقی مثبت a ($a \neq 1$) و عدد گویای $\frac{p}{q}$ ، مقدار $a^{\frac{p}{q}}$ را تعریف کردیم و ویژگی های مقدماتی آن را به دست آوردیم. این قوانین برای توان های حقیقی نیز برقرار است؛ یعنی اگر a و b دو عدد حقیقی مثبت و مخالف 1 و a و b دو عدد حقیقی باشند، داریم:

$$\begin{array}{llll} \text{الف)} a = 1 & \text{ب)} a^{-a} = \frac{1}{a^a} & \text{پ)} a^a \cdot a^b = a^{a+b} & \text{ت)} (a^a)^b = a^{ab} \\ \text{ث)} (ab)^c = a^c \cdot b^c & \text{ج)} \left(\frac{a}{b}\right)^c = \frac{a^c}{b^c} & \text{ح)} \frac{a^a}{a^b} = a^{a-b} & \end{array}$$



کار در کلاس

۱ جدول های زیر را تکمیل کنید. (مقادیر به صورت تقریبی نوشته شده است.)

a	$\frac{1}{4}$...	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{4}$
$a^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt{1/4}$...	$\sqrt{1/2}$	1	$\sqrt{1/2}$	$\sqrt{1/4}$	1	$\sqrt{1/2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{1/4}$
a	$1/2$	$1/4$	$1/8$	$1/16$	$1/32$	$1/64$	$1/128$	$1/256$	$1/512$	$1/1024$
$a^{1/2}$	$\sqrt{1/2}$	$\sqrt{1/4}$	$\sqrt{1/8}$	$\sqrt{1/16}$	$\sqrt{1/32}$	$\sqrt{1/64}$	$\sqrt{1/128}$	$\sqrt{1/256}$	$\sqrt{1/512}$	$\sqrt{1/1024}$


۲ حال، این دو نمودار را در یک دستگاه مختصات رسم می کنیم. در چند نقطه مقادیر 2^x و x^2 با هم مساوی اند؟

۳ در $x=0$ ، منفی در ... و عدد ثابت در ... است؛ ولی در $x=2$ ، ... در توان و ... در پایه است.



خواندنی

بیشتر باتری‌ها در فاصله ۲۰ دقیقه به حداکثر رشد خود می‌رسند و قادر به تولید مثل می‌شوند. در شرایط محیطی مساعد، باکتری با سرعت زیادی تکثیر می‌شود. مثلاً یک باکتری بعد از ۲ دقیقه به دو باکتری تبدیل می‌شود. ۲ دقیقه بعد از آن دو باکتری، چهار باکتری بوجود می‌آید و به همین ترتیب تعداد باکتری‌ها به ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴، ۱۲۸، ۲۵۶ و... می‌رسد. اگر این روند تکثیر باکتری‌ها تا ۲۴ ساعت ادامه یابد، از یک باکتری، تعدادی از باکتری به وزن 2^{288} تن بوجود خواهد آمد! باکتری‌ها از طریق تولید سم یا تخریب سلول‌های بدن، باعث بیماری می‌شوند و به همین نسبت می‌رسانند.




باکتری سل

هر تابع با ضابطه $f(x) = a^x$ که در آن $a \in \mathbb{R}$ و $a > 0$ ، $a \neq 1$ یک تابع نمایی نامیده می‌شود.

مثال: توابع با ضابطه‌های $y = 2^x$ و $y = 3^x$ و $y = (\frac{1}{2})^x$ و $y = (\frac{1}{3})^x$ نمونه‌ای از توابع نمایی هستند.

فعالیت

در شکل مقابل نمودار تابع نمایی با ضابطه $y = 2^x$ رسم شده است.



۱ محل تقاطع این نمودار با محور عرض‌ها چه نقطه‌ای است؟

۲ دامنه و برد این تابع را به صورت بازه بنویسید.

۳ آیا این تابع یک به یک است؟ چرا؟

۴ عدد $\sqrt{2}$ را روی محور x ‌ها مشخص کنید و به کمک نمودار، مقدار $2^{\sqrt{2}}$ را به صورت تقریبی به دست آورید.

۵ عدد $\frac{7}{4}$ روی محور y ‌ها مشخص شده است. با استفاده از نمودار، مقدار تقریبی عدد x را روی محور طول‌ها به دست آورید؛ به طوری که $2^x = \frac{7}{4}$.


۶ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

$$2^{\sqrt{2}}, 2^{\frac{1}{2}}, 2^{\frac{1}{4}}, 2^{\frac{1}{8}}, 2^{\frac{1}{16}}, 2^{\frac{1}{32}}, 2^{\frac{1}{64}}, 2^{\frac{1}{128}}$$

۷ در حالت کلی اگر $a < b$ ، چه رابطه‌ای بین 2^a و 2^b برقرار است؟

نکته در کتاب

نمودار تابع یا ضابطه $y=3^x$ را با استفاده از نقاط جدول زیر رسم شده است.



x	y=3 ^x
-2	1/9
-3/2	1/27
-1	1/3
0	1
1/2	3/2
1	3

خواندنی

در اغلب ماشین حساب‌ها دکمه 3^x (با 3^y) وجود ندارد که با استفاده از آن می‌توانید مقادیر اعداد توان‌دار را به دست آورید. برای مثال جهت محاسبه 3^2 ابتدا عدد ۲ را وارد می‌کنید؛ سپس دکمه 3^x و بعد عدد ۵ و سپس دکمه تساوی را فشار می‌دهید که عدد ۳۲ ظاهر می‌شود. اگر عدد توان، طبیعی نبود، آن را داخل پرانتز قرار می‌دهیم. مثلاً: $3^{2.5}$ در برخی از ماشین حساب‌ها به جای دکمه 3^x نمادی به صورت 3^{\square} وجود دارد که همان کار را انجام می‌دهد.


برای تمرین، مقادیر زیر را با استفاده از ماشین حساب به دست آورید. (تا یک رقم اعشار)

۱) 3^{-2} ۲) 3^{-1} ۳) 3^0 ۴) 3^1 ۵) 3^2

- ۱) $3^{\sqrt{2}}$
- ۲) $3^{\sqrt{3}}$
- ۳) $3^{1.1}$
- ۴) 3^{-2}
- ۵) $3^{(1+\sqrt{2})}$



۱) جدول زیر را کامل کنید و با استفاده از آن نمودار تابع یا ضابطه $y=4^x$ را رسم کنید.



x	y=4 ^x
.....	1/4
1/2	1/2
0
1/2
2	16

۱) دامنه و برد توابع فوق را باهم مقایسه کنید.

۲) با استفاده از نمودار، در جاهای خالی علامت مناسب قرار دهید.

$3^{\frac{1}{2}} < 3^{\frac{1}{3}}$ (الف)

$4^{\sqrt{2}} < 4^{\sqrt{3}}$ (ب)


۱) اگر $0 < a < 1$ ، در جاهای خالی علامت مناسب قرار دهید.

$3^a < 3^b$ (الف)

$4^a < 4^b$ (ب)

۱ با استفاده از جدول زیر، نمودار تابع با ضابطه $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ را رسم کنید.

x	-3	-2	0	1	2
$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	$\sqrt{4}$	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$



۲ محل تقاطع نمودار این تابع با محور y ها چه نقطه‌ای است؟

۳ دامنه و برد این تابع را بنویسید.

۴ آیا این تابع یک به یک است؟ چرا؟


۵ با استفاده از نمودار فوق، در جاهای خالی علامت مناسب قرار دهید.

الف $\left(\frac{1}{2}\right)^5 < \left(\frac{1}{2}\right)^6$

ب $\left(\frac{1}{2}\right)^6 < \left(\frac{1}{2}\right)^5$

ب $\left(\frac{1}{2}\right)^3 < \left(\frac{1}{2}\right)^2$

۶ با استفاده از نمودار، اگر $0 < x < 1$ ، چه رابطه‌ای بین $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ و $\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x}$ وجود دارد؟



خواندنی

با استفاده از نرم‌افزار جنوجیرا (GeoGebra) می‌توانید نمودارهای توابع نمایی را به راحتی رسم کنید. برای این کار در نوار دستور، ضابطه تابع را حروف چینی کرده و کلید Enter را بزنید. در نتیجه گرافیکی، نمودار مطلوب نمایش داده می‌شود.

در تصویر مقابل، نمودار تابع با ضابطه $y = 2^x$ در محیط این نرم‌افزار نمایش داده شده است.

خواندنی


یک داری بیماری آنم که به صورت قرص ۱۰۰ میلی گرمی موجود است. وای یک بیمار تجویز شده است. اگر او این قرص را مصرف کند و بداندیم در زمان مصرف دارو هیچ میرالی از آن در بدن وی موجود نیست. در این صورت می توان پیش بینی کرد که بعد از گذشت ۴ دقیقه، در مجموع از این دارو به میزان ۱۰۰ میلی گرم، در جریان خون او وجود خواهد داشت که از رابطه زیر بدست می آید:

$$A = 100 \left[1 - (0.9)^t \right]$$



کار در کلاس

نمودار توابع با ضابطه های $y = 2^x$ و $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ را در نظر بگیرید.
۱) نمودارهای این دو تابع نسبت به کدام محور مختصات قرینه اند؟



۲) با جایگذاری $x = 2$ در تابع با ضابطه $y = 2^x$ و $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ با همان y دست می یابیم.


۳) نامنه و برد این دو تابع چه رابطه ای با هم دارند؟

۴) دو تابع نمایی دیگری که نسبت به محور y ها قرینه اند، مثال بزنید.

نمودار توابع با ضابطه های $y = a^x$ و $y = a^{-x}$ (با $a > 0$ و $a \neq 1$) نسبت به محور y ها قرینه اند.


کار در کلاس

نمودار تابع با ضابطه $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ را رسم کنید.



سر و کهن او کوه (یزد) با عمر تقریبی ۲۰۰۰ سال

- با توجه به مطالبی که در این درس آموخته اید، جملات زیر را تکمیل کنید.
- دامنه تابع باضابطه $y = a^x$ ($a > 1$) مجموعه اعداد حقیقی و برد آن _____ است.
 - دامنه تابع باضابطه $y = a^x$ ($0 < a < 1$) _____ و برد آن بازه $(0, +\infty)$ است.
 - نمودار توابع فوق محور y ها را در نقطه _____ قطع می کند و محور x ها را در هیچ نقطه ای قطع نمی کند.
 - این دو تابع، یک به یک _____ زیرا خطوط موازی محور x ها، نمودار آنها را حداکثر در _____ نقطه قطع می کند. نمودار توابع نمایی در حالت کلی مشابه نمودارهای زیر است.



معادلات نمایی

معادله ای را که در آن متغیر در توان قرار گرفته باشد، معادله نمایی می نامند. برای حل معادلات نمایی از خاصیت یک به یک بودن تابع نمایی استفاده می کنیم. اگر a یک عدد حقیقی مثبت مخالف ۱ باشد و داشته باشیم $a^x = a^y$ آنگاه $x = y$ و برعکس.

$$\text{الف) } 3^{2x-2} = 81 \rightarrow 3^{2x-2} = 3^4 \rightarrow 2x - 2 = 4 \rightarrow x = \frac{7}{2}$$

مثال: معادله های نمایی مقابل را حل کنید.

$$\text{ب) } 4^{2x-1} = 8^{x+1} \rightarrow (2^2)^{2x-1} = (2^3)^{x+1} \rightarrow 4x - 2 = 3x + 3 \rightarrow x = 5$$

$$\text{ب) } 5^{2n-1} = 125^{n+1} \rightarrow 5^{2n-1} = 5^{3n+3} \rightarrow 2n - 1 = 3n + 3 \rightarrow n = -\frac{4}{1}$$

تمرین

۱ کدام یک از ضابطه‌های زیر مربوط به یک تابع نمایی است؟

الف) $y = (-1)^x$

ب) $y = x^2$

ج) $y = 2x^2 - 3x + 1$

الف) $y = \sqrt{x-1}$

ب) $y - 3x = 2$

ج) $y = \left(\frac{3}{4}\right)^x$

۲ کدام یک از نقاط زیر، روی نمودار تابع با ضابطه $y = 3^x$ قرار دارند؟

الف) $(-1, \frac{1}{3})$

ب) $(1, 3)$

ج) $(\sqrt{3}, \frac{1}{3})$

د) $(-1, 1)$

ه) $(3, 1)$

و) $(1, -1)$

۳ کدام گزاره صحیح است؟

الف) نقطه $(\frac{1}{5}, \sqrt{5})$ روی نمودار تابع با ضابطه $y = 5^x$ قرار دارد.

ب) محل تقاطع نمودار تابع با ضابطه $y = 10^x$ با محور y ها، نقطه $(-1, 1)$ است.

ج) دامنه توابع با ضابطه‌های $y = 2^x$ و $y = x^2$ مساوی‌اند.

د) محل تقاطع نمودار تابع با ضابطه $y = 6^x$ با محور x ها، نقطه $(6, 1)$ است.

۴ الف) نمودار تابع با ضابطه $y = 3^x$ را رسم کنید و مقدار تقریبی عدد $3^{\sqrt{3}}$ را با توجه به نمودار به دست آورید.

ب) نمودار تابع با ضابطه $y = (\frac{1}{3})^x$ را رسم کنید و مقدار تقریبی $(\frac{1}{3})^{\sqrt{5}}$ را با توجه به نمودار به دست آورید.

۵ فرض کنیم $f(x) = 3^x$ ، $g(x) = (\frac{1}{3})^x$ و $h(x) = 10^{-x}$ ، مقادیر زیر را به دست آورید.

الف) $h(-2)$

ب) $g(-1)$

ج) $f(3)$

۶ معادلات نمایی زیر را حل کنید.

الف) $4^{3x+2} = \frac{1}{64^3}$

ب) $9^{2x+2} = 27^{x+1}$

ج) $2^{3x-2} = \frac{1}{3^2}$

الف) $(\frac{3}{5})^{2x+1} = \frac{25}{9}$

ب) $9^x = 3^{2x+5}$

خوانندگی

جمعیت جهان در طول قرن گذشته به سرعت رشد کرده است. در نتیجه تقاضای افزایش انرژی برای منابع جهان ایجاد شده است. در بیشتر مواقع، از توابع و معادلات نمایی برای مدل‌سازی رشد‌های سریع استفاده می‌شود. جمعیت جهان که با تقریباً ۷ میلیارد نفر در سال ۱۹۶۰ برابر با ۳ میلیارد نفر و در سال ۲۰۰۸ برابر با ۶۷۷ میلیارد نفر بوده است، این رشد جمعیت را می‌توان با رابطه $P(t) = 3(1.017)^{t-1960}$ که در آن t نشان‌دهنده سال است، نمایش داد و از آن برای پیش‌بینی جمعیت در سال‌های آینده استفاده کرد.




تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن

بسیاری از اندازه‌گیری‌ها در علوم مختلف، طیف وسیعی از اعداد را در برمی‌گیرد که برای سادگی محاسبات، می‌توان آنها را توان‌هایی از یک عدد خاص در نظر گرفت و اندازه‌های بسیار بزرگ را در ابعاد بسیار کوچک‌تری نشان داد یا اندازه‌های بسیار کوچک را در ابعاد مناسب نمایش داد. کاربرد این ساده‌سازی محاسبات در علوم مختلف مانند فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، جمعیت‌شناسی، مهندسی و... مشهود است.

تابع لگاریتمی

فصلیت

در درس اول با تابع نمایی با ضابطه $f(x) = 2^x$ و نمودار آن آشنا شدیم. همان‌طور که مشاهده کردیم، این تابع یک به یک است؛ بنابراین وارون آن نیز یک تابع است. نمودار تابع f^{-1} و وارون آن، تابع f^{-1} در دستگاه مختصات زیر رسم شده است که نسبت به خط $y = x$ قرینه‌اند.



خواندنی

روبن لگاریتم‌گیری در سال ۱۶۱۲ از سوی جان نپر (۱۶۱۲-۱۵۵۰)، ریاضیدان اسکاتلندی در کتابی با عنوان «وصیفی بر قانون شگفت‌انگیز لگاریتم» ارائه شد.

در فیزیک، مفهوم بهای شدت صوت وجود دارد که درک انسان را از بلندی صوت بیان می‌کند. تراژ شدت یک صوت عبارت است از لگاریتم (در پایه ده) نسبت شدت آن صوت به شدت صوت مبنا. تراژ شدت صوت را با β نشان می‌دهند و یکای آن را به افتخار پل فیزیک‌دان امریکایی مخترع تلفن، بی (B) و دسی‌بل (dB) نام‌گذاری کرده‌اند. هر بل برابر ده دسی‌بل است. β شدت صوت معیاری است که برای آستانه‌های شنوایی گوش سالم است.

$$\beta = \log_{10} I$$

تراژ شدت صوت dB	صدا
۰	شدت صوت مبنا
۱۰	فص‌شنیدن
۲۰	رنگ درختان در سیم
۴۰	صحت کردن از فاصله یک متری
۶۰	همیشه در فرودگاه
۷۰	جر و صدای خودروهایی
۷۰	خندان لبخند
۱۰۰	آواز در دالکی
۱۰۰	آوازی با صدای 100-10
۱۳۰	سقطی
۱۴۰	عروس هواپسای جت در
۱۴۰	حین شدت‌نشان
۱۷۰	راکت فضایی در موقع بلند شدن

۱ دامنه و برد دو تابع f و f^{-1} در نمودار قبل را به دست آورید.


۲ با توجه به نقاط f و f^{-1} در نمودار، جدول زیر را تکمیل کنید.

$f(-2) = \frac{1}{4}$	$f(-1) = \dots$	$f(0) = \dots$	$f(2) = \dots$
$f^{-1}(\frac{1}{4}) = \dots$	$f^{-1}(\frac{1}{2}) = \dots$	$f^{-1}(1) = \dots$	$f^{-1}(2) = \dots$

تسلیم

نمودار تابع با ضابطه $f(x) = 3^x$ در دستگاه مختصات زیر رسم شده است.

۱ با توجه به نقاط نمودار f ، نمودار f^{-1} را رسم کنید.



۲ با توجه به نقاط f و f^{-1} در نمودار قبل، جاهای خالی را تکمیل کنید.

$f(-2) = \frac{1}{9}$	$f(0) = \dots$	$f(1) = \dots$	$f(\dots) = 9$
$f^{-1}(\frac{1}{9}) = \dots$	$f^{-1}(1) = \dots$	$f^{-1}(\dots) = 1$	$f^{-1}(9) = \dots$

۲ دامنه و برد دو تابع f و f^{-1} را به دست آورید.


با توجه به مطالب فوق، وارون تابع با ضابطه $f(x) = 3^x$ را به صورت $f^{-1}(x) = \log_3 x$ نشان می‌دهیم و آن را لگاریتم \log_3 در مبنای ۳ می‌نامیم. به عبارتی دیگر توابع نمایی و لگاریتمی وارون یکدیگرند.

۱ با توجه به نمودار توابع نمایی و لگاریتمی، دامنه و برد آنها را به طور کلی بنویسید.

وازون تابع نمایی یا ضابطه $f(x) = a^x$ را به صورت $f^{-1}(x) = \log_a x$ نشان می‌دهیم
و آن را لگاریتم $\log_a x$ در مبنای a می‌نامیم. به عبارت دیگر برای هر عدد حقیقی مثبت
 $a (a \neq 1)$ داریم:

$$f(x) = a^x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = \log_a x$$

کار در کتاب




در شکل مقابل، نمودار نیش تابع رسم شده است که دو به دو
وازون یکدیگرند. برای توابعی که ضابطه آنها نوشته شده، ضابطه
وازون آنها را روی نمودار مربوطه بنویسید و دامنه و برد هر تابع
را مشخص کنید.

کار در کتاب


نمودار تابع یا ضابطه $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ را در نظر بگیرید. اعداد زیرین کدام اعداد صحیح قرار دارند؟

الف) $\log_{\frac{1}{3}} 3$


ب) $\log_{\frac{1}{3}} (1/5)$




شود از چند تابع لگاریتمی در زیر رسم شده است. ضابطه مربوط به هر کدام را بنویسید.




(۱)




(۲)




(۳)



(۴)



(۵)



(۶)

فعالیت

با توجه به مطالبی که تا به حال خوانده‌اید، جملات زیر را تکمیل کنید.

۱ دامنه تابع با ضابطه $y = \log_a x$ ($a > 1$)، مجموعه اعداد حقیقی مثبت و برد آن است.

۲ دامنه تابع با ضابطه $y = \log_a x$ ($0 < a < 1$)، بازه و برد آن است.

۳ نمودار توابع فوق، محور x ها را در نقطه قطع می‌کند و محور y ها را قطع نمی‌کند.


۴ این دو تابع، یک به یک زیرا خطوط موازی محور x ها، نمودار آنها را حداکثر در نقطه قطع می‌کند.

۵ وارون تابع نمایی، تابع است و وارون تابع لگاریتمی، تابع است.

اگر a عدد حقیقی مثبت ($a \neq 1$) باشد، داریم: $a = 1$ ، بنابراین همواره:

$$\log_a a = 1$$


نمودار تابع لگاریتمی در حالت کلی، مشابه نمودارهای زیر است.



لگاریتم یک عدد

مثالیت

نمودار تابع با ضابطه $f(x) = 2^x$ و $f^{-1}(x) = \log_2 x$ را در نظر بگیرید.



با توجه به نقاط این دو نمودار، جدول زیر را تکمیل کنید.

نماین	$2^{-2} = \frac{1}{4}$	$2^{-1} = \frac{1}{2}$	$2^0 = 1$	_____	$2^1 = 2$	_____
لگاریتمی	$\log_2 \frac{1}{4} = -2$	$\log_2 \frac{1}{2} =$ _____	_____	$\log_2 2 = 1$	_____	$\log_2 8 =$ _____

به طور کلی اگر $a^x = x$ آن گاه $\log_a x = y$ و به عکس، $(a > 0, a \neq 1, x > 0)$.

$b^0 = 1 \Leftrightarrow \log_b 1 = 0 \quad (a > 0, b > 0, b \neq 1)$

کار خود کنید

جدول زیر را مانند نمونه تکمیل کنید.

$1^x = 1 \forall x \rightarrow \log_1 1 \forall x = x$	$\log_2 1 = 0 \rightarrow 2^0 = 1$
$4^2 = 16 \rightarrow \log_4 16 =$ _____	$\log_2 (\frac{1}{16}) = -4 \rightarrow 2^{-4} =$ _____
$2^2 = 4 \rightarrow \log_2 4 =$ _____	$\log_2 120 = x \rightarrow 2^x =$ _____
$2^2 = 4 \rightarrow$ _____ = _____	$\log_{\frac{1}{2}} 27 = x \rightarrow$ _____ = _____
$2^2 =$ _____ \rightarrow _____ = _____	$\log_{\frac{1}{2}} 15 =$ _____ \rightarrow _____ = _____
$2^2 =$ _____ \rightarrow _____ = _____	$\log_{\frac{1}{2}} 16 =$ _____ \rightarrow _____ = _____



دریاچه شار آسمان خاکی

خواندنی

ایده لگاریتم یکی از مهم ترین ابداعات ریاضی است و کاربرد آن در ساده کردن محاسبات است. با لگاریتم، عمل ضرب به جمع و عمل تقسیم به تفریق تبدیل می شود.



خواندنی

همزمان با افزایش ارتفاع، فشار هوای اتمسفر (و زمین) کاهش می یابد. رابطه محاسبه فشار بر اساس ارتفاع بصورت $(5 - \log_2 P)$ است. $P = 15500$ است. که در آن 5 ارتفاع بر حسب متر و P نیز فشار بر حسب پاسکال است. فشار هوا را در بالای فله دماوند به ارتفاع 5610 متر محاسبه کنید.

نذکر

لگاریتم در مبای 10 را لگاریتم اعشاری می نامیم. در این حالت معمولاً مبدا نوشته نمی شود. یعنی به جای $\log_{10} 5$ می نویسیم $\log 5$.

ویژگی های لگاریتم

شمارت

1 اگر a عدد حقیقی مثبت ($a \neq 1$) باشد، همواره داریم:

$$\log_a 1 = 0 \quad \text{و} \quad \log_a a = 1 \quad \text{و} \quad \log_a \left(\frac{1}{a}\right) = -1$$

2 برای اعداد حقیقی و مثبت a و b و c ($a \neq 1$) داریم:

$$\log_a ab = \log_a a + \log_a b$$

اثبات: فرض کنیم $m = \log_a a$ و $n = \log_a b$ پس طبق تعریف $a = a^m$ و $b = a^n$ این رو $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ بنام این طبق تعریف لگاریتم داریم: $\log_a a^m \cdot a^n = m + n$ در نتیجه:

$$\log_a ab = \log_a a + \log_a b$$

مثال: فرض کنید $\log_2 3 = 0.48$ و $\log_2 5 = 0.78$ مقدار $\log_2 15$ را حساب کنید.

$$\log_2 15 = \log_2 (3 \times 5) = \log_2 3 + \log_2 5 = 0.48 + 0.78 = 1.26$$

2 اگر a و b اعدادی حقیقی و مثبت و $a \neq 1$ و n یک عدد طبیعی باشد، داریم:

$$\log_a b^n = n \log_a b$$

اثبات:

$$\log_a b^n = \log_a \underbrace{b \cdot \dots \cdot b}_{n \text{ بار}} = \underbrace{\log_a b + \dots + \log_a b}_{n \text{ بار}} = n \log_a b$$

1 برای اعداد حقیقی و مثبت a و b و c ($a \neq 1$) داریم:

$$\log_a \left(\frac{a}{b}\right) = \log_a a - \log_a b$$

اثبات: فرض می کنیم $\frac{a}{b} = d$ بنام این:

$$a = bd \rightarrow \log_a a = \log_a b + \log_a d \rightarrow \log_a d = \log_a a - \log_a b$$

$$\log_a \frac{a}{b} = \dots - \log_a b$$

مثال: اگر $\log_2 3 = 0.48$ مقدار $\log_2 5$ را محاسبه کنید.

$$\log_2 5 = \log_2 \frac{10}{2} = \log_2 10 - \log_2 2 = 1 - \log_2 2 = 1 - 1 = 0$$

کاربردها

اگر $\log 2 = 0.3$ و $\log 3 = 0.48$ ، مقادیر تقریبی اعداد زیر را به دست آورید.

$$۱) \log 12 = \log(3 \times 4) = \log 3 + \log 2^2 = \log 3 + 2 \log 2 = 0.48 + 0.6 = 1.08$$

$$۲) \log 0.75 = \dots \quad ۳) \log \sqrt{5} = \dots$$

$$۴) \log \frac{25}{1.8} = \dots \quad ۵) \log \sqrt[3]{6} = \dots$$

$$۶) \log \frac{\sqrt{4}}{\sqrt[3]{5}} = \dots$$

معادلات لگاریتمی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای لگاریتم، حل معادلات لگاریتمی است که معمولاً از مدل‌سازی یک مسئله واقعی به دست می‌آید. مانند محاسبه شدت زلزله، مشخص کردن ضعیف‌ترین صدای قابل شنیدن یا آستانه شنوایی، پیش‌بینی تعداد جمعیت یک جامعه پس از زمان مشخص و محاسبه نیمه عمر عناصر رادیواکتیو. معادلات زیر نمونه‌هایی از معادلات لگاریتمی اند:

$$\log_2(x+1) = 3, \quad \log_3 x = \log_3 7, \quad \log_2 x + \log_2(x-1) = \log_2 12$$

منظور از حل معادله لگاریتمی، پیدا کردن مقادیری برای مجهول است که در معادله صدق کند.

به‌طور کلی اگر a یک عدد حقیقی مثبت ($a \neq 1$)، باشد آن‌گاه با توجه به یک به یک بودن

تابع لگاریتمی، از تساوی ($x, y > 0$) $\log_a x = \log_a y$ می‌توان نتیجه گرفت $x = y$ و

به عکس، اگر $x = y$ ($x, y > 0$) آن‌گاه $\log_a x = \log_a y$.

مثالیت

معادلات لگاریتمی زیر را حل کنید.

$$۱) \log_7 x = 2 \rightarrow x = 7^2 = 49$$

$$۲) \log_2(x+6) = \log_2(2x-3) \rightarrow x+6 = 2x-3 \rightarrow x=9$$

که $x=9$ برای هر دو لگاریتم قابل قبول است.

$$۳) \log_2(x+6) + \log_2(x+2) = 1 \rightarrow \log_2[(x+6)(x+2)] = 1$$

$$\rightarrow (x+6)(x+2) = 2 \rightarrow x^2 + 8x + 12 = 2$$

$$\rightarrow x^2 + 8x + 10 = 0 \rightarrow (x+7)(x+1) = 0 \rightarrow x = -7 \text{ یا } x = -1$$

توجه کنید که $x = -7$ قابل قبول نیست؛ از این رو تنها جواب $x = -1$ قابل قبول است که در معادله اصلی صدق می‌کند.

خواندنی

لابلاس دانشمند بزرگ فرانسوی درباره لگاریتم گفته است:


«لگاریتم ابزاری است قابل ستایش که به کمک آن کار چند ماه به چند روز کاهش می‌یابد، عمر اختراستاساز را دو برابر می‌کند و از خطاهای کوچک می‌گذرد و از عبارات طولانی و جدا شدن ریاضی بی‌باز است.»

خواندنی

سوری آب اقیانوس‌ها را عرض جغرافیایی (فاصله از خط استوا) و عمق اقیانوس تعیین می‌کند. در مناطق استوایی میزان سوری آب در سطح اقیانوس‌ها به دلیل تبخیر سریع آب، بیشتر است. هرچه به قطب نزدیک‌تر می‌شویم، کاهش تبخیر و بارش باران باعث می‌شود سوری سطح آب کاهش یابد. تابع مربوطه عبارت است از:

$$S(x) = 31/5 + 1/1 \log(x+1)$$

که در این رابطه S نشان‌دهنده عمق به متر و $S(x)$ نشان‌دهنده مقدار گرم تک موجود نیز هر کیلوگرم آب اقیانوس است.



- ۱ $\log_4(x+2) = \log_4 8 \rightarrow x+2=8 \rightarrow x=6$
- ۵ $3 \log_2 x = -\log_2 2 \rightarrow \log_2 x^3 = \dots \dots \dots \rightarrow \dots \dots \dots$
- ۶ $\log(x+1) - \log(x-2) = 1 \rightarrow \log \frac{x+1}{x-2} = 1 \rightarrow \dots \dots \dots$

کار در کلاس

معادلات لگاریتمی زیر را حل کنید:

- ۱ $\log_5 x = 2$
- ۲ $\log_2(2x+1) = 2$
- ۳ $\log_2(x+1) + \log_2(x+2) = 2$
- ۴ $\log_2 222 = 2x+1$
- ۵ $\log_2(x-1) = 2$
- ۶ $\log_2(2x) - \log_2(x-2) = 1$
- ۷ $2 \log_2(x-1) = 2$

تمرین

۱ تساوی های زیر را ثابت کنید:

الف) $\log_c abc = \log_c a + \log_c b + \log_c c$ ($c \neq 1$ و a, b, c اعداد حقیقی مثبت اند)

ب) $\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$ (b و c اعداد حقیقی مثبت اند و $c \neq 1$ و $b \neq 1$)

ب) $a^{\log_c b} = b$ (a و b اعداد حقیقی مثبت اند و $a \neq 1$)

ت) $\log_3 a \times \log_3 b = 1$

۲ حاصل عبارات زیر را به دست آورید.

الف) $\log_{\sqrt{2}} \sqrt[5]{49}$

ب) $\log_{\sqrt{2}} 2\sqrt[3]{2}$

پ) $-\log_2 125$

ت) $3 \log_{\sqrt{2}} \sqrt{2}$

۳ اگر $f(x) = 3 - 2 \log_2 \left(\frac{x}{2} - 5\right)$ مقدار $f(22)$ را به دست آورید.

۴ الف) اگر نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \log_2 x$ از نقطه $(2, 2)$ عبور کند، مقدار a را به دست آورید.

ب) اگر نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \log_2 x$ از نقطه $(-4, -\frac{1}{2})$ عبور کند، مقدار a چند است؟

۵ نمودار تابع با ضابطه $y = \log_2 x$ را رسم کنید.

۶ کدام یک از گزاره‌های زیر درست و کدام نادرست است؟

الف) اگر $y = \log_2 x$ ، آنگاه $x = 2^y$.

ب) نمودار تابع با ضابطه $y = \log_2 x$ ($0 < a < 1$) از نقطه $(1, 0)$ عبور می‌کند.

پ) لگاریتم اعداد منفی تعریف نمی‌شود.

۷ معادلات لگاریتمی زیر را حل کنید.

الف) $\log_2(p^2 - 2) = \log_2 p$

ب) $\log_3(x+1) + \log_3(x-1) = 1$

پ) $3 \log_2 a - \log_2 5 = \log_2 25$

ت) $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 21) = -2$



تخت جمشید (پارس)

نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی

نمودارهای توابع نمایی و لگاریتمی

در درس اول و دوم با نمودار توابع نمایی و لگاریتمی آشنا شدیم. نمودار این توابع را می‌توان با استفاده از قوانینی که قبلاً فرا گرفته‌ایم، انتقال دهیم.

با توجه به آنچه که در مبحث انتقال توابع گفته شد، فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت

نمودار هر تابع را به ضابطه آن نظیر کنید.

الف) $k(x) = -\log_2 x$


ب) $l(x) = 2 + \log_2 x$

ب) $h(x) = -\left(\frac{1}{2}\right)^x$


ت) $g(x) = \log_2(x-1)$

ت) $z(x) = 2^{x-1}$


ج) $f(x) = 2^x + 1$




(۱)




(۲)




(۳)



(۴)





(۵)



(۶)

کاردرکلاس

در شکل‌های زیر نمودار یک تابع نمایی و یک تابع لگاریتمی و انتقال یافته‌های آنها رسم شده است. ضابطه توابع انتقال یافته را بنویسید.



کاردرکلاس

کدام یک از ضابطه‌ها به کدام یک از نمودارها تعلق دارند؟


- ۱) $y = \log_2(x-1)$
- ۴) $y = \log_2 x - 1$

۲) $y = 3^{x+1}$


۵) $y = 1 - \log_2 x$

۳) $y = 1 - 3^x$


۶) $y = 3^{(x+1)}$




الف)




ب)




پ)



ت)



ث)



ج)

کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی

تابع نمایی:

در حالت کلی یک تابع به صورت $f(x) = k \cdot a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) رفتار نمایی دارد که در بسیاری از مسائل اقتصادی، طبیعی و مهندسی و... ظاهر می‌شود.



توده باکتری اشریشیاکلی

مثال: اشریشیاکلی (Escherichia coli) با به‌طور اختصار E. coli نوعی باکتری است که به‌طور طبیعی در دستگاه گوارش زندگی می‌کند و تکثیر آن به‌صورت نمایی است. عوامل مختلفی مانند زیاد شدن آن باعث بیماری می‌شود. نوع خاصی از این بیماری با 10^{16} باکتری شروع می‌شود و هر باکتری در مدت تیم ساعت به دو قسمت تقسیم می‌شود. امتیاز هر توده باکتری بعد از t ساعت از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$p(t) = 10^{16} \times 2^t \quad (0 \leq t \leq 16)$$

با فرض اینکه هیچ کدام از باکتری‌ها از بین نروند، تعداد باکتری‌ها در یک توده پس از ۳ ساعت برابر است با:

$$p(3) = 10^{16} \times 2^3 = 64 \times 10^{16}$$

تابع لگاریتمی:

ریشتر، مقیاسی برای اندازه‌گیری بزرگی زمین‌لرزه است که میزان انرژی آزاد شده در زلزله را نشان می‌دهد. اگر بزرگی زلزله‌ای برابر M در مقیاس ریشتر باشد، انرژی آزاد شده آن زلزله برابر E در واحد ارگ (Erg) است که از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\log E = 11.8 + 1.5M$$

انرژی یک زلزله ۸ ریشتری تقریباً برابر با انرژی انفجار یک میلیارد تن ماده انفجاری TNT است.

مثال: روز پنجم دی ماه ۱۳۸۲ زلزله‌ای به شدت ۶/۶ ریشتر، شهر بم و مناطق اطراف آن را در شرق استان کرمان لرزاند. مقدار انرژی آزاد شده در این زلزله چقدر بوده است؟

$$\log E = 11.8 + 1.5M \rightarrow$$

$$\log E = 11.8 + 1.5(6/6)$$


$$\rightarrow \log E = 21/7 \rightarrow E = 10^{21/7} \text{ Erg}$$

کار در کلاس



زلزله ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۹ رودبار - منجیل به بزرگی ۷/۴ ریشتر در ساعت سی دقیقه بامداد رخ داد. مقدار انرژی آزاد شده در این زلزله را محاسبه کنید.

صورت



- ۱ در دستگاه مختصات رویه‌رو نمودار تابع با ضابطه $y = 5 + 2^{x-5}$ رسم شده است. θ و ϕ را به دست آورید.

۲ فرض می‌کنیم $g(x) = 4^x + 2$ (الف) $g(-1)$ را به دست آورید. ب) اگر $g(\theta) = 66$ مقدار θ چقدر است؟

۳ نمودار تابع با ضابطه $y = 4^x - 1$ را در بازه $[-2, 2]$ رسم کنید.

۴ نمودار توابع با ضابطه‌های زیر را رسم کنید.

الف) $y = -2^x + 1$

ب) $y = -\log_4(x - 1)$

ب) $y = 2^{|x|}$

ت) $y = \frac{|x|}{x} \log_2 x$



حد و پیوستگی



فصل



برج کاشانه در نزد بکر مسجد جامع شهر نظام قرار دارد. نظام در شمال شاهرود و در استان سمنان واقع است. قدمت این برج حدود ۷۰۰ سال است و ارتفاع برج از داخل ۲۲ و از بیرون ۴۰ متر است. فضای داخلی برج ده ضلعی و نمای بیرونی آن سی ضلعی منظم است.

قرایندهای حدی

محاسبه حد توابع

پیوستگی

درس اول

درس دوم


درس سوم

درس اول

فروایندهای حدی

فعالیت


در دایره‌های زیر به شعاع ۳ یک مثلث منسوی الاضلاع و یک مربع به گونه‌ای رسم شده‌اند که رأس‌های آنها روی دایره واقع‌اند. چنین چند ضلعی‌هایی را محاطی می‌نامیم. واضح است که مساحت مثلث منسوی الاضلاع و مساحت مربع از مساحت دایره کمتر است.



حداً می‌توانیم مساحت کدام یک به مساحت دایره نزدیک‌تر است؟ هر چه تعداد اضلاع چند ضلعی‌های منتظم محاطی بیشتر شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟


در جدول زیر مساحت تعدادی از n ضلعی‌های منتظم محاطی به شعاع ۳ (با دقت یک رقم اعشار) داده شده است. برای نزدیک‌تر شدن مساحت چند ضلعی‌های منتظم محاطی به مساحت دایره چه می‌توان کرد؟ آیا به هر میزان که بخواهیم می‌توانیم مساحت چند ضلعی‌های منتظم را به مساحت دایره نزدیک کنیم؟

زاد شدن تعداد اضلاع	→	۱۲	...	۷	۶	۵	۴	۳	چند ضلعی منتظم محاطی
نزدیک‌تر شدن مساحت چند ضلعی‌ها به مساحت دایره	→	۳۶	...	$2/8\pi$	$2/6\pi$	$2/5\pi$	$2/4\pi$	$1/3\pi$	مساحت تقریبی



مساحت چند ضلعی‌های منتظم محاط در دایره را به هر میزان که بخواهیم می‌توانیم به مساحت دایره نزدیک‌تر کنیم. به شرط آنکه تعداد اضلاع چند ضلعی را به مقدار کافی بزرگ اختیار کنیم. (به بیان دیگر با افزایش تعداد اضلاع، مساحت چند ضلعی‌ها به مساحت دایره نزدیک می‌شود).







فرض کنید در فعالیت قبل برای دایره به شعاع ۳ از چند ضلعی‌های منظم، محیطی (چند ضلعی که همه اضلاع آن بر یک دایره مناس باشند) استفاده کنیم. نتیجه مشابه آنچه را در فعالیت قبل به دست آمد، دربارهٔ این چند ضلعی‌ها بیان کنید (محاسبه مساحت‌ها لازم نیست).



فعالیت







مربع $ABCD$ به ضلع ۴ واحد را در نظر می‌گیریم. بازه خط MN وسط AB را به وسط DC وصل می‌کنیم. مساحت مستطیل $AMND$ چقدر است؟ به موازات MN بازه‌هایی رسم می‌کنیم که مانند شکل، نقاط انتهایی آنها روی AB و CD است. مساحت مستطیل‌های جدید بدیهه آمده، در جدول داده شده است. جاهای خالی را پر کنید (طول مستطیل‌ها برابر ۴ واحد است).

عرض مستطیل‌ها	۴	۲/۳	۲/۵	۲/۷	۲/۸	۲/۹	۲/۹۹	عرض مستطیل‌ها با مقادیر کمتر از ۴ و ۴ بزرگ می‌شود.
مساحت مستطیل رنگی	۸	۸/۳			۱۱/۲			مساحت به عدد بزرگ می‌شود.



مشابه همین کار را با شروع از بازه خط BC انجام می‌دهیم. بازه‌های که به موازات BC رسم می‌شوند، همانند شکل زیر، مستطیل‌های جدیدی را می‌سازند. جدول را کامل کنید.


عرض مستطیل‌ها	۴	۳/۹	۳/۵	۳/۲	۳/۱	۳/۰.۱	عرض مستطیل‌ها با مقادیر بیشتر از ۰.۳ به ۳ نزدیک می‌شود.
مساحت مستطیل رنگی	۱۶	۱۵/۶	۱۴	۱۲.۸			مساحت به عدد نزدیک می‌شود.



اگر طول مستطیل‌ها را ۴ و عرض آنها را ϵ در نظر بگیریم، مساحت مستطیل‌ها را می‌توان به صورت تابع $f(\epsilon) = 4\epsilon$ نمایش داد. با این تفاوت که در حالت اول ϵ ، با مقادیر کمتر از عدد ۰.۳، به سمت عدد ۳ نزدیک می‌شود و در حالت دوم ϵ ، با مقادیر بیشتر از عدد ۰.۳ به سمت عدد ۳ نزدیک می‌شود. این دو وضعیت را به ترتیب با نمادهای $\epsilon \rightarrow 3^-$ و $\epsilon \rightarrow 3^+$ نمایش می‌دهیم. خلاصه دو جدول قبل در جدول زیر ارائه شده است:

ϵ از سمت چپ به ۳ نزدیک می‌شود										ϵ از سمت راست به ۳ نزدیک می‌شود									
ϵ	۲	۹/۱	۲/۵	۴/۸	۲/۹	۲/۹۹	$\rightarrow 3^-$	۳/۰.۱	۳/۱	۳/۲	۳/۵	۳/۹	۳						
$f(\epsilon)$	۸	۸.۴					$\rightarrow 12^-$						۱۶						
$f(\epsilon)$ به ۱۲ نزدیک می‌شود										$f(\epsilon)$ به ۱۲ نزدیک می‌شود									

وقتی $x \rightarrow 3^-$ می‌گوییم x از راست به ۳ نزدیک می‌شود و وقتی $x \rightarrow 3^+$ می‌گوییم x از چپ به ۳ نزدیک می‌شود. در حقیقت رفتار تابع در نزدیکی نقطه ۳ بررسی شده است.



دیدیم که وقتی $x \rightarrow 3^-$ مساحت مستطیل‌ها با همان مقادیر $f(x)$ به مقدار دلخواه به ۱۲ نزدیک می‌شود. در این حالت می‌گوییم حد تابع $f(x)$ وقتی x از چپ به ۳ نزدیک می‌شود، برابر ۱۲


$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 12 \text{ است و می‌نویسیم:}$$

به طریق مشابه وقتی $x \rightarrow 3^+$ باز هم مساحت مستطیل‌ها به مقدار دلخواه به ۱۲ نزدیک می‌شود. در این حالت هم می‌گوییم حد تابع $f(x)$ وقتی x از سمت راست به ۳ نزدیک می‌شود، برابر ۱۲

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 12 \text{ است و می‌نویسیم:}$$

اگر حد راست و حد چپ یک تابع در یک نقطه، موجود و برابر باشند، تابع در آن نقطه حد دارد. در این فعالیت حد راست و حد چپ تابع وقتی x به ۳ نزدیک می‌شود، موجود و برابر ۱۲ است. به‌طور خلاصه می‌نویسیم:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 12$$



مثال: نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} 2x & x < 1 \\ -x + 5 & x \geq 1 \end{cases}$ رسم شده است.

جدول صفحه بعد را کامل کنید و با استفاده از آن و به کمک نمودار

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \text{ را محاسبه کنید.}$$

از سمت چپ به ۱ نزدیک می‌شود							از سمت راست به ۱ نزدیک می‌شود							
x	...	-۰.۲	-۰.۵	...	-۰.۹	-۰.۹۹	$\rightarrow 1^-$...	۱.۰۱	۱.۰۲	...	۱.۰۸	۱.۱	...
$f(x)$...	۰.۴	...	۱/۶	۱/۸	...	$\rightarrow 2^-$	۲	۲.۰۱	۲.۰۲	...	۲.۰۸	۲.۰۹	...
از سمت چپ به ۲ نزدیک می‌شود							از سمت راست به ۲ نزدیک می‌شود							

به عبارت دیگر حد تابع وقتی x از سمت چپ به ۱ نزدیک می‌شود، برابر ۲ است؛ یعنی $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$ و حد تابع وقتی x از سمت راست به ۱ نزدیک می‌شود، برابر ۲ است؛ یعنی $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$. در این مثال حد راست و حد چپ هر دو وجود دارند؛ ولی باهم برابر نیستند. تابع در نقطه $x=1$ حد ندارد، ولی حدهای یک‌طرفه (حد راست و حد چپ) وجود دارند.

فرض کنیم تابع f در بازه‌ای مانند (a, b) تعریف شده باشد. حد چپ f در a برابر عدد l است؛ هرگاه مقادیر تابع f را به هر اندازه دلخواه بتوان به l نزدیک کرد، به شرط آنکه x از سمت چپ به قدر کافی به a نزدیک شود، در این صورت

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l$$

می‌نویسیم. به طریق مشابه فرض کنیم f در بازه‌ای مانند (a, b) تعریف شده باشد. حد راست f در a برابر عدد l است؛ هرگاه مقادیر تابع f را به هر اندازه دلخواه بتوان به l نزدیک کرد، به شرط آنکه x از سمت راست به قدر کافی به a نزدیک

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l$$

فرض کنیم تابع f در بازه‌ای مانند (a, b) شامل نقطه a (به جز احتمالاً در خود a) تعریف شده باشد. حد تابع f در a برابر عدد l است؛ هرگاه مقدار تابع f را به هر اندازه دلخواه بتوان به l نزدیک کرد؛ به شرط آنکه x از دو طرف راست و چپ به قدر کافی به a نزدیک شود. در این صورت می‌نویسیم:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \text{ اگر و تنها اگر } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l \text{ و } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l$$


بسیاری از پدیده‌های طبیعی قابل ارائه در قالب یک تابع اند. در بسیاری از مواقع لازم است رفتار یک تابع را در نزدیکی یک نقطه بررسی کنیم. در فعالیت زیر رفتار سه تابع را در نزدیکی یک نقطه بررسی خواهیم کرد تا با مفهوم حد بهتر آشنا شویم.

فعالیت

نمودار توابع زیر رسم شده‌اند:

$$f(x) = 2x - 1 \quad g(x) = \begin{cases} 2x - 1 & x \neq 4 \\ 5 & x = 4 \end{cases} \quad h(x) = 2x - 1 \quad (x \neq 4)$$

هر نمودار به کدام تابع تعلق دارد؟ آیا این سه تابع با یکدیگر برآیند؟ دامنه و برد این سه تابع را معلوم کنید.



می‌خواهیم رفتار این سه تابع را در نزدیکی نقطه 4 بررسی کنیم. ابتدا جدول را کامل کنید.

	← از سمت چپ به 4 نزدیک می‌شود						← از سمت راست به 4 نزدیک می‌شود				
x	3	2/5	3/8	3/9	3/99	$x \rightarrow 4^-$	4/1	4/1	4/2	4/5	5
$f(x)$	5	4	6/4			$\rightarrow 7^-$			7/2	8	9
$g(x)$						$\rightarrow 7^-$					
$h(x)$						$\rightarrow 7^-$					

مقادیر f ، g و h را به هر اندازه که بخواهیم می‌توانیم به عدد ... نزدیک کنیم! به شرط آنکه مقادیر x به قدر کافی به عدد ... نزدیک شوند. حد هر سه تابع وقتی که $x \rightarrow 4$ (بخوانید x به سمت 4 میل می‌کند) برابر ... است. به عبارت دیگر:

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} g(x) = \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} h(x) =$$

در فعالیت قبل مشاهده کردید که سه تابع f ، g و h در نزدیکی نقطه $a=4$ رفتار یکسانی دارند. به عبارت دیگر حد آنها وقتی x به 4 نزدیک می‌شود، برابر 7 است. با این حال درباره مقادیر این سه تابع در نقطه 4 داریم:

الف) $h(4)$ وجود ندارد (h در 4 تعریف نشده است).

ب) $g(4)$ موجود است؛ ولی $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) \neq g(4)$.

پ) $f(4) = 7$ و $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 7$.

به طور کلی اگر درباره تابعی مانند f داشته باشیم $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ ، آنگاه درباره $f(a)$


یکی از حالت‌های زیر را داریم:

الف) $f(a)$ موجود نیست.

ب) $f(a)$ موجود است؛ ولی $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$.

پ) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

مثال ۱: در شکل زیر نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} -2x+8 & x > 2 \\ x^2 & -1 \leq x \leq 2 \\ 2 & x < -1 \end{cases}$ رسم شده است.



الف) $f(2)$ تعریف شده است؛ ولی $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$.


ب) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1$ ولی $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ وجود ندارد.

پ) $f(-1) = 1$.

ت) $\lim_{x \rightarrow -} f(x) = 0$ و $f(-) = 0$.

ث) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ و $f(2) = 0$.

ج) $f(-3)$ و $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ وجود ندارند؛ ولی $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = 2$.




مثال ۲: برای تابع $g(x) = \sqrt{x}$ داریم:

الف) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$.

ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x}$ وجود ندارد؛ زیرا تابع برای $x < 0$ تعریف نشده است.

پ) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x}$ وجود ندارد.



۱) برای تابع f که نمودار آن داده شده، کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟


- الف) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ (الف) $f(1) = 2$ (ب)
 ب) $f(2) = 1$ (ب) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ (ت)
 ج) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$ (ت) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ (ج)
 د) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ وجود ندارد. (ج) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ وجود ندارد.

۲) مثالی از یک تابع، همراه با نمودار آن ارائه کنید که حد تابع در نقطه ۲ مساوی ۱- باشد.

۳) تابعی مانند f ارائه کنید که در نقطه ۳ حد نداشته باشد. $f(3) = 1$.

۴) تابعی مانند f ارائه کنید که در نقطه ۲ تعریف نشده باشد. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$.

۵) درباره تابع با ضابطه $f(x) = \sqrt{x-2}$ موارد زیر را در صورت وجود محاسبه کنید:



- الف) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ (الف) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ (ب)
 ب) $f(2)$ (ت) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ (ب)

۶) تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} x & x > 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$ را در نظر می‌گیریم.

آیا در نقطه صفر حد دارد؟ آیا $f(0)$ موجود است؟

۷) توابع زیر را در نظر بگیرید و به سوالات پاسخ دهید:

$$f(x) = 2x + 1 \quad , \quad g(x) = 2x + 1 \quad (x \neq 2) \quad , \quad h(x) = \begin{cases} 2x + 1 & x \neq 2 \\ 3 & x = 2 \end{cases}$$

الف) مقادیر $f(2)$ ، $h(2)$ و $g(2)$ را در صورت وجود به دست آورید.

ب) حدهای زیر را محاسبه کنید:

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

۸) آیا حد تابع زیر در $x=2$ موجود است؟

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2 & x > 2 \\ -2 & x = 2 \\ x - 3 & x < 2 \end{cases}$$

۹) نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & x > 0 \\ -2x - 2 & x \leq 0 \end{cases}$ را رسم کنید و حد تابع در صفر را در صورت وجود بیابید.

۱۰) اگر $f(x) = \frac{|x|}{x}$ ، نمودار f را رسم کنید. آیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود است؟

درس دوم


محاسبه حد توابع

یکی از عواملی که به مطالعه دقیق تر یک تابع می تواند کمک کند، محاسبه حد آن تابع است. برای محاسبه حد یک تابع قواعد و دستورهایی وجود دارد. در این درس برخی از این قواعد به کمک شهود و با ذکر مثال توضیح داده می شوند.

۱- حد تابع ثابت

حد تابع ثابت در هر نقطه برابر مقدار تابع ثابت است.


به طور مثال: $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 2$



به طور کلی اگر c و a دو عدد حقیقی باشند: $\lim_{x \rightarrow a} c = c$

۲- حد تابع همانی

اگر $f(x) = x$ ، آنگاه $\lim_{x \rightarrow a} x = a$ ($a \in \mathbb{R}$)



به طور مثال: $\lim_{x \rightarrow 3} x = 3$

کار در کلاس

حدهای زیر را حساب کنید:

$$\lim_{x \rightarrow 1} x = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} 5 = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} x = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (-x) = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} x = \dots$$

تاکنون برای محاسبه حد یک تابع بیشتر از جدول‌ها و نمودارها بهره بردیم. در اینجا به کمک چند قانون، حد توابع را محاسبه می‌کنیم.

۳- حد مجموع


اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ و $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = m$ آن گاه:

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x) = l + m$$


به عبارت دیگر اگر دو تابع در یک نقطه حد داشته باشند، حد مجموع دو تابع در آن نقطه برابر مجموع حدهای آنها در همان نقطه است.

کار در کلاس

اگر $f(x) = x^2$ و $g(x) = 2x - 1$ آن گاه $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x))$ را به کمک قانون بالا محاسبه کنید. جاهای خالی را پر کنید و به کمک نمودارها قانون حد مجموع را نیز توضیح دهید.



$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \dots + \dots$$



$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \dots + \dots$$



$$\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x)) = \dots + \dots$$

۴- حد تفاضل

اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l$ و $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = m$ آن گاه:

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x) = l - m$$

به عبارت دیگر اگر دو تابع در یک نقطه حد داشته باشند، حد تفاضل دو تابع در آن نقطه برابر تفاضل حدهای آنها در همان نقطه است.

به طور مثال در «کار در کلاس» قبل داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2 - 3 = -1$$

۵- حد حاصل ضرب

اگر $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ و $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ آنگاه:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = lm$$

به عبارت دیگر اگر دو تابع در یک نقطه حد داشته باشند، حد حاصل ضرب دو تابع در آن نقطه برابر آنها در همان نقطه است.

اگر c یک عدد ثابت و $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ آنگاه

$$\lim_{x \rightarrow a} (cf(x)) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cl \quad (c \in \mathbb{R})$$

کار در کلاس

الف) اگر $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ ، به کمک قانون حد حاصل ضرب هر یک از حدهای زیر را بیابید.

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^2 = \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot f(x)) = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^n = \dots$$

ب) برای محاسبه حد $\lim_{x \rightarrow 1} (\frac{2}{3}x - 3)$ چگونه از قوانین ۲، ۴ و ۵ استفاده می‌کنید؟ توضیح دهید.

در حالت کلی اگر $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ و $n \in \mathbb{N}$ آنگاه:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^n = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^n = l^n$$

۶- حد تقسیم

اگر $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ و $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ که $m \neq 0$ آنگاه:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{l}{m} \quad (m \neq 0)$$

به عبارت دیگر اگر دو تابع در یک نقطه حد داشته باشند، حد تقسیم دو تابع در آن نقطه برابر تقسیم حدهای آنها در همان نقطه است؛ به شرط آنکه حد تابع مخرج در آن نقطه صفر نشود.

۱ برای تابع f با ضابطه $f(x) = 3x^2 + 2x - 7$

الف) با تکمیل جاهای خالی $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ را به دست آورید.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} (3x^2 + 2x - 7) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (3x^2) + \lim_{x \rightarrow 1} (2x) - \lim_{x \rightarrow 1} 7 \\ &= 3 \lim_{x \rightarrow 1} x^2 + \dots + \dots \end{aligned}$$

ب) $f(1)$ را محاسبه کنید و درستی تساوی $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ را بررسی کنید.

ب) دربار تابع یا ضابطه $g(x) = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + 5x - \frac{1}{4}$ ، درستی تساوی $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2)$ را بررسی کنید.

به طور کلی حد یک تابع چندجمله‌ای در یک نقطه با مقدار تابع در آن نقطه برابر است.

۲ الف) مطلوب است: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-1}{x^2-4x+1}$. جاهای خالی را کامل کنید.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-1}{x^2-4x+1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (2x-1)}{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2-4x+1)} = \frac{\dots}{\dots}$$

ب) اعدادی مقابل را حساب کنید.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{5x^3 + \frac{1}{3}} = \dots \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 1}{\frac{1}{3}x^2 - 2x + 1} = \dots$$

به طور کلی اگر $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ یک تابع گویا باشد که $P(x)$ و $Q(x)$ دو چندجمله‌ای

هستند، برای محاسبه حد $f(x)$ در نقطه‌ای مانند a کافی است که حد $P(x)$ را بر

حد $Q(x)$ در آن نقطه تقسیم کنیم؛ به شرط آنکه $\lim_{x \rightarrow a} Q(x) \neq 0$

اگر در محاسبه $\lim_{x \rightarrow a} \frac{P(x)}{Q(x)}$ که $P(x)$ و $Q(x)$ دو چندجمله‌ای اند، داشته باشیم:

$P(a) = Q(a) = 0$ دیگر با قانون اخیر نمی‌توان حد را محاسبه کرد. در این حالت

به روش زیر عمل می‌کنیم:

اگر $P(a) = Q(a) = 0$ در این صورت $P(x)$ و $Q(x)$ بر $x-a$ بخش پذیرند.

ابتدا عبارت $\frac{P(x)}{Q(x)}$ را با تقسیم $P(x)$ و $Q(x)$ بر $x-a$ ساده می‌کنیم و



پس امکان استفاده از قانون تقسیم جداها را بررسی می‌کنیم.

مثال: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ را محاسبه کنید.

داریم: $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

توجه داریم که وقتی x به ۲ نزدیک می‌شود، $x - 2 \approx 0$ و $x^2 - 4 \approx 0$ و صورت و مخرج کسر را می‌توانیم بر $x - 2$ تقسیم کنیم. در نمودارهای زیر توابع $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ و $g(x) = x - 2$ رسم و حد آنها در $x = 2$ نمایش داده شده است.





دو تابع f و g برابر هستند (جزاً)؛ ولی حد آنها در $x = 2$ برابر است.

کار در کلاس



مانند مثال قبل حد‌ها را محاسبه کنید؛ سپس به کمک نمودارها نیز محاسبه حد را توضیح دهید.

الف) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\dots)(\dots)}{(\dots)}$$



ب) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$



✓ حد ریشه

اگر $\lim_{x \rightarrow a} (ax + b) = l > 0$ آنگاه:

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{ax + b} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow a} ax + b} = \sqrt{l}$$



تذکره: تمام قوانینی که در این درس درباره حد مطرح شد، برای حد راست و حد چپ تابع نیز برقرار است.

مثال: مطلوب است $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{2x - 6}$
 حل: به کمک دستور فوق داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x - 6) = 2 > 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{2x - 6} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} (2x - 6)} = \sqrt{2} = 2$$

کار در کلاس

1 نمودارهای توابع یاضابطه‌های $f(x) = \sqrt{2x - 6}$ و $g(x) = \sqrt{2x - 6}$ رسم شده‌اند.



فصل ۶ | حد و پیوستگی

الف) هر نمودار به کدام تابع تعلق دارد؟

ب) آیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ موجودند؟

پ) کدام یک از حدهای زیر موجودند؟ آنها را محاسبه کنید.

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \sqrt{x-6} = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \sqrt{x-6} = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x-6} = \dots$$

۱ دربارۀ تابع $h(x) = \frac{|x|}{x}$ درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را بررسی کنید.

ب) $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 1$

ب) $D_h = \mathbb{R} - \{0\}$

الف) $h(x) = 1$

ت) $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ وجود ندارد.

ت) $h(0) = 0$

۲ با استفاده از نمودار تابع $f(x) = [x]$ حدهای زیر را در صورت وجود بیابید.

ب) $\lim_{x \rightarrow 2} [x]$


الف) $\lim_{x \rightarrow 2^+} [x]$

ت) $\lim_{x \rightarrow 2} [x]$

ب) $\lim_{x \rightarrow 2^-} [x]$

ج) $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} [x]$

ت) $\lim_{x \rightarrow 1.5} [x]$



۱ حدهای زیر را در صورت وجود به دست آورید.

الف) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{[x]}{x}$

ب) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{[x]-2}{x}$

حدهای متناهی

فعالیت

با استفاده از نمودار $f(x) = \sin x$ و $g(x) = \cos x$ حدهای زیر را بیابید.

الف) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x$

ب) $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \sin x$

ب) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x$



ت) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x$

ت) $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x$

ج) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x$

ج) $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \cos x$

ج) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x$



$$\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a, \quad \lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a : \text{ به طور کلی داریم}$$

مسئله: به کمک دستورهایی که در این درس آموخته‌اید، جدهای زیر را در صورت وجود محاسبه کنید.

الف) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1 + \sin x}$

ب) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x \cos x}{1 + \cos^2 x}$



حل:

الف) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1 + \sin x} = \frac{\lim_{x \rightarrow \pi} \cos x}{\lim_{x \rightarrow \pi} (1 + \sin x)} = \frac{1}{2}$

ب) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x \cos x}{1 + \cos^2 x} = \frac{\lim_{x \rightarrow \pi} (\sin x \cos x)}{\lim_{x \rightarrow \pi} (1 + \cos^2 x)} = \frac{0 \cdot (-1)}{2} = 0$

تمرین

۱ یا استفاده از قوانین حد و نمودارهای f و g جدهای زیر را (در صورت وجود) به دست آورید.



الف) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

ب) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

ب) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$

ت) $\lim_{x \rightarrow -1} (f(x) + g(x))$

ت) $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) + g(x))$

ج) $\lim_{x \rightarrow 1} (2f(x) + 5g(x))$

ج) $\lim_{x \rightarrow -1} (f(x))^2$

ج) $\lim_{x \rightarrow 1} (g(x))^2$

ح) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$

د) $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) \cdot g(x))$

۲ دو تابع متفاوت مثال بزنید که در یک نقطه دارای حدهای برابر باشند.

۳ حدهای زیر را در صورت وجود محاسبه کنید.

الف) $\lim_{x \rightarrow 1} (-3)$

ب) $\lim_{x \rightarrow 1} (-2x - 7)$

ب) $\lim_{x \rightarrow 1} (3x^2 - 4x + 5)$

ت) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 4}$

ت) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{2x^2 - x}$

ج) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 8}{x + 2}$

ج) $\lim_{x \rightarrow 2} [x]$

ج) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x}$

ج) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x+7}$

د) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x}$

د) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x+5}$

د) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-2}$

ز) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{[x]+1}$

ز) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x$

س) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x + \cos x)$

س) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{[x]}$

ص) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 9x + 8}$

ص) $\lim_{x \rightarrow 1} (x + [x])$

۴ اگر $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ و $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = -1$ حدهای زیر را در صورت وجود بنویسید.

الف) $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + h(x))$

ب) $\lim_{x \rightarrow 2} (h(x))^2$

ب) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}$

ت) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{f(x)}$

ت) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3f(x)}{g(x) - 5h(x)}$

ج) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{h(x)}$

۵ نمودار دو تابع $f(x) = \frac{|x-3|}{x-3}$ و $g(x) = 1$ را رسم کنید. آیا $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ موجود است؟ (چرا؟) $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$ چگونه؟ در چه نقاطی حد دو تابع با هم برابرند؟

۶ در هر یک از حالت‌های زیر درباره حد تابع $f+g$ چه می‌توان گفت؟

الف) اگر توابع f و g هیچ کدام در نقطه‌ای مانند a حد نداشته باشند.

ب) اگر تابع f در a حد داشته باشد ولی تابع g در a حد نداشته باشد.

۷ اگر m یک عدد صحیح باشد، حدهای زیر را در صورت وجود محاسبه کنید.

الف) $\lim_{x \rightarrow 0} [x]$

ب) $\lim_{x \rightarrow 0} [x]$


ب) $\lim_{x \rightarrow 0} [x]$

به طور کلی تابع $f(x) = [x]$ در چه نقاطی حد دارد؟

یکی از مفاهیم مهم در مبحث حد توابع، مفهوم پیوستگی است که در این درس با آن آشنا می‌شوید.

فعالیت

نمودارهای نش‌نشان در شکل‌های زیر رسم شده‌اند.




الف) کدام یک از نمودارهای فوق را می‌توان بدون آنکه قلم را از روی کاغذ برداشت، رسم کرد؟


ب) مثال دیگری مشابه توابع بالا ارائه کنید.

ردیف‌های اول و دوم نمونه‌ای از توابع پیوسته هستند.


مثال: تابع‌های داده شده با نمودارهای الف و ب پیوسته نیستند، ولی توابع با نمودارهای پ و ت پیوسته‌اند.




(الف)



(ب)



(پ)




(ت)

اکنون به بررسی دقیق‌تر مفهوم پیوستگی می‌پردازیم. به این منظور پیوستگی تابع در یک نقطه را تعریف می‌کنیم.


$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad (a \in \mathbb{R}) \text{ هرگاه } f \text{ تابع در نقطه } x=a \text{ پیوسته نامیم؛ هرگاه}$$

به عبارت دیگر برای آنکه تابع f در a پیوسته باشد، باید $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ و $f(a)$ هر دو موجود و با هم برابر باشند. در غیر این صورت تابع را در a ناپیوسته می‌نامیم. در نمودارهای زیر ناپیوسته بودن یک تابع در نقطه a در شرایط مختلف نمایش داده شده است. شما هم مثال‌های دیگری ارائه کنید.




کدام یک از توابع زیر با ضابطه‌های داده شده در $x=1$ تاییوسته‌اند؟


الف) $f(x) = (x-3)^2$



ب) $g(x) = \frac{|x-1|}{x-1}$



پ) $h(x) = \begin{cases} x & x > 1 \\ 2 & x = 1 \\ -x + 2 & x < 1 \end{cases}$



فعالیت


تابع $f(x) = \sqrt{x-2}$ را با نمودار زیر را در نظر بگیرید.

الف) کدام یک از حد‌های $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ موجودند؟

ب) آیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود است؟


پ) آیا تابع f در $x=2$ پیوسته است؟

در این فعالیت $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$ گوئیم f از طرف راست در نقطه 2 پیوسته است.



تابع f را در $x=0$ از طرف راست پیوسته می‌نامیم؛ هرگاه $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ در

این صورت می‌گوئیم f در $x=0$ پیوستگی راست دارد.



تابع با ضابطه $g(x) = \begin{cases} x+1 & x \leq 2 \\ 3x & x > 2 \end{cases}$ و نمودار آن را در نظر بگیرید.

الف) کدام یک از حد‌های $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$ موجودند؟

ب) آیا $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ موجود است؟

پ) آیا تابع f در $x=2$ پیوسته است؟

برای تابع $g(x) = g(2) \cdot g(x)$ ، گوئیم g از طرف چپ در نقطه ۲ پیوسته است.

تابع f را در $x=c$ از طرف چپ پیوسته می‌نامیم، هرگاه $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$.
در این صورت گوئیم f در $x=c$ پیوستگی چپ دارد.

با توجه به تعریف معلوم است که f در $x=c$ پیوسته است، هرگاه f در c هم پیوستگی راست و هم پیوستگی چپ داشته باشد.

مثال: الف) تابع $f(x)=[x]$ در $x=2$ پیوستگی راست دارد. تابع $f(x)=[x]$ در $x=2$ پیوسته نیست.

ب) تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 0 \\ 3x+3 & x > 0 \end{cases}$ در نقطه ۰ پیوستگی چپ دارد. تابع f در $x=0$ پیوسته نیست.

پ) تابع $g(x) = \begin{cases} -x+3 & x \leq 1 \\ 3x & x \geq 1 \end{cases}$ در $x=1$ پیوسته است.

پیوستگی روی یک بازه

تابع f روی بازه (a, b) پیوسته است، هرگاه، در هر نقطه این بازه پیوسته باشد.
تابع f روی بازه $[a, b)$ پیوسته است، هرگاه f در بازه (a, b) پیوسته باشد و در نقطه a پیوسته راست و در نقطه b پیوسته چپ باشد.

پیوستگی روی بازه‌های (a, b) و $[a, b)$ را به طور مشابه تعریف کنید.

تابع f روی بازه $[a, b)$ پیوسته است هرگاه ...

در این حالت اگر $b=+\infty$ ، یعنی تابع f در a پیوستگی راست دارد و در تمام نقاط بزرگ‌تر از a پیوسته است.

تابع f روی بازه (a, b) پیوسته است هرگاه ...

در این حالت اگر $a=-\infty$ ، یعنی تابع f در b پیوستگی چپ دارد و در تمام نقاط کوچک‌تر از b پیوسته است.

اگر $D_f = \mathbb{R}$ و f در هر نقطه از دامنه‌اش پیوسته باشد، می‌گوییم f روی بازه $(-\infty, +\infty)$ پیوسته است.

کار در کلاس

سه تابع متفاوت مثال بزنید که:

الف) روی بازه $(-\infty, \infty)$ پیوسته باشد. ب) روی بازه $[-2, +\infty)$ پیوسته باشد. ج) روی بازه $(-\infty, 1]$ پیوسته باشد.

مثال: الف) اگر f یک تابع چندجمله‌ای باشد، آنگاه f روی بازه $(-\infty, \infty)$ پیوسته است؛ زیرا $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ($c \in \mathbb{R}$)


ب) توابع $f(x) = \sin x$ و $g(x) = \cos x$ روی بازه‌های $(-\infty, \infty)$ پیوسته‌اند.

ج) تابع $f(x) = \log_e x$ روی بازه $(0, \infty)$ پیوسته است.


ت) اگر تابعی روی بازه‌ای پیوسته باشد، روی هر زیر بازه دلخواه از آن نیز پیوسته است.

ث) توابع $f(x) = \sin x$ و $g(x) = \cos x$ روی بازه‌های $[0, 2\pi]$ پیوسته‌اند.


ج) تابع $f(x) = \log_e x$ روی بازه $[1, 2]$ پیوسته است.



$f(x) = \log_e x$




$f(x) = \cos x$



$f(x) = \sin x$

کار در کلاس



$$f(x) = \begin{cases} 2x+2 & x < 1 \\ x^2-1 & 1 \leq x < 2 \\ -x+5 & 2 \leq x < 5 \end{cases}$$

۱) تابع f با ضابطه مقابل را در نظر می‌گیریم:

الف) نمودار f را کامل کنید.

ب) دامنه و برد f را به دست آورید.

ج) پیوستگی تابع را روی بازه‌های $[1, 2]$ و $[2, 5]$ بررسی کنید.

۲) دربارهٔ تابع f کدام یک از گزاره‌های زیر درست و کدام یک نادرست است؟

الف) f روی بازه $(-\infty, -1)$ پیوسته است. ب) f روی بازه $(-\infty, -1)$ پیوسته است.

ت) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$ ج) f روی بازه $(-2, 0)$ پیوسته است.

ب) f روی بازه $[2, 5]$ پیوسته است. ث) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$

۲ با توجه به تابع f :

(الف) دو بازه بسته مثال بزنید که تابع در یکی از آنها پیوسته و در دیگری ناپیوسته باشد.
 (ب) a و b ای را مثال بزنید که تابع روی (a, b) پیوسته باشد؛ اما روی $[a, b]$ پیوسته نباشد.

تمرین

۱ با توجه به توابع f و g و h با ضابطه‌های داده شده، به سوالات پاسخ دهید.

$$f(x) = 2x + 1, \quad g(x) = 2x + 1, \quad x \neq 2, \quad h(x) = \begin{cases} 2 + x & x \neq 2 \\ 3 & x = 2 \end{cases}$$

(الف) مقادیر زیر را در صورت وجود به دست آورید:

(ب) حدود زیر را در صورت وجود به دست آورید:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \quad \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \quad \lim_{x \rightarrow 2} h(x) =$$

(ب) کدام تابع در $x=2$ پیوسته است؟

۲ نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} x-3 & x < 2 \\ -2 & x = 2 \\ -x+2 & x > 2 \end{cases}$ را رسم کنید. f در چه نقاطی پیوسته و در چه نقاطی ناپیوسته است؟


۳ توابع $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & x \neq 3 \\ 6 & x = 3 \end{cases}$ و $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ را در نظر می‌گیریم. پیوستگی این تابع‌ها را در $x=3$ بررسی کنید.

۴ با توجه به نمودار تابع $f(x) = [x]$ ، تابع در چه نقاطی پیوسته و در چه نقاطی ناپیوسته است؟

۵ پیوستگی تابع $f(x) = \begin{cases} -2x+2 & x \leq 0 \\ x^2+2 & x > 0 \end{cases}$ را در نقطه $x=0$ بررسی کنید. پیوستگی تابع در نقاط دیگر چگونه است؟

۶ تابعی مثال بزنید که حد آن در نقطه $x=1$ مساوی -1 باشد؛ ولی تابع در $x=1$ پیوسته نباشد. نمودار این تابع را رسم کنید.

۷ کدام یک از توابع زیر در $x=1$ پیوسته است؟



۸ در مواقعی نحوه دارو برای کودکان بر اساس جرم کودک انجام می‌گیرد. روش‌های مختلفی برای برآورد کردن جرم یک

کودک (برحسب کیلوگرم) در شرایط اضطراری (که جرم نمی‌تواند اندازه‌گیری شود) وجود دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از تابع

$f(t) = \begin{cases} 6t+2 & 0 \leq t < 1 \\ 2t+10 & 1 \leq t \leq 10 \end{cases}$ است که در آن t سن کودک برحسب سال است. به‌طور مثال جرم یک کودک ۶ ماهه به کمک این تابع

چنین محاسبه می‌شود:

$$\text{سال } \frac{6}{12} \rightarrow \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = 6 \times \left(\frac{1}{2}\right) + 2 = 7$$

(الف) $f(2)$ و $f(5)$ را بیابید. (ب) آیا f در بازه $[0, 10]$ پیوسته است؟



آمار و احتمال Y

فصل



تألیف: دکتر سید علی حسینی

امروزه نقش روزافزون آمار و احتمال در حل مسائل زندگی بر کسی پوشیده نیست. یکی از کاربردهای مهم آمار و احتمال، پیش‌بینی وضع هواست. با پیشرفت روش‌های علمی، احتمال پیش‌بینی درست آب‌وهوا به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل

درس اول

آمار توصیفی

درس دوم

احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل

احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل

در مثال های قبل با مفاهیم زیر از احتمال آشنا شدید.

یادآوری

- ۱- پدیده تصادفی: پدیده یا آزمایشی است که نتیجه آن را نتوان قبل از انجام به طور قطعی پیش بینی کرد.
- ۲- فضای نمونه‌ای: مجموعه تمام نتایج ممکن یک پدیده تصادفی را فضای نمونه‌ای آن پدیده می‌نامیم و معمولاً آن را با S نمایش می‌دهیم.
- ۳- پیشامد تصادفی: هر زیر مجموعه از S را یک پیشامد تصادفی در فضای نمونه‌ای S می‌نامیم.
- ۴- پیشامدها و اعمال روی آنها
فرض کنیم A و B پیشامدهایی از فضای نمونه‌ای S باشند.
الف) اجتماع دو پیشامد: پیشامد $A \cup B$ وقتی رخ می‌دهد که حداقل یکی از پیشامدهای A یا B رخ دهد.
ب) اشتراک دو پیشامد: پیشامد $A \cap B$ وقتی رخ می‌دهد که هر دو پیشامد A و B رخ دهند.
پ) تفاضل دو پیشامد: پیشامد $A - B$ وقتی رخ می‌دهد که پیشامد A رخ دهد ولی پیشامد B رخ ندهد.
ت) متمم یک پیشامد: پیشامد A^c (یا A^c) وقتی رخ می‌دهد که پیشامد A رخ ندهد.
- ۵- پیشامدهای ناسازگار: دو پیشامد A و B را ناسازگار می‌گوییم هرگاه A و B با هم رخ ندهند؛ یعنی $A \cap B = \emptyset$.
- ۶- رابطه محاسبه احتمال وقوع یک پیشامد:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{تعداد حالت های مطلوب}}{\text{تعداد همه حالت های ممکن}}$$

۷- رابطه محاسبه احتمال اجتماع یا اشتراک دو پیشامد A و B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

احتمال شرطی

فرض کنیم در یک قرعه‌کشی اعداد ۱ تا ۲۰ به بیست نفر اختصاص داده شده‌اند و قرار است یک شماره به تصادف انتخاب و به عنوان برنده اعلام شود. اگر شماره ۸ به دست شما افتاده باشد، یا چه احتمالی شما برنده خواهید شد؟ اگر بدانید که یک شماره یک رقمی انتخاب خواهد شد، یا چه احتمالی برنده خواهید شد؟

گاهی اوقات وقوع یک پشامد بر احتمال وقوع پشامدی دیگر تأثیر می‌گذارد. مثلاً احتمال برنده شدن شما با داشتن اینک شماره انتخابی، یک رقمی است، متفاوت خواهد بود از حالتی که این موضوع را ندانیم. در واقع احتمال اول و احتمال برنده شدن شما و احتمال دوم را احتمال برنده شدن شما به شرطی که شماره انتخاب شده یک رقمی باشد، می‌خوانیم.

منظور از احتمال A به شرط B که آن را با $P(A|B)$ نمایش می‌دهیم، احتمال وقوع پشامد A است، به شرط آنکه بدانیم پشامد B رخ داده است.

می‌دانیم که:

$$\text{احتمال رخ دادن یک پشامد} = \frac{\text{تعداد حالت‌های مطلوب}}{\text{تعداد همه حالت‌های ممکن}}$$

حالت با توجه به اینکه در $P(A|B)$ بی‌فرض رخ دادن پشامد B در نظر گرفته شده است، در صورت و مخرج کسر بالا خواهیم داشت:

- ۱- حالت‌های مطلوب، همه حالت‌هایی است که A رخ دهد، در حالی که B رخ داده است؛ یعنی همه حالت‌هایی که هم A و هم B رخ دهد، یا به عبارتی این تعداد برابر است با $n(A \cap B)$.

۲- همه حالت‌های ممکن در اینجا برابر همه حالت‌هایی است که در آنها B رخ داده باشد. به عبارتی این تعداد برابر با $n(B)$ است.

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

بنابراین داریم:

که با تقسیم صورت و مخرج این عبارت به $n(S)$ این رابطه به صورت زیر بیان می‌شود:

$$(۱) \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

توجه: شرط محاسبه احتمال پشامد A به شرط وقوع پشامد B آن است که $P(B) \neq 0$. بنابراین اگر $P(B) = 0$ ، آنگاه $P(A|B)$ قابل تعریف نیست.

کار در کلاس

در یک مسابقه اتومبیل‌رانی احتمال اینکه یک اتومبیل دچار نقص فنی نشود و به خط پایان نیز برسد، برابر 0.7 است و احتمال اینکه یک اتومبیل دچار نقص فنی نشود، برابر 0.8 است. اگر بدانیم یک اتومبیل دچار نقص فنی نشده است، یا چه احتمالی به خط پایان رسیده است؟
حل:

پشامد دچار نقص فنی نشدن اتومبیل: A

پشامد رسیدن به خط پایان: B

$$\left\{ \begin{array}{l} P(A) = \dots\dots\dots \\ P(A \cap B) = \dots\dots\dots \end{array} \right.$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dots\dots\dots$$

۱- آنچه در اینجا گفته شد صرفاً نوعی توضیح منطقی و سهودی برای رابطه $P(A|B)$ است و به عنوان اثبات دقیق ریاضی مدنظر نیست.

مسئله: اعداد ۱ تا ۹ را روی یک کارت می‌نویسیم و سه کارت را به تصادف انتخاب می‌کنیم. مطلوب است احتمال اینکه هر سه عدد زوج باشند به نوبت آنها مجموع آنها زوج باشد.

حل: برای اینکه مجموع سه عدد زوج باشد یا هر سه باید زوج باشند و با اینکه دو عدد فرد و یکی زوج باشند. اما اعداد زوج چهار تا و اعداد فرد پنج تا هستند.

پس: احتمال اینکه هر سه عدد زوج باشند.

B : احتمال اینکه مجموع اعداد سه کارت زوج باشند.

لذا تعداد حالت‌هایی که هر سه عدد زوج باشند برابر است با $\binom{4}{3} = 4$ و تعداد حالت‌هایی که دو عدد فرد و یکی زوج باشند، برابر است با $20 = \binom{4}{2} \times \binom{5}{1}$. بنابراین ۲۴ حالت هست که مجموع سه عدد زوج باشند و در ۴ حالت آن هر سه عدد زوج اند. پس:

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}$$

مسئله: فرض کنید احتمال اینکه یک تیم فوتبال اصلی‌ترین رقیبش را ببرد، $\frac{1}{4}$ باشد. احتمال قهرمانی این تیم در حال حاضر $\frac{1}{4}$ و در صورتی که اصلی‌ترین رقیبش را ببرد، این احتمال به $\frac{1}{3}$ افزایش خواهد یافت. با چه احتمالی حداقل یکی از دو اتفاق «قهرمان شدن» یا «بردن اصلی‌ترین رقیب» برای این تیم اتفاق خواهد افتاد؟

A : پشامد قهرمان شدن

$$P(A) = \frac{1}{4} \quad \text{و} \quad P(B) = \frac{1}{4} \quad \text{و} \quad P(A|B) = \frac{1}{3}$$

B : پشامد برد اصلی‌ترین رقیب

حل: هدف محاسبه $P(A \cup B)$ است و برای آن داریم:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A|B) \times P(B) = \frac{1}{12} \quad \text{حال با توجه به رابطه (۱) داریم:}$$

$$P(A \cup B) = \frac{13}{36} \quad \text{و با جای‌گذاری مقادیر داریم:}$$

پشامدهای مستقل

در مثال‌های قبل دیدیم که برخی پشامدها بر احتمال وقوع پشامدهای دیگر تأثیر می‌گذارند، ولی برخی پشامدها بر احتمال وقوع بکدیگر تأثیری ندارند.

پشامد A از پشامد B مستقل است، هرگاه وقوع B بر احتمال وقوع A تأثیر نگذارد.

به عبارتی در این صورت وقوع B ، احتمال وقوع A را کم یا زیاد نمی‌کند. در واقع احتمال وقوع A با شرط رخ دادن B و بدون این شرط یکسان است. یعنی پیشامد A از B مستقل است. هرگاه $P(A|B) = P(A)$ (با $P(B) \neq 0$)، اما از آنجا که داریم $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ ، پس:

$$* \quad P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

از این رابطه به وضوح نتیجه می‌شود که اگر A نسبت به B مستقل باشد، B نیز نسبت به A مستقل است. لذا می‌توان گفت:

دو پیشامد A و B از هم مستقل اند هرگاه وقوع هر یک بر احتمال وقوع دیگری تأثیر نداشته باشد.

بنابراین دو پیشامد A و B مستقل نیستند اگر و تنها اگر

$$P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$$

حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا استقلال با عدم استقلال دو پیشامد را همیشه می‌توان به‌طور شهودی تشخیص داد یا اینکه چه وقت باید از رابطه $*$ برای تشخیص استقلال دو پیشامد استفاده کرد.

$$(1) \quad P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

یا توجه به رابطه محاسبه احتمال، یعنی $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ ، اگر پیشامدی مانند B یا وقوع پیشامد A هیچ ارتباطی نداشته باشد، می‌توان به سادگی نشان داد که وقوع پیشامد B ، احتمال وقوع پیشامد A را تغییر نمی‌دهد؛ بنابراین دو پیشامد مذکور از هم مستقل اند.

مثال: یک سکه و یک تاس را پرتاب می‌کنیم. این احتمال را که سکه پشت و تاس عددی زوج بیاید، محاسبه کنید.

حل: فرض کنیم

پیشامد رو شدن عددی زوج در پرتاب تاس: A

پیشامد پشت آمدن سکه: B

طبق آنچه گفته شد به سادگی دیده می‌شود که وقوع پیشامد B بر $P(A)$ تأثیر نمی‌گذارد. بنابراین پیشامدهای A و B از هم مستقل اند و داریم:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

مسئله: خانوادہ‌ای دارای دو فرزند است. مطلوب است احتمال اینکه هر دو فرزند آنها پسر باشند.

حل: جنسیت فرزندان پشامدهایی از هم مستقل اند، بنابراین می‌توان به صورت زیر عمل کرد.

A : پشامد پسر بودن فرزند اول

B : پشامد پسر بودن فرزند دوم

$$\text{احتمال پسر بودن هر دو} = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

مسئله: فرض کنید در یک سال احتمال قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در آسیا برابر $\frac{1}{5}$ و احتمال قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در آسیا برابر $\frac{1}{8}$ باشد. با چه احتمالی حداقل یکی از این تیم‌ها قهرمان خواهد شد؟
حل:



A : پشامد قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران $\rightarrow P(A) = \frac{1}{5}$

B : پشامد قهرمانی تیم ملی والیبال ایران $\rightarrow P(B) = \frac{1}{8}$

به وضوح دیده می‌شود که A و B از هم مستقل اند، پس $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{40}$ اما با توجه به نحوه انتخاب A و B ، پشامد قهرمانی حداقل یکی از آنها به صورت $A \cup B$ است و داریم:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{5} + \frac{1}{8} - \frac{1}{40} = \frac{14}{40} = \frac{7}{20}$$

در مثال‌های قبل استقلال دو پشامد به سادگی تشخیص داده شد و از آن در حل مسئله استفاده شد. اما آیا همیشه تشخیص مستقل یا وابسته بودن دو پشامد به همین آسانی است؟

(۲) اگر در ظاهر A و B پشامدهایی باشند که وقوعشان با هم در ارتباط است، نمی‌توان به طور قطع گفت که A و B مستقل نیستند.

برای توضیح بیشتر به دو مثال بعد توجه کنید.

مسئله: دو تاس را به ترتیب برتاب می‌کنیم. مطلوب است محاسبه احتمال اینکه:

الف) مجموع عددهای رو شده برابر ۵ شود.

ب) مجموع عددهای رو شده برابر ۷ شود.

پ) مجموع عددهای رو شده برابر ۱۰ شود.

حل: با توجه به اصل ضرب می‌دانیم که در برتاب دو تاس ۳۶ حالت وجود دارد. $n(S) = 36$

الف) تمام حالت‌هایی که مجموع عددهای رو شده ۵ شود به صورت زیر است:

$$\{(1, 4)\} \text{ و } \{(4, 1)\} \text{ و } \{(2, 3)\} \text{ و } \{(3, 2)\}$$

بنابراین احتمال اینکه مجموع عددهای رو شده برابر ۵ شود، برابر است با: $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

(ب) تمام حالت‌هایی که مجموع عددهای رو شده برابر ۷ شود، به صورت زیر است:

$\{(4,3) \text{ و } (3,4) \text{ و } (5,2) \text{ و } (2,5) \text{ و } (6,1) \text{ و } (1,6)\}$

بنابراین احتمال اینکه مجموع عددهای رو شده برابر ۷ شود، برابر است با: $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

(ب) تمام حالت‌هایی که مجموع عددهای رو شده برابر ۱۰ می‌شود، به صورت زیر است:

$\{(4,6) \text{ و } (6,4) \text{ و } (5,5)\}$

بنابراین احتمال اینکه مجموع دو تاس برابر ۱۰ شود برابر است با: $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.

اگر پیشامد B را رو شدن عدد ۲ در برتاب تاس اول در نظر بگیریم، بررسی می‌کنیم که این پیشامد نسبت به هر یک از پیشامدهای مطرح شده در قسمت‌های (الف) و (ب) و (ب) از مثال قبل مستقل است یا نه.

مثال: دو تاس را به ترتیب برتاب می‌کنیم.

الف) آیا پیشامد اینکه مجموع دو تاس ۵ شود و پیشامد اینکه در برتاب اولین تاس عدد ۲ ظاهر شود، مستقل از یکدیگرند؟

پیشامد B
پیشامد A

ب) آیا پیشامد اینکه مجموع دو تاس ۷ شود و پیشامد اینکه در برتاب اولین تاس عدد ۲ ظاهر شود، مستقل از یکدیگرند؟

پیشامد B
پیشامد A

ب) آیا پیشامد اینکه مجموع دو تاس ۱۰ شود و پیشامد اینکه در برتاب اولین تاس عدد ۲ ظاهر شود، مستقل از یکدیگرند؟

پیشامد B
پیشامد A

حل: در این مثال از آنجا که بین فرض رو شدن عدد ۲ در برتاب تاس اول مفروض است، تمام حالات ممکن به صورت زیر خواهد بود و ۶ عضو دارد.

$$B = \{(2,1) \text{ و } (2,2) \text{ و } (2,3) \text{ و } (2,4) \text{ و } (2,5) \text{ و } (2,6)\}$$

حال در هر حالت می‌خواهیم صحت رابطه $P(A|B) = P(A)$ را بررسی کنیم. برای هر سه قسمت، $P(A)$ را در اولین مثال این درس محاسبه کردیم. کافی است $P(A|B)$ را در هر سه قسمت به دست آوریم.

الف) در این صورت تنها حالتی که مجموع ۵ است، حالت $(2,3)$ است. پس احتمال اینکه مجموع ۵ ظاهر شود، برابر $\frac{1}{6}$ است. بنابراین وقوع پیشامد B احتمال وقوع پیشامد A را از $\frac{1}{6}$ به $\frac{1}{6}$ افزایش می‌دهد. لذا در این حالت A و B مستقل نیستند.

ب) در این صورت تنها حالتی که مجموع ۷ است، حالت $(2,5)$ است. پس احتمال اینکه مجموع ۷ ظاهر شود، برابر $\frac{1}{6}$ است. بنابراین

وقوع پیشامد B احتمال وقوع پیشامد A را تغییر نداده است. بنابراین در این حالت A و B مستقل از یکدیگرند.

ب) در صورتی که عدد رو شده در ناس اول ۲ باشد، در هیچ حالتی مجموع دو ناس ۱۰ نمی‌شود. بنابراین در این حالت احتمال اینکه مجموع دو ناس برابر ۱۰ شود، صفر است. لذا در این حالت وقوع پیشامد B احتمال وقوع پیشامد A را از $\frac{1}{11}$ به صفر کاهش داده است.
پس در این حالت A و B مستقل نیستند.

خوانندگی

عوامل ژنتیک در شکل‌گیری صفات انسان نقش دارند و از والدین به فرزندان منتقل می‌شوند. آیا تاکنون دقت کرده‌اید که ترمه گوش انسان می‌تواند دو حالت داشته باشد، یکی پیوسته و یکی آزاد؟ یا توجه به این موضوع سؤالاتی از این فصل می‌تواند مطرح باشند:

اگر مردی ترمه گوش آزاد و همسرش ترمه گوش پیوسته داشته باشد، آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که فرزند آنها چه نوع ترمه گوش می‌خواهد داشته باشد؟
در ادامه به کمک علم احتمال به مسئله بالا می‌پردازیم.



ترمه گوش آزاد



ترمه گوش پیوسته

مسئله: در علم ژنتیک برای ایجاد برخی صفات در فرزندان دو عامل را مؤثر می‌دانند که یکی از پدر و یکی از مادر به ارث می‌رسد. فرض کنیم این دو عامل را A و a در تعیین شکل ترمه گوش فرزند مؤثرند با A و a نمایش دهیم که در آن:

A : عامل به وجود آمدن ترمه گوش آزاد

a : عامل به وجود آمدن ترمه گوش پیوسته

بنابراین هر فرد به یکی از حالت‌های AA یا Aa یا aA یا aa می‌تواند باشد که با احتمال $\frac{1}{4}$ هر یک از آنها را به فرزند خود می‌تواند انتقال دهد و تأثیر آن بر ترمه گوش فرزند به صورت زیر است:

– اگر عامل‌های فرزند به صورت AA باشد، این فرد دارای ترمه گوش آزاد است.


– اگر عامل‌های فرزند به صورت aA یا Aa باشد، این فرد دارای ترمه گوش پیوسته است.

– اگر عامل‌های فرزند به صورت aa باشد، این فرد دارای ترمه گوش آزاد است. به همین دلیل عامل A را غالب و عامل a را مغلوب می‌نامند. به طور خلاصه داریم:

عامل‌های شخص	AA	Aa یا aA	aa
نوع ترمه گوش شخص	آزاد	آزاد	پیوسته

– به حالت‌های AA و aa خالص و به حالت Aa ناخالص می‌گوییم.

در شکل‌های صفحه بعد حالت‌های مختلف انتقال عوامل از پدر و مادر به فرزند نمایش داده شده‌اند.



فرض کنیم احتمال هر یک از دو عامل هر فرد به فرزندش $\frac{1}{2}$ باشد. اگر از میان افراد یک جامعه آماری که نژاد گوش آزاد دارند، ۵ درصدشان خالص و ۵ درصدشان ناخالص باشند، هر یک از احتمال‌های زیر را محاسبه کنید.

اگر غلی نژاد گوش آزاد و همسرش نژاد گوش پیوسته داشته باشد، و آنها یک فرزند یا نژاد گوش پیوسته داشته باشند یا چه احتمالی نژاد گوش فرزند دوم آنها پیوسته خواهد بود؟

حل: از آنجا که پدر نژاد گوش آزاد دارد، عامل‌های او به صورت AA یا Aa است. اما اگر عامل‌های پدر به صورت AA باشند، نژاد گوش فرزندان آنها به صورت آزاد خواهد بود. بنابراین عامل‌های پدر به صورت Aa است. از طرفی از آنجا که مادر نژاد گوش پیوسته دارد، لذا عامل‌های او به صورت aa خواهد بود. بنابراین با توجه به شکل ۵ به احتمال $\frac{1}{2}$ فرزند دوم آنها نژاد گوش پیوسته خواهد داشت.

تمرین

۱ در برناب یک تاسن فرض کنید بشامد A ظاهر شدن عدد زوج، بشامد B ظاهر شدن عددی مضرب ۳ و بشامد C ظاهر شدن عددی بزرگتر از ۴ باشد. مستقل یا غیرمستقل بودن هر دو بشامد را بررسی کنید.

۲ یک سکه را سه بار برناب می‌کنیم. احتمال رو آمدن سکه در برناب سوم را به دست آورید، به شرط اینکه در دو برناب اول و دوم، پشت ظاهر شده باشد.

۳ فرض کنید A و B دو بشامد ناهمبسته و مستقل از یکدیگرند.

الف) نشان دهید A و B مستقل‌اند.

ب) با توجه به الف) نشان دهید A و B نیز مستقل‌اند.

۴ احمد به احتمال $\frac{1}{7}$ در تیم کوهنوردی مدرسه‌شان و به احتمال $\frac{1}{8}$ در تیم ملی فوتبال نوجوانان انتخاب می‌شود. احتمال های زیر را محاسبه کنید.

الف) در هر دو تیم مورد نظر انتخاب شود.

ب) در هیچ کدام از دو تیم انتخاب نشود.

پ) فقط در تیم ملی فوتبال انتخاب شود.

ت) فقط در یکی از تیم‌ها انتخاب شود.

ث) حداقل در یکی از تیم‌ها انتخاب شود.

۵ احتمال اینکه رویا در درس ریاضی قبول شود، دو برابر احتمال آن است که دوستش در این درس قبول شود. اگر احتمال اینکه حداقل یکی از آنها در درس ریاضی قبول شوند، برابر $\frac{625}{1000}$ باشد، رویا با چه احتمالی در این درس قبول خواهد شد؟

۶ دو تاس یا هم برتاب شده‌اند. احتمال آنکه هر دو غلغل رو شده زوج باشند، به شرط اینکه بدانیم مجموع اعداد رو شده برابر ۸ است را به دست آورید.

۷ ترکیبی از ۴ ماده شیمیایی داریم که دو تا از آنها مواد A و B هستند. احتمال واکنش نشان دادن ماده A ، $\frac{1}{5}$ و احتمال واکنش نشان دادن ماده B ، $\frac{1}{4}$ است. اگر ماده A واکنش نشان دهد، احتمال واکنش نشان دادن ماده B ، $\frac{1}{4}$ خواهد شد. با چه احتمالی حداقل یکی از مواد A یا B واکنش نشان خواهد داد؟

مقدمه

آمار توصیفی به خلاصه‌سازی داده‌ها در قالب نمودار، جدول و یا شاخص‌هایی در قالب معیارهای گرایش به مرکز و معیارهای پراکنندگی که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد، می‌پردازد. آمار توصیفی اطلاعاتی از چگونگی داده‌های جمع‌آوری شده فراهم می‌آورد که بسیار مفید است.

معیارهای گرایش به مرکز

معمولاً سعی می‌شود، دسته‌های نهفته در داده‌ها را به صورت یک یا چند عدد شاخص درآورد. تا بتوان هم‌اندیشه کلی درباره‌ی ویژگی مورد مطالعه به دست آورد و هم نتیجه مطالعات را به سادگی گزارش کرد. میانگین و میانه به عنوان معیارهای گرایش به مرکز در این کتاب معرفی می‌شوند.

میانگین

میانگین ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین معیار گرایش به مرکز است که در پایه هشتم با آن آشنا شده‌اید.

میانگین متوسط یا مرکز ثقل داده‌هاست که آن را با \bar{x} نشان می‌دهیم و برابر است با:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

که در آن n داده‌ها و n برابر با تعداد کل داده‌ها است.

مثال

محمد، جرم ۵ نفر از دوستان خود را برسد و آنها را در جدول زیر یادداشت کرد. سپس میانگین جرم دوستان خود را حساب کرد:

دوست	رضا	لینا	سام	احمد	علی
جرم (کیلوگرم)	۵۵	۶۱	۵۷	۵۵	۶۲

نحوه محاسبه میانگین

- محمد ابتدا مجموع جرم دوستان خود را محاسبه کرد:
- سپس عدد حاصل را بر عدد ۵ (تعداد دوستان) تقسیم کرد:

میانگین جرم دوستان محمد برابر است با

ویژگی های میانگین

اگر هر یک از داده های آماری با مقدار ثابتی جمع شود، میانگین آنها نیز با همان مقدار ثابت جمع خواهد شد. چرا؟
اگر هر یک از داده های آماری در مقدار ثابتی ضرب شود، میانگین آنها نیز در همان مقدار ثابت ضرب خواهد شد. چرا؟

کار در کلاس



- ۱ در فعالیت قبل، میانگین جرم دوستان محمد چند گرم است؟
- ۲ هوای اهواز در هر ساعت از یک روز بهاری گزارش شد. اگر میانگین دمای هوا ۲۸ درجه سانتی گراد باشد، میانگین دمای هوا چند درجه فارنهایت است؟ (رابطه $F = \frac{9}{5}C + 32$)

میان


پس از مرتب کردن داده ها، مقداری را که تعداد داده های بعد از آن با تعداد داده های قبل از آن برابر است میانه می نامیم و آن را با Q_2 نمایش می دهیم.

مثال: در فعالیت قبل، میانه داده ها کدام است؟
محمد برای پاسخ به این سوال:
الف) داده ها را از کوچک به بزرگ مرتب کرد:

۶۲ ۶۱ ۵۷ ۵۵ ۵۵

ب) جرم رضا و احمد از تمام کمتر است. در حالی که جرم علی و نیما از تمام بیشتر است.

در مثال فوق، عدد ۵۷ را میانه داده ها می نامند. زیرا پس از مرتب کردن داده ها از کوچک به بزرگ، در وسط داده ها قرار می گیرد.
روش محاسبه میانه:





مسئله: اعداد زیر نمره‌های درس ریاضی سمیرا در طول یک سال است.
 - میانگین و میانه نمره‌های او را حساب کنید.

۵، ۲۰، ۱۸، ۱۸، ۱۷، ۱۹

الف) محاسبه میانگین

$$\bar{x} = \frac{19 + 17 + 18 + 18 + 20 + 5}{6} = 16/17$$

ب) محاسبه میانه

$$Q_2 = \frac{18 + 18}{2} = 18$$

ب) به نظر شما کدام معیار توانایی دانش آموز در این درس را بهتر ارزیابی می‌کند؟ چرا؟

میانگین داده‌ها تحت تأثیر داده‌های خیلی بزرگ یا خیلی کوچک که در آمار به آنها داده‌های دور افتاده می‌گویم، قرار می‌گیرد. در صورتی که میانه داده‌ها تحت تأثیر داده‌های دور افتاده قرار نمی‌گیرد. بنابراین در صورت وجود داده دور افتاده، از میانه استفاده می‌کنیم در غیر این صورت از میانگین استفاده خواهیم کرد.

کار در کلاس



داده‌های زیر مربوط به تعداد ضربان قلب ۱۲ دانش آموز پایه نهم، قبل از یک مسابقه دو است.


۸۶، ۹۷، ۹۲، ۸۹، ۱۰۱، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۷۵، ۸۲، ۹۱، ۱۰۰

- میانه داده‌ها را مشخص کنید.
- میانگین داده‌ها را مشخص کنید.

معیارهای پراکندگی

میانه و میانگین اطلاعاتی بی‌ارمون در مورد داده‌ها در اختیار ما قرار می‌دهند. گاهی در توصیف داده‌ها لازم است از چگونگی پراکندگی آنها نیز اطلاعی داشته باشیم. در این درس با دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار، جابج اول و جابج سوم به عنوان معیارهای پراکندگی آشنا خواهیم شد.

نمره درس ریاضی دانش‌آموزان دو کلاس A و B به تفکیک گزارش شده است:



A	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
B	۴	۵	۱۰	۱۵	۲۰

الف) میانه نمره این دو کلاس را محاسبه کنید.

ب) میانگین نمره این دو کلاس را محاسبه کنید.

پ) به نظر شما یک معلم ریاضی ترجیح می‌دهد در کدام کلاس تدریس کند؟ چرا؟

همان‌طور که در فعالیت می‌بینید، تنها توجه به معیارهای گرایش به مرکز نمی‌تواند اطلاعات کاملی از داده‌ها در اختیار ما قرار دهد و لازم است به چگونگی پراکنندگی داده‌ها نیز توجه شود.

دامنه تغییرات

دامنه تغییرات ساده‌ترین شاخص پراکنندگی است که اختلاف بین بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین داده‌ها را نشان می‌دهد و آن را با نماد R نمایش می‌دهیم.

مثال: در فعالیت بالا برای محاسبه دامنه تغییرات نمره ریاضی کلاس A و کلاس B به صورت زیر عمل کنید:

کلاس A	کلاس B	
۸	۴	کوچک‌ترین داده
۱۲	۲۰	بزرگ‌ترین داده
$12 - 8 = 4$	$20 - 4 = 16$	دامنه تغییرات

در فعالیت بالا دامنه تغییرات نمره ریاضی کلاس A ، ۴ نمره و دامنه تغییرات نمره ریاضی کلاس B ، ۱۶ نمره است. ملاحظه می‌شود که در کلاس A پراکنندگی داده‌ها کمتر از کلاس B است.

کار در کلاس



معلم از ۷ نفر از دانش‌آموزان خواست تا تعداد کتابهای غیردرسی را که در طول تابستان گذشته مطالعه کرده‌اند، گزارش کنند.
الف) دامنه تغییرات آنها را محاسبه کنید.

۱ ۴ ۱۲ ۹ ۸ ۱۵

ب) دو دانش‌آموز دیگر به جمع آنها اضافه شدند و آنها نیز تعداد کتابهای غیردرسی را که در طول تابستان گذشته مطالعه کرده بودند، به ترتیب ۵ و ۱۱ اعلام کردند. مجدداً دامنه تغییرات این ۹ داده را محاسبه کنید.

ب) از مقایسه باسج الف و ب چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

همان طور که می‌بینید، دامنه تغییرات تنها به بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین داده‌ها وابسته است و با تغییر تعداد و مقدار داده‌های میانی، مقدار آن تغییر نخواهد کرد. پس این معیار نمی‌تواند بیانگر خوبی برای براکتدگی داده‌ها باشد.

واریانس

می‌خواهیم شاخص بهتری برای بیان براکتدگی داده‌ها پیدا کنیم. از آنجا که میانگین، معیاری برای مرکز داده‌ها است، شاخصی که بیانگر اختلاف داده‌ها از میانگین باشد و معایب وارد بر دامنه تغییرات را برطرف سازد، می‌تواند شاخص بهتری برای بیان براکتدگی داده‌ها باشد.

فعالیت

الف) در ادامه فعالیت قبل اختلاف از میانگین را برای نمره‌های ریاضی کلاس A و B به کمک جدول‌های زیر محاسبه کنید.

کلاس A		کلاس B	
x_i	$(x_i - \bar{x})$	y_i	$(y_i - \bar{y})$
۸		۲	
۹		۵	
۱۰		۱۰	
۱۱		۱۵	
۱۲		۲۰	

ب) مجموع اختلاف داده‌ها از میانگین را برای هر کلاس محاسبه کنید.

در هر دو کلاس، مجموع اختلاف داده‌ها از میانگین داده‌ها صفر شد. با مراجعه به تعریف میانگین، بدیهی است این نتیجه انقافی نبوده است.

هنوز برای هر مجموعه‌ای از داده‌ها، مجموع اختلاف داده‌ها از میانگین صفر خواهد شد.

بنابراین برای ساختن شاخصی که براکنگی حول میانگین را نشان دهد، باید از قدرمطلق اختلاف داده‌ها از میانگین یا از مجذور اختلاف داده‌ها از میانگین استفاده کرد. استفاده از مجذور اختلاف داده‌ها از میانگین متداول‌تر است. الف) مجذور اختلاف از میانگین برای نمره‌های ریاضی کلاس A و B را به کمک جدول زیر محاسبه کنید.

کلاس A			کلاس B		
x_i	$(x_i - \bar{X})$	$(x_i - \bar{X})^2$	y_i	$(y_i - \bar{Y})$	$(y_i - \bar{Y})^2$
۸			۰		
۹			۵		
۱۰			۱۰		
۱۱			۱۵		
۱۲			۲۰		

با مجموع مجذور اختلاف داده‌ها از میانگین را برای هر کلاس محاسبه کنید.

$$\text{مجموع مجذور اختلاف داده‌ها از میانگین برای کلاس A} \quad (8-10)^2 + \dots + (12-10)^2 =$$

$$\text{مجموع مجذور اختلاف داده‌ها از میانگین برای کلاس B} \quad (0-10)^2 + \dots + (20-10)^2 =$$

ب) میانگین مجذور اختلاف داده‌ها از میانگین را برای هر کلاس محاسبه و مقایسه کنید.

$$\text{میانگین مجذور اختلاف داده‌ها از میانگین برای کلاس A} \quad \frac{(8-10)^2 + \dots + (12-10)^2}{5} =$$

$$\text{میانگین مجذور اختلاف داده‌ها از میانگین برای کلاس B} \quad \frac{(0-10)^2 + \dots + (20-10)^2}{5} =$$

میانگین مجذور اختلاف داده‌ها از میانگین آنها را واریانس می‌نامند و از نماد σ^2

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{X})^2 + \dots + (x_n - \bar{X})^2}{N}$$

برای نمایش آن استفاده می‌شود:

تذکره: واحد واریانس برابر یا توان دوم واحد داده مورد نظر است.

همان‌طور که در فعالیت قبل دیده می‌شود، واریانس بزرگ (کلاس B) نشان دهنده دور بودن داده‌ها از میانگین آنها و واریانس کوچک (کلاس A) نشان دهنده نزدیکی داده‌ها به میانگین آنهاست. چنانچه همه داده‌ها با هم برابر باشند، واریانس آنها صفر خواهد بود. بنابراین واریانس معیار خوبی برای تشخیص پراکندگی و تغییرپذیری داده‌ها نسبت به میانگین است.

کار در کلاس

واریانس تعداد کتاب‌های غیردرسی مطالعه شده در «کار در کلاس» قبل، توسط ۷ و ۹ دانش‌آموز را محاسبه کنید.

واریانس	دامنه تغییرات	تعداد کتاب‌های مطالعه شده توسط هر دانش‌آموز
۱۲	۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷- ۸- ۹- ۱۰- ۱۱- ۱۲	۱۵
۱۲	۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷- ۸- ۹- ۱۰- ۱۱- ۱۲	۱۵

همان‌طور که در این «کار در کلاس» دیده می‌شود، واریانس برخلاف دامنه تغییرات، با تغییر تعداد و مقادیر داده‌ها تغییر می‌کند.

ویژگی‌های واریانس

اگر هر یک از داده‌های آماری با مقدار ثابتی جمع شود، واریانس آنها تغییر نخواهد کرد. چرا؟
اگر هر یک از داده‌های آماری در مقدار ثابتی ضرب شود، واریانس آنها در مجذور همان مقدار ثابت ضرب خواهد شد. چرا؟

کار در کلاس

۱ در اولین فعالیت، واریانس جرم دوستان محمد چند گرم به توان دو است؟

۲ هوای اهواز در هر ساعت از یک روز بهاری گزاش می‌شود. اگر واریانس دمای هوا ۶ درجه سانتی‌گراد به توان دو باشد، واریانس دمای هوا چند درجه فارنهایت به توان دو است؟ (راهنمایی $F = \frac{9}{5}C + 32$)

انحراف معیار

معیارهای گرایش به مرکز و پراکندگی فعالیت قبل در جدول زیر آمده است.

	جذر واریانس	واریانس	دامنه تغییرات	میانگین	کلاس
کلاس A	۱.۶	۲	۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷- ۸- ۹- ۱۰- ۱۱- ۱۲	۱۰	کلاس A
کلاس B	۷.۹	۵	۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷- ۸- ۹- ۱۰- ۱۱- ۱۲	۱۰	کلاس B

همان‌طور که در جدول و نمودار بالا دیده می‌شود، واریانس پراکندگی حول میانگین را بیشتر از حد انتظار نشان می‌دهد؛ زیرا در محاسبه واریانس از میانگین مجذور اختلاف از میانگین داده‌ها استفاده می‌شود. در حالی که جذر واریانس شاخص بهتری برای پراکندگی حول میانگین داده‌ها است.

جذر واریانس را انحراف معیار می‌نامند و آن را با نماد σ نمایش می‌دهند:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

برای گزارش برآوردگی، کدام شاخص را ترجیح می‌دهید؟ چرا؟

مجدداً این سؤال را مطرح می‌کنیم که در این فعالیت، به نظر شما یک معلم ریاضی ترجیح می‌دهد در کدام کلاس تدریس کند؟ چرا؟

ضرب تغییرات

ضرب تغییرات که با σ_{xy} نمایش داده می‌شود، نسبت انحراف معیار به میانگین $(\sigma_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\bar{x}})$ است و معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود.

کار در کلاس

فرض کنیم جرم دو نوزاد به ترتیب $w_1 = 1/5$ کیلوگرم و $w_2 = 2/5$ کیلوگرم و جرم دو فرد چهل ساله به ترتیب $w_3 = 80$ کیلوگرم و $w_4 = 81$ کیلوگرم است.

الف) تفاوت جرم دو نوزاد چقدر است؟

ب) تفاوت جرم دو فرد چهل ساله چقدر است؟

پ) انحراف معیارهای هر دو دسته را به دست آورید.

ت) فکر می‌کنید تفاوت جرم‌ها در کدام دسته زیاده‌تر به نظر می‌رسد؟

ث) ضرب تغییرات هر دو دسته را به دست آورید.

همان گونه که دیدید با اینکه میزان تغییرات دو داده در هر دو دسته یکسان است اما ضرب تغییرات در w_3 ها با ضرب تغییرات در w_4 ها بسیار متفاوت است زیرا این شاخص، تغییرات را به نسبت میانگین می‌سنجد.

لازم به ذکر است که از ضرب تغییرات فقط برای داده‌های مثبت استفاده می‌شود.

کار در کلاس

موجودی حساب پس‌انداز علی و محمد و امید در ابتدای یک سال به ترتیب A و B و C ریال است. (مقادیر A ، B و C دو به دو متمایزند) اگر این سه نفر ماهانه صد هزار تومان به حساب خود واریز کرده و هیچ مبلغی برداشت نکنند، ضرب تغییرات موجودی‌های آنها در پایان سال نسبت به ابتدای سال چه تغییری خواهند کرد؟ افزایش می‌یابد یا کاهش؟ چرا؟

چارک‌ها (چارک اول، چارک دوم و چارک سوم) مقادیری هستند که داده‌های مرتب شده را به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کنند. بدیهی است چارک دوم همان میانه است. چارک اول را با Q_1 و چارک سوم را با Q_3 نمایش می‌دهند.




می‌بینید که ۲۵ درصد داده‌ها از ۴۸ (چارک اول)، ۵۰ درصد داده‌ها از ۷۰ (میانه) و ۷۵ درصد داده‌ها از ۸۷ (چارک سوم) کمتر است. محاسبه چارک‌ها:



مثال: تعداد تصادفات‌های اتومبیل‌ها در ۱۵ روز اول تابستان در شهری به صورت زیر گزارش شده است:

۱۹ ۳۱ ۲۵ ۱۸ ۳۲ ۴۱ ۲۳ ۲۴ ۱۶ ۲۷ ۱۴ ۲۳ ۱۵ ۱۰ ۱۲

چارک‌ها را مشخص کنید:



توجه به این نکته نیز ضروری است که با توجه به تعداد داده‌ها، ممکن است چارک‌ها دقیقاً خود داده‌ها نباشند و در فاصله بین دو داده متوالی قرار گیرند.

تک کار کلاس

معلم یک کلاس می‌خواهد متوسط مدت زمان استفاده دانش‌آموزان از اینترنت را برآورد کند. وی از ۳۵ دانش‌آموز کلاس خود پرسید، در یک شبانه‌روز چند دقیقه از اینترنت استفاده می‌کنند؟ در زیر پاسخ آنها گزارش شده است.

۱۲۰	۳۰	۸۰	۲۵	۱۸۰	۱۵	۲۰۰	۶۰	۹۰	۲۵
۲۰	۳۰	۶۰	۱۱۵	۱۲۰	۲۰	۶۰	۹۰	۹۰	۷۵
۲۵	۲۰۰	۷۵	۹۰	۲۰۰	۶۰	۶۰	۶۰	۲۵	۲۵
۱۲۰	۱۰۰	۱۸۰	۳۰	۱۵					

جاری اول، میان و جاری سوم مدت زمان استفاده از اینترنت دانش‌آموزان این کلاس را مشخص کنید.

تمرین

۱ درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را مشخص کنید.

- اگر مقدار ثابت و مثبت c از داده‌ها کم شود، انحراف معیار به اندازه \sqrt{c} کاهش می‌یابد.
- اگر مقدار ثابت و مثبت c به داده‌ها اضافه شود، ضریب تغییر بزرگ‌تر می‌شود.
- اگر مقدار ثابت و مثبت c در داده‌ها ضرب شود، انحراف معیار c برابر می‌شود.
- اگر مقدار ثابت و مثبت c در داده‌ها ضرب شود، ضریب تغییر ثابت می‌ماند.

۲ ضریب تغییرات سن دانش‌آموزان کلاس شما ۱۰ سال دیگر چه تغییری می‌کند؟

۳ علیرضا و آرمان دو کارمند شرکت A هستند که وظایف یکسانی دارند اما حقوق دریافتی آنها به ترتیب ۱۲۰۰۰۰۰ تومان و ۱۶۰۰۰۰۰ تومان است. محمد و بهروز نیز دو کارمند شرکت B هستند که با وظایف یکسان حقوق‌هایی به ترتیب ۲۵۰۰۰۰۰ تومان و ۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان دریافت می‌کنند. به نظر شما در کدام شرکت بی‌عدالتی بیشتری در پرداخت حقوق به این افراد مشاهده می‌شود؟ توضیح دهید.

۴ جدول زیر، بول توجیبی (ده هزار ریال) هفتگی پنج دوست نزدیک مینا و مریم را نشان می‌دهد. الف) میانگین و میانه بول توجیبی را برای دوستان مریم و مینا محاسبه کنید. ب) انحراف معیار بول توجیبی را برای دوستان مریم و مینا محاسبه کنید. چه برنامه‌ریزی برای یک سفر یک روزه یا دوستان برای مینا ساده‌تر است یا مریم؟

مینا	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷
مریم	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵

خواندنی

علاوه بر جاری که از دهک و صدک نیز استفاده می‌شود، دهک‌ها (دهک اول، دهک دوم، ... و دهک نهم) مقادیر به داده هستند که داده‌های مرتب شده را به ده قسمت مساوی تقسیم می‌کنند. دهک پنجم همان میانه است.

به نقل از روزنامه هشتپز ۹/۱۱/۹۲، تناسباتی سه دهک پایین درآمدی باید در دستور کار دولت قرار گیرد، با توجه به این جمله چه افرادی باید تناسباتی شوند؟



اگر دولت بخواهد پارانۀ افرادی را که درآمد آنها بیشتر از دهک هفتم است، حذف کند و به پارانۀ افرادی که درآمد آنها از دهک سوم کمتر است، ۵ درصد اضافه کند، آیا برای دولت مقرون به صرفه است؟

صدک‌ها (صدک اول، صدک دوم، ... و صدک نهم) مقادیر به داده‌ها که داده‌های مرتب شده را به صد قسمت مساوی تقسیم می‌کنند. صدک دوم همان دهک اول و صدک پست و نهم همان جاری اول است.

کودک‌هایی که زیر صدک سوم قدرتمند می‌کنند، فارغ از اندازه‌ها قدرتمند آریایی شوند.

- منظور از صدک سوم قدرتمند چیست؟
- بر اساس جمله فوق چه کودکی باید مورد آریایی قرار گیرند؟



۵ میانگین، میان و انحراف معیار نرخ تورم (مراجعه به خواندنی) سال های ۹۴-۸۴ را بر اساس جدول زیر محاسبه کنید.

سال	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
نرخ تورم	۱۰/۴	۱۱/۹	۱۸/۴	۲۵/۴	۱۰/۸	۱۲/۲	۲۱/۵	۳۰/۵	۳۴/۷	۱۵/۶	۱۱/۹

۶ در جدول زیر، ارتفاع از سطح دریا برای بعضی از شهرهای استان مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد دیده می شود.

(زاغلمایی: $۱\text{ m} = ۳/۲۸۱\text{ ft}$ ، فوت: ft ، متر: m)

شهر	مرکزی				کهگیلویه و بویراحمد		
	اراک	محللات	خمین	تلازید	باسج	دهدشت	دنا
ارتفاع از سطح دریا	۱۷۰۸ (m)	۱۷۷۵ (m)	۱۸۳ (m)	۱۹۲ (m)	۶۱۳۵/۲۷ (ft)	۳۲۲۸/۱۹ (ft)	۷۲۱۸/۲ (ft)

الف) میانگین ارتفاع از سطح دریا در شهرهای استان مرکزی چقدر است؟

ب) انحراف معیار ارتفاع از سطح دریا در شهرهای استان مرکزی چقدر است؟

پ) ارتفاع از سطح دریا برای شهرهای کدام استان بیشتر است؟

خواندنی

شاخص تورم (شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) معیار سنجش تحولات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارها در یک جامعه به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می رود. رای محاسبه شاخص تورم، سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه، ۲۹۲ قلم کالا و ۹۱ قلم خدمت با توجه به اهمیت آنها به طریق غلشی انتخاب شده است. برای محاسبه شاخص تورم از رابطه زیر استفاده می شود:

سال شاخص تورم نرخ تورم

۱۰/۴	۳۹۸	۱۳۸۴
۱۱/۹	۲۴۵۳	۱۳۸۵
۱۸/۴	۵۳۷۴	۱۳۸۶
۲۵/۴	۶۶۱۲	۱۳۸۷
۱۰/۸	۷۳۲۳	۱۳۸۸
۱۲/۲	۸۴۳۱	۱۳۸۹
۲۱/۵	۱۰۰۰۰	۱۳۹۰
۳۰/۵	۱۴۰۵۴	۱۳۹۱
۳۴/۷	۱۷۵۱۸۸	۱۳۹۲
۱۵/۶	۲۰۳۴۴	۱۳۹۳
۱۱/۹	۲۲۷۴۴	۱۳۹۴

$$I_t = \frac{P_t^1 Q_t^0 + \dots + P_t^n Q_t^0}{P_0^1 Q_0^0 + \dots + P_0^n Q_0^0} \times 100$$

که در آن:

I_t : شاخص تورم در زمان t

P_t : قیمت کالا یا خدمت تمام در زمان t

P_0 : قیمت کالا یا خدمت تمام در زمان پایه

Q_t : مقدار مصرف کالا یا خدمت تمام در زمان t

Q_0 : مقدار مصرف کالا یا خدمت تمام در زمان پایه

برای محاسبه نرخ تورم (IPI) از رابطه زیر استفاده می شود:

$$IPI_t = \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \times 100$$

I_t شاخص تورم در سال مورد نظر و I_{t-1} شاخص تورم در سال قبل از آن است.

خواندنی

در بسیاری از پژوهش‌ها برای بیان بهتر نتایج و انتقال ساده‌تر مفاهیم، از جدول‌ها و نمودارها استفاده می‌کنند. نرم‌افزارهای گوناگونی برای ترسیم نمودارها به‌کار گرفته می‌شوند. پرکاربردترین، ساده‌ترین و فراگیرترین نرم‌افزار موجود، برنامه اکسل از مجموعه مایکروسافت آفیس است.

نخستین مرحله از رسم نمودار، وارد کردن داده‌ها در یک کار برگ (worksheet) از برنامه اکسل است. نام متغیرها را بالای ستون مربوط به آن بنویسید. معمولاً متغیر در ستون اول و فراوانی یا مقدار هر گروه یا متغیر را در ستون بعد روبروی آن وارد می‌کنند. برنامه اکسل متغیر را بصورت خودکار، روی محور افقی و فراوانی یا مقدار را روی محور عمودی نشان می‌دهد. انواع نمودارهای پیش‌فرض که در پایه‌های پیشین با آنها آشنا شده‌اید، در برنامه اکسل وجود دارد.

نمودار میله‌ای:


برای نمایش فراوانی یا درصد متغیرهای اسمی، گسسته یا گروه‌بندی شده از نمودار میله‌ای استفاده می‌شود. برای مثال تعداد فرزندان خانواده، داده گسسته است. برای رسم نمودار از اکسل داده‌ها را وارد کنید:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		تعداد فرزندان	فراوانی								
2		1	2								
3		2	3								
4		3	13								
5		4	13								
6		5	3								
7		6	3								
8		7	1								
9											
10											
11											

سیس دو ستون را انتخاب کنید.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		تعداد فرزندان	فراوانی								
2		1	2								
3		2	3								
4		3	13								
5		4	13								
6		5	3								
7		6	3								
8		7	1								
9											
10											
11											

سیس از منوی صفحه قبل سربرگ Insert را انتخاب کنید. انواع نمودار را در آنجا می‌بینید. برای رسم نمودار میله‌ای، از انگوی Column یا Bar استفاده کنید.



بنا به کارایی نمودار مورد نظر و سلیقه خودتان می‌توانید هر یک از این پنج نمونه نمودار را به عنوان نمودار میله‌ای انتخاب کنید. با انتخاب نمودار مورد نظر، نمودار میله‌ای شامل مقادیر مورد نظر شما رسم می‌شود و به صورت یک شیء جداگانه روی کارپرگ شما نشان داده می‌شود. با کلیک و راست‌کلیک بر روی بخش‌های گوناگون نمودارتان، می‌توانید گزینه‌های آن از قبیل رنگ، نام نمودار، برجسپها، سهمی بودن، پس‌زمینه نمودار و ... را به اشکال مختلف تغییر دهید. با گرفتن و کشیدن نمودار می‌توانید محل آن را در کارپرگتان جابه‌جا کنید.




نمودار دایره‌ای:

نمودار دایره‌ای، بهتر است برای متغیر اسمی استفاده شود. هنگامی که یک موضوع را به بخش‌های تحلیلی تقسیم کنیم، نمودار دایره‌ای بسیار مناسب است؛ مثلاً درآمد یک شرکت به بخش‌های مختلف تعلق می‌گیرد، می‌توان آن را با نمودار دایره‌ای نمایش داد.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	مردانه	20					
3	مردانه	10					
4	سود	15					
5							
6							
7							
8							

برای رسم نمودار نیز انگشتر (Data) را وارد کنید:

با رفتن به قسمت Insert و انتخاب Pie نمودار دایره‌ای مورد نظر را انتخاب کنید. با فشار دادن روی آن، نمودار دایره‌ای رسم می‌شود.



دیدید که برای رسم سایر نمودارها هم می‌توان به همین ترتیب عمل کرد، فقط کافی است از منوی بالا سربرگ Insert را انتخاب کنید و نمودار مورد نظر خود را، پس از ورود داده‌ها انتخاب نمایید.

منابع فارسی:

- ۱- ابراهیمش، علی؛ جمالی، محسن؛ ربیع، حمیدرضا؛ رحمانی، ابراهیم؛ شاهوزایی، احمد؛ و عالمان، وحید (۱۳۹۲). ریاضیات ۲ سال دوم آموزش متوسطه. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- ۲- اصلاح پسر، بهمن؛ یوجردیان، ناصر؛ رحمانی، ابراهیم؛ طاهری تجانی، محمد تقی و عالمان، وحید (۱۳۹۵). حسابان سال سوم متوسطه. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- ۳- یحسینی زاده، شهرتاز؛ یوجردیان، ناصر؛ دهقانی ایبانه، زین العابدین؛ دهنور، فرزاد؛ طاهری تجانی، محمد تقی (۱۳۹۴). ریاضیات (۱). سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- ۴- امیری، حمیدرضا، بیژن زاده، محمدحسین؛ نهرامی سامانی، احسان؛ حیدری، رضا؛ داورزنی، محمود؛ رحمانی، ابراهیم؛ سیدصالحی، محمدرضا؛ قربانی آرای، محسن. (۱۳۹۵)، ریاضی (۱)، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- ۵- امیری، حمیدرضا؛ ابراهیمش، علی؛ داودی، خسرو؛ دلشاد، کبری؛ رحمانی، ابراهیم؛ سیدصالحی، محمدرضا؛ ترقی، هوشنگ؛ صدر، مهینبهرام. (۱۳۹۹). ریاضی نهم، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- ۶- بیژن زاده، محمدحسین؛ یانلا، عن الله؛ یوجانی، که کو. (۱۳۹۱). ریاضی عمومی. دوره پیش دانشگاهی، رشته تجربی. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- ۷- رستنی، محمدعلی؛ عطوفی، عبدالحمید؛ گودرزی، محمد؛ امیری، حمیدرضا (۱۳۹۵). ریاضیات ۳، سال سوم علوم تجربی. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- ۸- گویا، زهرا؛ گویا، مریم؛ ظهوری زنگنه، سزین؛ حاجی بابایی، جواد؛ جهانی پور، روح الله؛ (۱۳۸۸). ریاضی پایه، دوره پیش دانشگاهی، رشته علوم انسانی. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- ۹- قربانی، ابوالقاسم. (۱۳۷۱). حساب و جبر. سال دوم آموزش متوسطه، رشته ریاضی و فیزیک. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- ۱۰- یهودیان، جواد. (۱۳۸۴). آمار و احتمال مقدماتی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
- ۱۱- رحیمی، زهرا؛ سیدصالحی، محمدرضا، ترقی، هوشنگ و عسیری، محمود. (۱۳۹۵). هندسه (۱). سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- ۱۲- جاسون، ریچارد. ا و باجاریا، گوری. گ. (۱۹۹۶). آمار، اصول و روش ها، ترجمه: قناج میکانیکی. (۱۳۸۰). اصفهان: انتشارات ارکان.
- ۱۳- ووناگات، تامس. اچ و ووناگات، رانلد. جی. (۱۹۳۵). آمار مقدماتی. ترجمه: محمدرضا سنگانی (۱۳۸۲). تهران: مرکز نشر.
- ۱۴- آتفه، آفتین. (۱۳۹۵). ترندها و سواد آماری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی تهران: مرکز آمار ایران، اصفهان: خانه آمار اصفهان.

منابع انگلیسی:

- 15- Boecher, A., Penna, J., & Bittinger, L. (2012). *Precalculus, A Right Triangle Approach*. Addison-Wesley.
- 16- Lial, M., Greenwell, R., & Ritchey, N. (2017). *Calculus with Applications*. Pearson Education.
- 17- Bittinger, M. L., Ellenbogen, D. J., & Surgent, S. A., (2012). *Calculus and its applications*, 10th ed. Addison-Wesley.
- 18- Briggs, W., Cochran, L., Gillett, B., & Schutz, E. (2015). *Calculus: Early transcendentals*. Second edition. Pearson.
- 19- Aufmann, R. N., Barker V. C., & Nation, R. D. (2011). *College Algebra and Trigonometry*. Seventh edition, Brooks/Cole.
- 20- Cohen D., Lee T. & Sklar D. (2010). *Precalculus: A Problems-Oriented Approach*. Sixth Edition, Brooks/Cole.
- 21- Faires J. D. & DeFranza J. (2012). *Precalculus*. Fifth edition, Brooks/Cole.
- 22- Sullivan, M. (2015). *Precalculus: Concepts Through Functions A Unit Circle Approach To Trigonometry*, Third edition, Pearson Education.
- 23- Sullivan, M. (2008). *Algebra and Trigonometry*. Eighth edition, Pearson Prentice Hall.
- 24- Young, C. (2013). *Algebra and Trigonometry*. Third edition, John Wiley & Sons.
- 25- Young, C. (2014). *Precalculus*. Second edition, John Wiley & Sons.
- 26- Berehúe-Holliday (2008). *California Algebra 2. Concepts, Skills, and Problem Solving*. Glencoe/McGraw-Hill.
- 27- Gary K. Rockswold (2010). *COLLEGE ALGEBRA with Modeling & Visualization*. 4th edition. Pearson Education.
- 28- Ron Larson; David C. Falvo. (2011). *Precalculus with Limits*. Second Edition. Charlie Van Wagner
- 29- <https://www.wikipedia.org>



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به‌عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقیق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه فعلی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی توانمندسازی کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ یا کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجحتاً تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبردی دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تملی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مطابقی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت‌کننده در اعتبارسنجی کتاب ریاضی ۲ - کد ۱۱۱۲۱۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	زهرا ملکی	قزوین	۲۲	زهرا محمدی	چهارمحل و بختیاری
۲	شهره جویانی	چهارمحل و بختیاری	۲۳	منجه فادری	هرمزگان
۳	برون طالب حسامی آذر	کرمان	۲۴	مریم عالی	کرمان
۴	شهن قلی زاده	سیستان و بلوچستان	۲۵	بروانه وزیری	هرمزگان
۵	فاطم علی پور	آذربایجان شرقی	۲۶	سپهر گساوری	البرز
۶	معمومه صوحی	قزوین	۲۷	سید محسن حسینی	کرمان
۷	الهه حسینی	کرماتشاه	۲۸	دینا گل خندان	گیلان
۸	آزاده حاجی هاشمی	خوزستان	۲۹	محمد امیدی	ایلام
۹	جمال نوین	یزد	۳۰	غلامرضا باهنری	فارس
۱۰	ترکی ملایی زاده	سیستان و بلوچستان	۳۱	محمد جواد اک	کرماتشاه
۱۱	حمید قره گزلو	تهرانسناهای تهران	۳۲	علی رضا زمانی	آذربایجان شرقی
۱۲	وحیده فاتحی	خراسان جنوبی	۳۳	حسین امیرآبادی زاده	خراسان جنوبی
۱۳	سمه قربانی راد	خراسان شمالی	۳۴	احمد زورودی	مازندران
۱۴	زهرا دانیسج	همدان	۳۵	مهری غضنفریان	زنجان
۱۵	علی اصغر بطمانی	ایلام	۳۶	محمدهادی اقتصادی فر	فارس
۱۶	محبوبه رضایی	تهرانسناهای تهران	۳۷	حسن زارنج	گلستان
۱۷	عاطفه حسین پور	مازندران	۳۸	مریم تقیروس همدانی	اصفهان
۱۸	جعفر خراشینی	همدان	۳۹	مریم خمر غلام پور	سمنان
۱۹	بهین اراهمیان	خراسان شمالی	۴۰	مریم سادات بهنام	تهران
۲۰	الناز زابری	آذربایجان غربی	۴۱	فریح حسن زاده	کهگیلویه و بویراحمد
۲۱	فرانک فرستادی فر	لرستان	۴۲	سعید مدبر خراسانی	تهران